

И. Л. Мининзон

ФЛОРА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

пятая электронная версия

Нижний Новгород
2011

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Краткие сведения о Нижнем Новгороде	6
История изучения флоры Нижнего Новгорода	8
Ботанико-географическое положение Нижнего Новгорода	11
История формирования растительного покрова Нижнего Новгорода	12
Флора Нижнего Новгорода и его растительность	17
Ботанико-географическое районирование Нижнего Новгорода	22
Краткое описание уроцищ города с редкой аборигенной и интродуцированной флорой	26
Схематическая карта ботанико-географического деления Нижнего Новгорода	32
Схематическая карта растительности Нижнего Новгорода	33
Схематическая карта размещения на территории Нижнего Новгорода уроцищ с редкой аборигенной и интродуцированной флорой	34
Список видов сосудистых растений аборигенной флоры Нижегородской области, имеющих на территории Н.Новгорода, или в его ближних окрестностях границы распространения в нашем регионе	35
Список видов сосудистых растений аборигенной и адвентивной флоры Нижегородской области, найденных пока что только на территории Нижнего Новгорода, или в его ближних окрестностях	37
Конспект флоры Нижнего Новгорода. Введение	38
Аннотированный список видов сосудистых растений, произрастающих на территории Нижнего Новгорода	41
Основные проблемы городской флористики	117
Об охране флоры Нижнего Новгорода	120
Литература по флоре Нижнего Новгорода	122
Алфавитный указатель латинских названий семейств	128

Urbi et orbi.
(Cicero)

Посвящается памяти неутомимых
исследователей флоры Нижегородского края,
наших учителей
А.Д.Смирновой и Е.В.Лукиной.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Экология человека в крупном городе, каким является Нижний Новгород, развивается в последние годы весьма интенсивно. Активно изучаются такие составляющие городской среды, как атмосфера, воды, почвы, различные геологические процессы, что находит свое отражение в ежегодно составляемых отчетах по экологическому состоянию города.

Что касается растительного мира города, также составляющего среду обитания горожан, то изучается флора, а также растительные сообщества памятников природы города; составлены достаточно полные сводки по редким и охраняемым растениям.

Между тем для полного представления о среде обитания человека необходимо знание всей флоры города, а не только редких и охраняемых видов растений. Не нужно также забывать, что виды растений являются индикаторами различных экологических процессов, в т.ч. загрязнения окружающей среды.

Кроме этого, изучение флоры города имеет и самостоятельный научный интерес, а также совершенно необходимо для проведения занятий в природе со школьниками и студентами.

Поэтому мы считаем, что создание если не "Флоры Нижнего Новгорода" в полном смысле этого слова по образцу, например, "Флоры европейской части СССР" - "Флоры восточной Европы" (указаны виды, их авторы, синонимика, положение в системе таксонов более высокого ранга и внутривидовые подразделения, ареал на территории Флоры и общий ареал, для интродуцированных растений – родина, а также приведены определительные таблицы для семейств, родов и видов), то хотя бы конспекта флоры совершенно необходимо. Конспект флоры какой - либо территории, это список видов (чаще всего подразумевается: сосудистых растений), произрастающих на этой территории. В конспекте флоры обыкновенно указывается систематическое положение видов, их распространение по данной территории, а также принадлежность к экологическим и географическим группам растений; зачастую отмечается и хозяйственное использование растений.

Подобные конспекты флоры, при всей их ограниченности, обычно бывают полезными при проведении учебных экскурсий по ботанике, при написании определителей растений, как справочное руководство для профессиональных натуралистов - ботаников, географов и экологов, а также для достаточно квалифицированных любителей природы родного края.

Первоначальный вариант "Флоры Нижнего Новгорода" был создан еще в 1994 г. по совету и при поддержке Е.В. Лукиной и А.К. Ибрагимова и подводил некоторые итоги нашего многолетнего изучения растительного мира Нижнего Новгорода. С тех пор рукопись этой работы неоднократно дополнялась и переделывалась. Значительную роль сыграли полевые поездки по городу со студентами биологического факультета ННГУ, кафедры экологии и природопользования ННГАСУ, естественно-географического факультета НГПУ, и с учениками школы № 134.

Само собой разумеется, что создание этой работы было бы невозможным без помощи наших коллег В.П.Воротникова, А.И.Широкова, А.Н.Петровой,

А.К.Ибрагимова, Н.И.Насоновой, Ф.В.Насоновой, И.П.Елисеева, Г.И.Кондрашкиной, И. В. Мишуковой, М. А. Коровиной, В.П.Юниной, С.Н.Пияшовой, А.А.Терентьева, от которых были получены советы и конкретные сведения по флоре и географии города. Пользуемся случаем принести этим лицам нашу искреннюю благодарность. Благодарим также Г. И. Мартынову, В.И. Мининзона, Ю. И. Мининзона., Н. В. Агееву, Р. Д. Хабибуллина, Е. Л. Солянову за помощь в компьютерном наборе текста.

* * *

Предисловие ко второй электронной версии(<http://www.ecologynn.ru/Природный комплекс.2007.>)

Настоящий текст является переработкой «Флоры Нижнего Новгорода», изданной в 2004 г. (Н.Новгород: НООНО Кабинет методов краеведческой работы...- 104 с. илл.). При переработке были дополнительно написаны главы, посвященные краткому описанию Нижнего Новгорода, истории формирования его растительного покрова и истории изучения его растительного мира, роли флоры города в формировании его экосистем, а также проблемам изучения городской флоры; уточнены и расширены описания ботанико-географических подрайонов города и урочищ с редкой и интересной флорой, уточнены карты, приведен список видов флоры Нижегородской области, найденных пока только на территории города, включен ряд новых видов, уточнено распространение видов по территории города, их приуроченность к различным экосистемам города, растительным сообществам и роль в них, а для культивируемых видов – способность к натурализации в условиях Н.Новгорода. Отмечено внесение видов в Красную книгу области. Были расширены описания хозяйственного использования растений. Последовательность расположения семейств полностью приведена в соответствие с системой Энглера. Исправлены многочисленные опечатки. В связи с выходом в свет всех 11 томов серии «Флора европейской части СССР» - «Флора восточной Европы» вся синонимика и объем видов приведены в соответствие с томами этой серии. Пользуемся случаем выразить благодарность И.В.Мишуковой, Т.Е.Царегородцевой, Г.А.Кондрашкиной, М.А.Коровиной, О.П.Лавровой, Н.Х.Потапенко, Т.Р.Хрыновой, Е.А.Грачевой, С.В.Бакка, А.В.Чкалова, В.П. Воротникову за предоставление сведений о своих ботанических находках и выращиваемых ими редких растениях, указания по распространению растений и содействие в определении растений. Благодарим В.П.Воротникова, Р.Д.Хабибуллина, С.П.Урбановичюте, О.С.Гладышеву, А.И.Широкова за предоставление новейшей ботанической литературы. Благодарим А.К.Ибрагимова, В.И.Волкорезова и В.П.Воротникова за консультации по геоботанике. Пользуемся также случаем поблагодарить Г.И.Мартынову, Ю.И.Мининзона, Е.Л.Солянову, Р.Д. Хабибуллина, А.А Тарасову, Д.Б. Елистратову, М.П.Степанову за помощь в компьютерном наборе текста.

* * *

Предисловие к третьей электронной версии.

Настоящий текст является очередной переработкой «Флоры Нижнего Новгорода». В этой переработке дополнительно написана глава по охране флоры города, уточнены списки видов растений, произрастающих на территории Н.Новгорода, имеющих здесь границы своего распространения, а также тех, которые обнаружены пока только на территории Н.Новгорода, или в его ближних окрестностях. Уточнены сведения по распространению аборигенных и адвентивных видов, натурализации культурных видов, их использованию местным населением. Исправлены замеченные опечатки.

Пользуюсь случаем поблагодарить И.В.Мишукову и Л.М.Сулименко, предоставивших в мое распоряжение выращиваемые ими редкие растения. Благодарю А.В.Чкалова, Т.Р.Хрынову и С.К.Пальчикову за помощь в определении растений.

Благодарю В.П.Воротникова, С.П.Урбанавичюте и А.И.Широкова за предоставление новейшей ботанической литературы. Благодарю А.К.Ибрагимова за консультации по геоботанике. Благодарю Г.И.Мартынову и Ю.И.Мининзона за помошь в наборе текста.

* * *

Предисловие к четвертой электронной версии.

Настоящий текст является очередной переработкой «Флоры Нижнего Новгорода». В этой переработке уточнены списки видов растений, произрастающих на территории города: добавлены новые и исключены некоторые, ранее помещенные по ошибке, уточнено распространение видов по городской территории, исправлены замеченные опечатки.

Пользуюсь случаем поблагодарить А.В.Чкалова, А.И.Широкова, Т.Р.Хрынову, М.А.Досаеву за помошь в определении некоторых растений.

Благодарю сотрудников Ботанического сада И.В.Мищукову, Е.Е.Демидову, Л.М.Сулименко, садоводов-опытников супругов В.Е. и И.А. Панченковых, А.М.Баландину и Е.Ф.Николенко за предоставление выращиваемых ими редких растений.

Благодарю О.П.Лаврову, Н.С.Пискареву, Л.А.Голубеву и В.П.Юнину за предоставление найденных ими редких растений.

Благодарю Ю.И.Мининзона, В.П.Воротникова, А.И.Давыдова, Е.Н.Перегуда, Д.Б.Елистратову, Е.Н.Солянову, А.С.Литвинову, О.В.Жовину (Бирюкову), М.А.Досаеву за разностороннюю помошь.

Благодарю А.А.Каюмова, руководителя экоцентра «Дронт» за размещение на сайте экоцентра третьей и четвертой электронных версий данной работы.

* * *

Предисловие к пятой электронной версии.

В настоящем электронном издании проведена сплошная нумерация всех учтенных нами видов растений. Уточнен их список, добавлены вновь обнаруженные и исключены внесенные по ошибке, уточнено их распространение по территории города и использование населением, дополнен список литературы по флоре Н.Новгорода. Исправлены замеченные опечатки. Пользуюсь случаем поблагодарить московского ботаника А.В. Щербакова и моих коллег по Ботаническому саду ННГУ им. Н.И.Лобачевского И.В.Мищукову, Т.Р.Хрынову, А.В.Чкалова, Е.Е.Демидову и С.К.Пальчикову за помошь в определении растений. Благодарю Е.Е.Демидову и И.В.Мищукову за предоставление сведений о некоторых редких культурных растениях. Благодарю также Ю.И.Мининзона, Т.Р.Хрынову, А.И.Давыдова, М.А.Досаеву, Е.Н.Перегуда, Т.А.Модину и И.В.Мищукову за техническое содействие. Особая благодарность – моему спутнику по экскурсиям в Автозаводском и Нижегородском районах М.В.Сидоренко, который не только предоставил мне свой автотранспорт, но и материально стимулировал мои флористические поиски.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.

Нижний Новгород, центр Нижегородской области, основан в 1221 г. В настоящее время население города составляет свыше 1,4 млн. человек. Современная его территория имеет площадь около 1100 кв. км. Из этой площади около 1/5 занимают леса и лесные культуры, парки, скверы, массивы коллективных садов и сельхозугодья (поля кормовых культур и луга). Около 1/10 части территории занято техногенными ландшафтами: территориями заводов и фабрик, складами, железнодорожными узлами, шоссейными и железными дорогами и т.п. Следует учесть, что на значительной части этих ландшафтов также присутствует озеленение в виде внутризаводских скверов, цветников, газонов, аллей и т.п. Около 1/20 площади города занято поселками индивидуальной застройки с садами на приусадебных участках. Город расположен на обоих берегах Оки (поэтому различают его левобережную и правобережную части) и правом берегу Волги; внутри города имеется многочисленная сеть мелких речек, ручьев, а в левобережной (заречной) части города сверх того и сеть мелиоративных каналов. Прибрежно-водная растительность занимает в настоящее время около 1/100 общей площади территории города. Через Н.Новгород проходят железнодорожные магистрали на юг и на запад, что облегчает миграцию заносных южных (степных, пустынных) и западных, европейских растений. Параллельно железнодорожным магистралям идут шоссейные, также, хотя и в меньшей степени, способствующие заносу в город различных адвентивных и дичающих культурных растений.

Климатические условия произрастания растений в Нижнем Новгороде типичны для средней полосы европейской России. По данным городской метеостанции среднегодовая температура воздуха в городе +4°, средняя температура июля +18°, средняя температура января – 12°, среднегодовое количество осадков около 600 мм с преимущественным выпадением в течение вегетационного периода, средняя глубина снежного покрова около 50 см. Средняя длительность вегетационного периода около 150 дней. Средняя сумма положительных температур за время вегетационного периода составляет около 2300°. Подобные климатические условия позволяют произрастать на территории города не только аборигенным растениям средней полосы России, но и растениям более жарких климатических областей с коротким периодом вегетации, т.е. заносным растениям степей и пустынь типа верблюшки, солянки, амброзии и т.п., а также растениям, культивируемым с предварительной выгонкой в парнике, или теплице, т.е. типа арбуза, бегонии, шалфея блестящего и т.п.

Рельеф и почвы города соединяют в себе типичные рельеф и почвы европейского центра России. Пересеченный рельеф нагорной (правобережной) части города (возвышается над заречной частью на 70-125 м) способствует, с одной стороны, произрастанию на склонах с южной экспозицией степных растений, а с другой стороны – произрастанию на тенистых склонах с северной экспозицией растений более свойственных северу области, растениям хвойных лесов – телиптерису буковому, кислице, майнику и др. В оврагах, на кручах с древесно-кустарниковой растительностью и сохранились наиболее редкие и интересные виды растений города. Почвенные условия произрастания растений резко различны для правобережной и левобережной частей города. В условиях правобережной части аборигенные почвы – серые лесные, в различной степени оподзоленные, суглинистые на карбонатных суглинках; на обнажениях выходят на дневную поверхность карбонатные породы (пестроцветные глины и мергели пермской системы татарского яруса); к этим обнажениям приурочены степные виды, а также сосны, играющие роль пионерных пород. Уровень грунтовых вод в нагорной части в большинстве мест находится на глубине свыше 10 м. В левобережной же части аборигенные почвы – супесчаные дерново-подзолистые, во многих местах заболоченные глеевые, или торфяно-глеевые. Уровень грунтовых вод во многих местах расположен на глубине не свыше 2 – 3 м.

Подобные условия способствовали тому, что во многих местах левобережья сохранились участки болот, в том числе торфяных, с интересной флорой. С другой стороны, нахождение левобережной части города в условиях зандровой равнины привело к распространению дюнно-буристого рельефа, что в сочетании с легко прогреваемыми супесчаными почвами способствовало распространению здесь степных видов. Таким образом, и экономико-географическое положение, и климатические, и почвенные условия способствуют разнообразию городской флоры.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

Впервые систематические ботанические исследования территории, которая теперь входит в городскую черту Нижнего Новгорода, начали осуществлять в начале 80-х гг. ХХ века ботаники-любители В.И. Раевский, И.М. Швецов и участники докучаевской экспедиции по обследованию земель Нижегородской губернии.

В.И.Раевский издал в 1884 г. книжку “Растения Нижегородской губернии”, где содержатся сведения и о растениях, собранных им в Н.Новгороде той эпохи и его близких окрестностях, т.е. территории современного города. Эти сведения уже в том же году были дополнены в его статье, опубликованной в сентябре в газете “Нижегородские губернские ведомости” в ее неофициальной части. В следующем году эта статья была опубликована В.И.Раевским в “ Трудах Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей”.

Данные В.И.Раевского наряду с собственными были использованы А.Р.Ферхминым в ботанической части “ Материалов к оценке земель Нижегородской губернии. Естественно-историческая часть. Нижегородский уезд”, которые были изданы в том же 1885 г. В части, относящейся к современной городской черте, автором приводятся сведения о флоре лесов окрестностей д. Кузнецихи, лесов и лугов окской Слуды.

В следующем году в тех же “ Материалах к оценке земель Нижегородской губернии. Естественно-историческая часть”, посвященных Балахнинскому уезду, П.А. Замятченский в очерке растительного покрова приводит сведения о флоре заречной части современной городской черты.

Что касается И.М.Швецова, начавшего экскурсировать по Нижнему Новгороду и его окрестностям с 1886 г., то он, к сожалению, не оставил после себя печатных трудов, но его ботанические находки, и, главное, его обширный превосходный гербарий (положивший начало, наряду с герарием естественно-исторического музея Нижегородского губернского земства, герарию кафедры ботаники Нижегородского госуниверситета), неоднократно использовались всеми исследователями флоры губернии.

В начале ХХ века Н.Новгород и его окрестности исследуют ботаники К.Е.Мурашкинский, Ф.С.Ненюков, Н.А.Покровский, И.П.Мазепа. Их, а также накопленные к этому времени данные других исследований были обобщены как в отдельных статьях, так и в изданном в 1909 г. ” Описательном каталоге естественно-исторического музея Нижегородского губернского земства. Вып. 2-й. Отдел ботанический; гербарий высших растений” и в 1911 г. в “ Дополнении” к этому каталогу.

В 1914 г. в небольшой заметке И.П.Мазепы, опубликованной в “ Отчете о деятельности специалистов департамента земледелия...” помещены сведения о флоре Шуваловского болота (территория современного Ленинского района). В двух заметках Ф.С.Ненюкова, помещенных в 1914 г. в “ Трудах Бюро по прикладной ботанике” и в 1915 г. в “ Вестнике русской флоры” упоминается о находках на территории города некоторых новых для его флоры растений.

Этот этап изучения растительного мира Н.Новгорода, длившийся до революции, мы, отчасти следуя Д.С.Аверкиеву, Е.В.Лукиной и А.Д.Смирновой (“История изучения флоры и растительности Горьковской области”// Ученые записки ГГУ, вып.90, сер. биологическая, 1968, с.105-113) называем земским, ибо и докучаевская экспедиция по оценке земель Нижегородской губернии работала у нас по приглашению Нижегородского губернского земства, и сборы местных ботаников поступали в гербарий естественно-исторического музея Нижегородского губернского земства (позднее этот гербарий поступил в гербарий кафедры ботаники Университета).

Именно в этот период и были сделаны самые замечательные флористические находки на территории Н.Новгорода. Это и открытие элементов соснового бора в Марьиной роще (телиптерис буковый, орляк, баранец, майник, костяника, кислица, три вида грушанок, ортилия, подъельник, черника, брусника, седмичник, фиалка Селькирка и вероника лекарственная и др.), и открытие таких же элементов на окской Слуде, и обнаружение произрастания в лесных оврагах нагорной части многорядника Брауна, подлесника европейского, лунника оживающего, венерина башмачка и других видов. На травянистых склонах были обнаружены ветреница лесная и чина бледноватая. Впервые также были указаны для города такие заносные, или одичалые культурные растения, как клевер мясокрасный, ромашка аптечная и расторопша.

Следующий этап мы, также отчасти следуя вышеупомянутым авторам, называем университетским, ибо в изучении флоры города основную роль сыграли сотрудники организованного после революции Нижегородского госуниверситета, хотя в ботаническом изучении города принимали участие и ученые других вузов. Кроме этого сборы всех ботаников поступали в гербарий кафедры ботаники Университета, являющийся единственным полноценным научным гербарием в Нижнем Новгороде и области. Ботаники, независимо от того, в каком вузе они работают, в своих исследованиях также опирались и опираются по сей день именно на университетский гербарий.

Первоначально экспедиционные обследования проводились под эгидой созданной в 1925 г. Комиссии по изучению производительных сил Нижегородской губернии, организовавшей многолетнюю Нижегородскую геоботаническую экспедицию. Разумеется, основные маршруты проходили не через территорию губернского центра, поэтому в трудах Комиссии имеется лишь одна работа по растительному миру Нижнего Новгорода - Д.С.Аверкиева 1928 г., частично опубликованная в 9 выпуске "Предварительного отчета о работе Нижегородской геоботанической экспедиции...", а полностью – в 1 выпуске "Ученых записок ГГУ" за 1935 г. В этой работе впервыедается геоботаническое описание Марьиной рощи с приведением списка растений.

С 1937 по 1963 гг. в "Трудах" и "Ученых записках" Пединститута начали публиковаться статьи М.М.Лапшина, посвященные систематике и географии злаков области. В этих статьях приводились местообитания всех видов злаков (по экземплярам из гербария кафедры ботаники Университета и личным находкам автора), в том числе и на современной территории Н.Новгорода.

В послевоенное время также, в основном, подвергались обследованию территории вдали от областного центра и мы имеем на этот период лишь работу В.Д.Аверкиева, посвященную изучению окской Слуды (работа эта была опубликована в 1954 г. в XXУ выпуске "Ученых записок" Пединститута) и небольшую статью Е.М.Кутыревой, посвященную находке, в том числе на территории города, нового вида гусиного лука – гусиного лука зернистого. Более интенсивному изучению подверглась территория города начиная с 70-х годов XX века. При областном Совете Всероссийского общества охраны природы стала работать секция охраняемых природных территорий, возглавляемая доцентами Университета: сначала А.Д.Смирновой, а затем Е.В.Лукиной. В работе секции принимали участие Н.И.Насонова (Ботанический сад Университета), В.В.Баулина (Инженерно-строительный институт), Ф.М.Баканина (Педагогический институт) и другие лица, в т.ч. автор этих строк. Были организованы полевые поездки членов секции как по области, так и по областному центру с целью выявления природных объектов, заслуживающих взятия их под охрану как памятников природы. На территории областного центра были выявлены и описаны, главным образом с ботанической точки зрения несколько парков, лесных массивов, озер и составлены их паспорта как памятников природы. Эта работа была подытожена в книгах В.В.Баулиной "Сады и парки Горьковской области"(1981), Ф.М.Баканиной, Е.В.Лукиной, Н.И.Насоновой, А.Д.Смирновой, Т.П.Селивановской "Заповедные места

Горьковской области”(1991), Ф.М.Баканиной и Е.В.Лукиной “Памятники природы города Нижнего Новгорода”(1997), Ф.М.Баканиной, В.П.Воротникова, Е.В.Лукиной, Б.И.Фридмана “Озера Нижегородской области”(2001).

С 80-х гг. начались исследования лесов Нижнего Новгорода и вообще городских и пригородных экосистем под руководством тогдашнего директора Ботанического сада Университета доцента А.К.Ибрагимова. Им и его сотрудниками были выявлены такие интересные феномены, как упрощение горизонтальной и вертикальной структуры лесных сообществ городских лесов и проникновение в них одичалых культурных и сорных растений, образовавших новые ярусы взамен выпавших и начавших играть важную роль в стабилизации лесных экосистем (точнее – метастабилизации, т.е. временной стабилизации). Было также выявлено массовое проникновение в город степных и даже пустынных видов и непосредственное соседство их, особенно в сосновых борах, с boreальными видами (феномен трансэкстразональности). Особое внимание было обращено на фитоценотическую роль лиан. Проникновение одичалых культивируемых лиан (девичий виноград, повой, переступень, тладианта, иглистый огурец) в заросли американского клена, на пустыри, в прибрежно-водные экосистемы привело к выводу о необходимости интенсивного использования этой группы растений в городском озеленении.

В работах доцента Университета В.П.Воротникова с соавторами исследовалась флора Слуды, а также был проведен общий анализ флоры города.

В 2005 г. вышел в свет второй том “Красной книги Нижегородской области”, где содержатся сведения и о растениях, произрастающих на территории Нижнего Новгорода.

В последнее время исследование видов рода Манжетка, в т.ч. и по территории города предпринял ботаник Университета А.В.Чкалов. В.П.Воротников и А.А.Шестакова (ННГУ) предприняли систематический обзор семейств Злаков, Осоковых и Ситниковых Нижегородской области, в т.ч. и по территории Н.Новгорода. Разносторонний натуралист М.В.Сидоренко (ННГУ) изучает распространение по городу редких растений.

В 2008 г. вышла в свет коллективная сводка «Экология Нижнего Новгорода» где в ряде глав дается описание флоры и растительности лесов, лугов, водоемов, парков города, приведен список редких и охраняемых растений на его территории.

Сотрудники кафедры ландшафтной архитектуры ННГАСУ предприняли изучение видового состава городского озеленения (О.П.Лаврова, Д.Б.Елистратова (Жесткова), Н.С.Пискарева, М.А.Коровина).

О.В. Тростина (ННГПУ) предприняла изучение синантропной флоры города.

В последнее десятилетие нами проводится интенсивное изучение флоры Нижнего Новгорода, как общего характера, так и специально посвященное сорным, культурным растениям и, с другой стороны, обследование труднодоступных уголков города, главным образом, в заречной части.

Нам представляется, что наиболее актуальными являются такие направления городской флористики, как изучение распространения по городу видов “трудных” родов Лапчатка, Манжетка, Очанка, Ситник, Спорыш, Ястребинка, Ястребиночка, изучение ассортимента культивируемых растений в массивах коллективных садов, изучение флоры труднодоступных заболоченных низин крайнего запада города в его заречной части.

БОТАНИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Чтобы уяснить себе особенности флоры Нижнего Новгорода, а также сходство его флоры с флорой других территорий европейской России, необходимо ознакомиться с его ботанико-географическим положением в системе флорогеографического районирования и в системе подразделений растительности европейской России (последнюю и называют собственно ботанико-географическим делением).

По карте флорогеографического деления европейской части СССР А. А. Федорова, приведенной в IV томе Флоры европейской части СССР, территории Н.Новгорода и его окрестностей относится к Голарктическому царству, Северо-Голарктической области, Евро-Сибирской подобласти, Европейской провинции, Прибалтийско-Волжско-Днепровскому округу. По своим флористическим особенностям территория города сходна с обширной территорией от Балтийского моря до Камы и от Онежского озера до Молдавии. Основа сходства - значительное распространение таких видов, как дуб, лещина, их травянистых спутников - пролесника, колокольчика широколистного, подмаренника душистого и др.

По ботанико-географическому районированию (т.е. по карте растительности) европейской части СССР, принятому в монографии "Растительность европейской части СССР" (1980), правобережная и левобережная части города входят в различные подразделения растительности. Правобережная часть входит в Среднерусскую подпровинцию, где преобладают широколиственные леса с небольшим участием ели. Подобная растительность распространена в полосе от Камы до западной границы России и от г. Владимира на севере до устья р. Припять на юге. Эта подпровинция входит в Восточно - Европейскую провинцию, Европейскую широколиственнолесную область и Голарктический доминион.

Левобережная часть города входит в Валдайско-Онежскую подпровинцию, где преобладают широколиственно - еловые леса (подтаежные). Подобная растительность распространена от Прибалтики до Урала и от берегов Финского залива на севере до Минска на юге. Эта подпровинция входит в Северо-Европейскую таежную провинцию и Евразиатскую таежную хвойнолесную область и в тот же Голарктический доминион.

Для Нижегородской области существует более детальное ботанико-географическое деление. По ботанико-географическому районированию области Д.С.Аверкиева (1954) правобережная часть города входит в Приокский дубовый подрайон, для которого характерно преобладание дубрав с примесью хвойных элементов. Этот подрайон входит в лесостепной район, занимающий всю правобережную часть области. Левобережная часть города входит в Балахнинско-Сейминский борово-болотный подрайон, для которого характерно сочетание, преимущественно, сосновых боров с торфяными болотами. Этот подрайон входит в район темнохвойных лесов, занимающий все пространство области к северу от Оки и Волги.

По лесорастительному районированию области К.К.Полуяхтова (1974) вся территория города входит в подзону смешанных лесов. Правобережная часть города входит в Окско-Волжский район с преобладанием дубрав, а левобережная часть - в Волго-Окский район с преобладанием хвойных лесов.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

В первые века существования Нижнего Новгорода, город, занимая территорию в пределах т.н. “Большого Острога”, т.е. внутри дуги ул. Ковалихинская – ул. Звездинка – ул. М. Покровская, оказывал, тем не менее, значительное влияние на окружающую территорию, поскольку город был окружен лугами и пашнями, а окрестные леса использовались для выпаса скота и заготовки древесины. Изучение карт города, рисунков современников и актовых документов показывает мозаичный характер роста города, характерный и для нашей эпохи: при росте города внутри городской черты оставались леса, луга, болота, сохранявшие прежние черты растительного покрова. Особенно это было характерно для заречной части, где промышленное и гражданское строительство можно было вести в немногих относительно возвышенных местах. Даже при сплошной мелиорации левобережной части городской территории, произведенной начиная с 40-х гг. XX в., оставались малопосещаемые людьми заболоченные леса и торфяники. В правобережной же части сохранению лесов и лугов способствовал рельеф местности: леса и луга сохранялись по кручам оврагов и речных берегов. Уже в XIV в. на территории современной городской черты располагались многочисленные селения; вплоть до конца XVII в. они были небольшими, не более 2 – 5 дворов. Тем не менее и относительно небольшой по площади средневековый Н.Новгород и селения его округи оказывали значительное воздействие на окружающие ландшафты: в результате выпаса скота и вырубок освещлялись леса, коренные породы заменялись березняками, осинниками, зарослями кустарников и, наконец, материковыми и поемными лугами. Внутри собственно городской территории существовали приусадебные огороды и сады, впервые отмеченные на плане города 1699г. Многочисленные пожары приводили к временному запустению отдельных участков городской территории и появлениюruderalных сообществ.

Близость к лесу приводила к тому, что на образовавшиеся пустыри заносились семена аборигенных видов деревьев и кустарников: дуба, липы, вязов, берез, осины, ив и т.д. Процесс этот продолжается и в наши дни. До сих пор в центральной старинной части города можно видеть выросшие самосевом могучие деревья возрастом не менее 150 лет и их возобновление и подрост. Одновременно близость к лесам приводила к тому, что в сады, огороды, на пустыри, в скверы, парки в массе проникали и продолжают проникать кустарниковые и травянистые лесные виды. К настоящему времени из сосновых боров проникли вейники, полевица тонкая, ястребиничка ползучая, дрок красильный, ракитник русский; из черноольшаников – крапива двудомная, из дубрав – сныть, овсянница гигантская, кострец поникший, элимус собачий, колокольчики крапиволистный и широколистный, петров крест, копытень, дремлик чемерицелистный, пальчатокоренник Фукса, любка двулистная. Особенно широко проникли в город опушечные виды, издавна произраставшие в лесах по обочинам звериных троп: мяталик годичный, спорыш птичий, будра плющелистная, одуванчик лекарственный, подорожник большой и другие. В XIX в. в городе начали распространяться парки, аллеи, посадочный материал для которых брали в окрестных лесах; это еще более способствовало самосевному распространению аборигенных видов растений на городской территории. В это же время в городе появляются облесенные кладбища, где в надмогильном озеленении начинают выращиваться всевозможные декоративные растения, как аборигенной флоры, так и интродуценты, отчасти дичающие. Особого же разнообразия флора кладбищ достигла уже в наше время. Именно на кладбищах преимущественно начал разводится можжевельник казацкий. Проникают на облесенные кладбища и аборигенные растения близлежащих лесов.

В начале XX в. в городе организуется служба городского агронома, в ведении которого находятся городские леса, выгонные земли, огороды, скверы и парки. Был организован питомник для выращивания посадочного материала для озеленения города, где наряду с аборигенными растениями области (клен платановидный, береза, липа и др.) выращивались и интродукенты: сосна сибирская, ель колючая, ель Энгельмана и т.д.

Близость к городской черте лугов, используемых как сенокосы и пастбища (даже на картах первой половины XX в. в пределах городской черты отмечена “выгонная городская земля”!) привело к тому, что на пустыри, в парки, скверы, в сады и огороды начали в массе проникать растения лугов: кострецы, костры, полевицы, мятылики, овсяницы, лисохвосты, ежа сборная, тимофеевка луговая и другие злаки; клевера, донники, лядвенец рогатый и т.д. В настоящее время многие пустыри олуговеваются, превращаясь в лугоподобные сообщества, с преобладанием сообществ ежи сборной. Лугоподобные сообщества преобладают в травянистых ярусах и многих парков и скверов

Значительное влияние на флору Нижнего Новгорода привело формирование его как крупного торгового, транспортного центра. Вместе с зерном сюда систематически заносились (помимо выросших из оброненных семян ржи, пшениц, овса, проса, ячменей, гречихи, льна) гречиха татарская, овсюги, рыжик льняной и другие. На зерновых пристанях, по обочинам дорог, а позднее – и по насыпям железных дорог в город начали проникать и сделались достаточно распространенными растения степей и пустынь: солянка, верблюдка, аксирис и другие виды.

Следует сказать, что в последние годы, в связи с заменой песчаных подушек железнодорожной колеи щебеночной, условия для произрастания растений на железнодорожных путях заметно ухудшились. Распространению в городе растений степной и пустынной флоры способствует возникновение пустырей, особенно песчаных пустырей в заречной части города, а также техногенных форм рельефа: желобетонных откосов берегов Оки и Волги, отвалов грунта, насыпей железных и шоссейных дорог. Хорошо прогреваемые солнечными лучами, они вполне пригодны для произрастания и даже самовозобновления многих заносных ксерофитов. Из этих сообществ они распространяются на боровые пустыри и в разреженные сосновые боры и культуры сосны в заречной части города.

Значительную роль в формировании флоры города сыграл Ботанический сад Университета, основанный в 1934 г., тем, что начал в массе поставлять городу для озеленения различные виды деревьев, кустарников и травянистых растений. Кроме этого именно с территории Ботанического сада в город мигрировали такие заносные растения, как недотрога мелкоцветная, такие одичалые культивируемые растения, как ромашка аптечная и другие. Аналогичную роль (но, главным образом, в отношении плодово-ягодных и кормовых растений) начал играть Сельскохозяйственный институт. Кроме этого, поскольку именно в пределах городской черты располагались и до сих пор располагаются поля его учебно-опытного хозяйства, с них происходит постоянная миграция дичающих культурных растений по городу. Из числа подобных растений в первую очередь надо отметить всевозможные злаки, в т.ч. сорго суданское, а также козлятник, вику мохнатую и вику посевную. В послевоенные годы на территории города начали в массе закладываться лесные культуры, особенно сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и тополей.

В это же время по оврагам, а позднее и по заболоченным местам в заречной части города начали закладывать массивы коллективных садов; одновременно по периферии города начали возникать новые поселки индивидуальной застройки с садами на приусадебных участках. Интенсифицируется озеленение города; появляются новые парки, скверы, аллеи и т.д. В массе распространилось и самодеятельное озеленение в палисадниках, осуществляющее самими жителями, причем не только

частных, но и коммунальных домов. Интересно, что при этом как декоративные использовались многочисленные представители местной флоры, попросту перекопанные из близлежащих лесов и лугов, или пощаженные из числа занесенных и выросших самосевом. До сих пор в качестве декоративных выращивают крупнолистные папоротники, гвоздики Фишера, травянку и песчаную, нивяник, душицу, чистяк, ветреничку лютичную и т.п. и даже пижму, чистец болотный и полынь высокую, перенесенные, или “убежавшие” из окрестных лесов и лугов. Одновременно началось культивирование в садах и огородах аборигенных растений, используемых как лекарственные (в большинстве случаев щадились и сохранялись случайно занесенные с торфом, или те, семена которых заносились ветром, или животными). Из числа таких видов до сих пор подобным образом используются валериана лекарственная, все виды зверобоя, мяты, душица и т.д. В результате разноса плодов культурных растений птицами, а отчасти ветром началось массовое проникновение одичалых плодово-ягодных и декоративных древесно-кустарниковых растений на пустыри, в парки и скверы, в разреженные леса и лесные культуры. Особенно интенсивно проникли в эти экосистемы ива волчниковая, ива пурпурная, клен американский, вяз малый, различные виды ирги, яблони, груши, кизильника, крыжовника, смородины и другие. Ива волчниковая интенсивно разрастается по берегам Оки и Волги, на песчаных пустырях, гибридизируя с ивой остролистной и образуя устойчивые сообщества. Что касается облепихи, то она образовала устойчивые кустарниковые сообщества на пустырях, техногенных отвалах. Клен же американский образовал на обнаженном субстрате (пески, обрывы, отвалы земли и т.п.) лесоподобные экосистемы. В связи с распространением в плановом и самодеятельном озеленении, а также в лесных культурах сосны лесной и ели обыкновенной (финской) их сеянцы обнаруживаются теперь по всему городу в разреженных лесах, зарослях кустарников, на обнажениях, заброшенных пашнях, пустырях и т.п. В связи с этим трудно установить естественный ареал сосны в нагорной части города и ели в заречной части города, т.к. невозможно понять, имеем ли мы дело с естественным самосевом, или вторичным одичанием этих видов. В особенности это касается сосен на окской и волжской Слудах, по склонам оврагов этих рек, елей в окрестностях поселков Торфопредприятие и Строителей в Сормовском районе. Из травянистых культивируемых растений в это время в массе одичали в условиях города и начали образовывать сообщества, или доминировать в своих ярусах на берегах водоемов, пустырях, парках, скверах и заброшенных посевах золотарник канадский, борщевик Сосновского, люпин многолистный, астра иволистная, недотрога железистая, фиалка душистая, плевел многолетний, райграс высокий; другие включались в сообщества пустырей, разреженных лугов, лесов, парков в качестве ассектаторов (гвоздика бородатая, ячмень гривастый, стенактис однолетний, повой вздутый, незабудка лесная и близкие к ней виды). Борщевик Сосновского оказался опасным сорняком, вредным и для здоровья человека (вызывает кожные аллергические реакции).

Особого внимания заслуживают факты проникновения одичалых культурных растений в прибрежно-водные экосистемы малых речек, почти сплошь загрязненных сточными водами. По их берегам в массе произрастают такие одичалые, в основном, из массивов коллективных садов, декоративные растения, как иглистый огурец, недотрога железистая, повой вздутый, астра иволистная. С другой стороны, именно в связи с ростом массивов коллективных садов, с озеленением улиц, разбивкой цветников началось интенсивное использования торфа как удобрения. Вместе с торфом в сады систематически заносились и заносятся жерушники, сердечники, вербейники, валериана лекарственная (во многих случаях сохранялась и сохраняется садоводами), горцы, кипреи, незабудки болотная и дернистая, осоки, чистец болотный, мягковолосник водный и ряд орхидных (пальчатокоренники Траунштейнера, Фукса, мясокрасный). В последние годы в связи с завозом в город при устройстве газонов

чернозема с юга области, распространился рапс, который на юге области является обычным одичалым культурным растением, циклахена дурнишниколистная, амброзия полыннолистная, - обычные рудеральные растения юга области.

Интересным является тот факт, что в палисадниках, на частных усадьбах все чаще начали высаживаться из комнатной культуры в открытый грунт на летний период тропические виды папоротников, молочаев, опунций, кактусов, фикусов, пальм, пеларгонии, алоэ, калланхое и т.п. Некоторые из них за это время интенсивно разрастаются вегетативно.

Интенсивные транспортные связи города привели к тому, что в последние годы в город начали в массе проникать и расселяться североамериканские растения колломия линейная, амброзия полыннолистная, циклахена дурнишниколистная и череда олиственная. Все они образуют сообщества. Интересно проникновение череды олиственной в экосистемы малых речек, где она разрастается на техногенных сплавинах из скоплений пластмассовых бутылей.

Начавшееся в послевоенные годы в больших масштабах дорожное строительство привело к тому, что вместе с речным песком в город в массе заносились и заносятся прибрежно-водные растения подбел ложный, клубнекамыш морской, тростник южный, смоловка лежачая, дербенники, пусторебрышник обнаженный, вероника длиннолистная, кирказон обыкновенный, съть бурая и др., встречающиеся по насыпям шоссе, тротуаров, трамвайных и железнодорожных путей. В тех случаях, когда песок брался из карьеров, расположенных вблизи сосновых боров и их дериватов, вместе с песком заносились вейник тростниквидный, полевица тонкая, дрок красильный, ракитник русский и т.п..

В 90-е годы XX века в связи с упадком сельского хозяйства, в т.ч. с сокращением пашни учебного хозяйства Сельхозакадемии, чьи земли расположены в пределах городской черты нагорной части города, наблюдается зарастание пашен березняками и ивняками, а также сообществами золотарника канадского. В это же время часть пахотных земель в городской черте отведена под строительство коттеджей с приусадебными садами.

Параллельно с ростом числа заносных и одичалых культивируемых растений сокращается число аборигенных видов, свойственных лесам. Часть из них исчезла под явным влиянием антропогенной нагрузки. Так, в связи с вырубкой сосновых лесков в Марьиной роще и на Слуде, осушению торфяного болота у Марьиной рощи там исчезли баранец обыкновенный, пушица стройная, пололепестник зеленый, ладьян трехнадрезный, кокушник длиннорогий, ятрышник шлемоносный, гнездовка настоящая, змеевик большой, звездчатка толстолистная, герань кроваво-красная. Из-за усиленного сбора на букеты по нашему мнению исчезли ветреница лесная, адonis весенний, исчезают купальница европейская, ирис сибирский и прострел поникший. Однако, ряд растений вымер, скорее всего, по естественным причинам, как находившиеся на границе своего распространения и произраставшие в немногих местах в небольшом числе экземпляров, недостаточных для успешного воспроизведения вида. К числу таких растений мы относим многорядник Брауна, голокучник Роберта, волчеягодник обыкновенный, подлесник европейский, горечавка перекрестнолистная, норичник крылатый. По этой же причине вымирает ветреничка дубравная.

По этой же причине у нас остаются редкими и произрастающими лишь спорадически такие адвентивные растения, как мачок рогатый, двурядник постенный, гулявник изменчивый, клоповник пронзеннолистный.

В то же время кажется совершенно непонятным резкое уменьшение численности таких в прошлом весьма обильных экземплярами видов адвентивных и рудеральных растений как подорожника ветвистого, мака самосейки, остицы лежачей и конопли посевной.

Подобные два противоположных процесса динамики флоры: распространение одних видов растений и исчезновение других характерно и для культивируемых видов. Наряду с сильным распространением в последние десятилетия облепихи, жимолости голубой, хеномелеса японского, розы морщинистой и многих других наблюдается исчезновение некоторых издавна культивируемых видов. Практически перестали выращиваться как наркотическое и декоративное табак деревенский, как пищевое и декоративное яблоня китайка и терн, как пищевое турнепс, сельдерей, гречиха посевная, просо обыкновенное, земляника мускусная, как кормовое клевер мясокрасный, как кормовое для птиц канареекник канарский. Из опасения набегов наркоманов резко уменьшилось выращивание как декоративного и пищевого мака снотворного.

В некоторых случаях наблюдаются колебания численности ряда видов. Например, в окрестностях Ботанического сада численность ветренички дубравной в отдельные годы резко падает и она кажется совершенно исчезнувшей, но затем это растение вновь обнаруживается.

В связи с динамикой флоры города встает и проблема охраны его флоры, как дикорастущей, так и культивируемой. В связи с этим мы возлагаем особые надежды на Ботанический сад Нижегородского госуниверситета, где накоплен значительный опыт культивирования и реинтродукции исчезающих дикорастущих видов растений и выращивания представителей культурной флоры.

ФЛОРА НИЖНЕГО НОВГОРОДА И ЕГО РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

(Роль отдельных видов растений в формировании растительных сообществ города)

Вопрос о том, какие виды растений какую играют роль в складывании растительных сообществ города, в формировании городских экосистем имеет не только научный, но и практический интерес, ибо позволяет дать научную основу городского озеленения. В пределах городской черты мы наблюдаем следующие экосистемы:

- лесные, представленные широколиственными лесами и их дериватами, сосновыми борами и их дериватами, смешанными сосново-широколиственными лесами и их дериватами;
- лесокультурные, к которым мы относим не только лесные культуры в обычном смысле этого слова (на территории города имеются культуры сосны, лиственницы, тополя бальзамического, дуба, ясения орехолистного), но и насаждения на площадях яблонь, а также двух – многорядные аллеи различных деревьев среди полей, лесов, лугов, в полосах отвода железных и шоссейных дорог (на территории Нижнего Новгорода имеются подобные аллеи, состоящие из дуба, сосны, лиственницы, различных видов тополей и аллеи смешанного состава);
- парки и скверы, т.е. насаждения различных деревьев и кустарников на площадях, специально предназначенных для отдыха (рекреации); в том случае, когда основу парка составляют естественные насаждения (остатки ранее существовавшего здесь леса), или когда процесс восстановления естественного растительного покрова в парке, или скверешел настолько далеко, что образовались участки с растительностью, не особо резко отличающейся от лесной, то подобную экосистему лучше назвать лесопарком;
- аллеи деревьев и кустарников по улицам, в т.ч. внутри территории предприятий и учреждений;
- палисадники, т.е. небольшие по площади, примыкающие к зданиям насаждения деревьев, кустарников, декоративных травянистых растений;
- газоны, т.е. участки, покрытые декоративными травянистыми растениями с преобладанием злаков;
- сады, т.е. площади, занятые плодовыми деревьями и кустарниками;
- огороды, т.е. площади, занятые овощными культурами; на практике на усадьбах поселков индивидуальной застройки и в массивах коллективных садов участки садов и огородов сочетаются друг с другом, однако, имея в виду, что, подобно тому, как в лесу эдификаторами растительного сообщества являются деревья, и сообщества именуются лесами, т.е. древесными, в массивах садов и на усадьбах эдификаторами экосистем являются плодовые деревья и поэтому мы и называем эти экосистемы садами, пусть даже огородные гряды занимают в них преобладающее место;
- пашни, в т.ч. сеянные луга;
- материковые и поэмные луга, в т.ч. луговины по обочинам железных и шоссейных дорог;
- пустыри, т.е. экосистемы, где преобладают растения типа сорных, или рудеральных; в обыденной жизни пустырями называют все “бросовые земли”, однако, если на отвалах земли, заброшенных полях, эродированных склонах преобладают многолетние злаки, или деревья, то подобные экосистемы лучше относить к луговым или лесным соответственно, сделав необходимую оговорку (лугоподобные, или лесоподобные);
- водные экосистемы озер, прудов, проточных водоемов, в т.ч. мелиоративных каналов;
- прибрежно-водные экосистемы тех же объектов;

- болота; в Нижнем Новгороде преобладают низинные болота, реже встречаются переходные.

Рассмотрим теперь, какие виды являются эдификаторами и доминантами различных ярусов различных растительных сообществ городских экосистем.

Леса Нижнего Новгорода представлены, во-первых, дубравами лещиново-снытевыми, лещиново-пролесниковые и лещиново-волосистоосоковыми. Во многих местах дуб сменился липой, кленом, реже ясенем вследствие отмирания старовозрастных деревьев из-за поражения дубовой пяденицей, а затем трутовиками, а возобновления – мучнистой росой. При этом подлесок не претерпел существенных изменений. В ряде мест лесообразующими породами являются береза и осина с сохранением упомянутого подлеска и травостоя. В заречной части дубравы имеют в подлеске как доминирующие бересклет, реже крушину, а в травянистом ярусе помимо вышеперечисленных видов часто доминируют элементы пойменного травостоя: кострец безостый, таволга вязолистная, а на сухих местах встречаются боровые элементы (дрок, грушанки, ракитник и т.п.). Дубравы, липняки, кленовники и их дериваты - березняки, осинники вблизи поселков индивидуальной застройки под влиянием выпаса скота деградированы. Древостой и подлесок изрежены, в травянистом ярусе доминируют бурьянные растения: крапива, бородавник, полыни и др. В случае дубравы на сухой гриве в поймах Оки и Волги в травянистом ярусе доминирует полевица тонкая. В ряде случаев следствием умеренной пастьбы скота, осветления леса является распространение в осветленных дубравах правобережной части города растений, свойственных более сосновым борам: вероники лекарственной, ястребинки волосистой, грушанок, майника, седмичника, кислицы, папоротника – орляка, произрастающих исключительно у подножия старых дубов и пней, обочинам троп, по эродированным склонам, сухим травянистым склонам и т.п. местам явно вторичного происхождения. Другим типом леса в заречной части являются сосновые боры. Они сильно деградированы под влиянием рекреации и выпаса скота. В первом древесном ярусе - значительна примесь березы и во многих местах на месте сосновых боров появились березняки с примесью сосны. Во втором древесном ярусе преобладает рябина, в кустарниковом ярусе – бузина, ирга, малина, в травянистом ярусе – полевица тонкая, вейники наземный и тростниковый. От исходных сообществ – боров – брусничников и черничников остались лишь вкрапления этих кустарничков и ряд других кустарников и травянистых растений. В сухих сосновых борах и дериватах дубрав по склонам с южной экспозицией и на сухих гривах в поймах Оки и Волги в результате пастищной и рекреационной нагрузки и последующего осветления распространяются степные растения: в борах наголоватка, полынь Маршалла, верблюдка, смолевка поникшая и др.; в дериватах дубрав: полынь Маршалла, ястребинка волосистая, дрок красильный и т.д. На возвышенных местах дериватов сосновых боров идет процесс восстановления естественного растительного покрова. Однако, при пастищной нагрузке в условиях неглубокого залегания грунтовых вод эти леса утратили способность к восстановлению естественного растительного покрова. В травостое там начала доминировать щучка, ставшая наряду с березой также эдификатором растительного сообщества в целом; в сообществе развивается заболачивание. Ряд дериватов сосновых боров в Канавинском районе содержит неморальные элементы (сныть, пролесник, чина весенняя, осока волосистая и т.п.).

Третьим типом леса являются черноольшаники, т.е. леса, где в первом древесном ярусе доминирует ольха черная. Расположены они по берегам водоемов как в нагорной, так и в заречной частях города. В подлеске доминирует черная смородина, ива пепельная или крушина, а в травянистом ярусе – крапива, являющаяся здесь естественно обитающей, или бодяк огородный, или таволга вязолистная. Распространены лианы: хмель, паслен сладко-горький.

Четвертым типом леса являются сообщества тополя черного и деревьев ив по берегам Оки и Волги. Из ив в древесном ярусе местами доминируют ива белая и ива ломкая. В подлеске доминируют ива пепельная, ива русская. В травянистом ярусе доминируют пойменные элементы: кострец безостый и полынь высокая.

Пятым типом леса являются сообщества березы повислой и ивы козьей на месте заброшенных сельхозугодий и в полосах отвода шоссейных дорог. Такие сообщества особенно распространены в нагорной части города. Подлесок здесь большей частью отсутствует, в травостое доминируют вейник наземный, золотарник канадский, в густых зарослях в разреженном травостое доминируют полевица тонкая, клевера, золотарник обыкновенный. По эродированным склонам с северной экспозицией в подобных сообществах распространяются представители боровой флоры: грушанки, ортилия и т.п.

Интересными являются лесоподобные сообщества клена американского, образованные большей частью на обнаженном субстрате (обрывах со смытой почвой, отвалах земли, заброшенных пашнях и т.п.). Первоначально это были монодоминантные сообщества, где роль подлеска выполнял подрост, а роль травянистого яруса – возобновление самого американского клена. Постепенно в заросли проникали и местные виды, сначала бурьянные, затем злаки (в ряде мест доминирует мятыник дубравный); в некоторые таких “леса” проникли и начали доминировать в травянистом ярусе сныть обыкновенная, дремлик чемерицелистный, а также одичалые культурные растения фиалка душистая и девичий виноград пятилисточковый, играющий здесь роль почвопокровной лианы. Наблюдается и произрастание под пологом американского клена клена платановидного, вяза гладкого, ясения американского. Лесоподобные сообщества американского клена по песчаным берегам Оки (наиболее развитые на острове Гребневские Пески в Канавинском районе и у Стригинского бора в Автозаводском районе) включают в качестве подлеска как доминирующие вяз гладкий, различные виды ив, а в травянистом ярусе доминируют пойменные элементы кострец безостый и полынь высокая.

Лесные культуры представлены преимущественно культурами сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, тополя бальзамического. В заречной части встречаются смешанные культуры сосны с ясенем орехолистным, с караганой древовидной. Возобновление сосны и лиственницы в массивах культур практически отсутствует (самосевные сосны и лиственницы в массе появляются на соседних пустырях с полуобнаженной почвой и на заброшенных пашнях), подлесок и травянистый покров формируются за счет соседних сообществ. В нагорной части города, где лесные культуры соседствуют с дубравами и их дериватами, в подлеске и травянистом покрове доминируют те же виды, что и в соседних дубравах. Интересным является проникновение в культуры тополей видов boreальной флоры: грушанок, ортилии, майника. В заречной части города в том случае, если культуры сосны закладывались на месте сосновых боров, или по соседству с ними, восстанавливается исходный тип леса. Если же культуры сосны закладывались по соседству с дубравами, подлесок и травянистый ярус оказываются идентичными соседним дубравам с тем лишь исключением, что в травянистом ярусе доминирование переходит от пойменных элементов (кострец, таволга и др.) к типично дубравным (овсяница гигантская, сныть и др.), ибо культуры сосны закладывались на более возвышенных, сухих местах. В том случае, если лесные культуры закладывались по соседству с пашнями, или выгонами, в травянистом ярусе преобладают бурьянные растения (крапива, бородавник и др.) а в подлеске – бузина красная. Если лесные культуры закладывались по соседству с массивами коллективных садов, в подлеске доминируют одичалые культурные виды – ирга, малина, крыжовник и др.

Многорядные аллеи вдоль железных, или шоссейных дорог состоят из различных видов деревьев и кустарников (береза повислая, вяз гладкий, карагана

древовидная и т.д.). Травянистый покров образован обычно бурьянными растениями, но в тех случаях, когда подобная аллея расположена неподалеку от дубравы, там восстанавливается растительный покров дубравы. Первоначально проникшие в аллею разные виды травянистых растений дубравы, разрастаясь вегетативно, образуют мозаику из участков чистых зарослей, позднее здесь образуется травянистый покров, очень близкий по структуре к травянистому покрову обычной дубравы (в верхнем его ярусе доминируют колокольчики, бор развесистый, сныть, в среднем ярусе – лютик кашубский, пролесник, а в нижнем - копытень).

Луга и в нагорной, и в заречной частях города представлены по преимуществу сообществами с доминированием ежи сборной, а на травянистых склонах и в поймах Оки и Волги – с доминированием костреца безостого. Реже встречаются сообщества с доминированием вейника наземного, овсянницы луговой, мяты лугового, пырея ползучего, полевицы тонкой, щучки дернистой (последние только на заболоченных лугах, в т.ч. и в пойме р. Рахмы в Советском районе). На лугах по склонам с южной экспозицией и по сухим гравиям в поймах Оки и Волги распространены степные виды: таволга обыкновенная, типчак, реже овсянница овечья, ясколка полевая, мытник Кауфмана, прозанник и др. Сюда же проникли представители боровой флоры: ястребиничка волосистая, дрок, ракитник и др. Растростворены заболоченные луга с доминированием двукисточника, тростника, камыша лесного, переходящие в низинные болота, а в заречной части и в переходные.

Образование сообществ растений на пустырях на обнаженном субстрате начинается с появления неустойчивых сообществ с доминированием самых различных сорных иrudеральных растений, как однолетних – марей, лебеды, солянки, верблюшки, горцов, костров, мяты лугового годичного и т.д., так и многолетних – пырея ползучего, крапивы двудомной, чертополохов, бодяков, спорышей, полыней и т.д. Иногда в травостое доминируют одичалые культивируемые растения: золотарник канадский, люпин многолистный, вечерница обыкновенная, топинамбур, недотрога железистая и др. Одновременно появляются всходы деревьев и кустарников, в основном, американского клена. Далее сценарий динамики развития растительного покрова может развиваться по шести направлениям. Во-первых, могут образоваться существующие неопределенно долго сообщества такого бурянного растения, как одичалый золотарник канадский. Во-вторых, могут образоваться также существующие неопределенно долго сообщества такого злака, как вейник наземный. В-третьих, могут образоваться лесоподобные сообщества клена американского. В-четвертых, могут образоваться сообщества аборигенных деревьев: березы, осины, различных видов ив. В этих случаях идет постепенное образование растительности лесного типа, с ярусами кустарниковым (подлеском) и травянистым. В тех случаях, когда пустырь (заброшенная пашня) расположен рядом с культурами сосны или лиственницы, особенно с наветренной стороны, наряду с березами, осинами, ивами часто образуются сообщества самосевных сосен и, реже, лиственниц (или же эти деревья участвуют в образовании сообществ наряду с березами, ивами, осинами). В-пятых, могут образоваться луговые сообщества, могущие при сенокошении и выпасе скота также существовать неопределенно долго. В настоящее время мы наблюдаем на пустырях образование лугоподобных сообществ с доминированием ежи сборной и, реже, пырея ползучего. Подобные лугоподобные сообщества постепенно, с проникновением бобовых (клевера, люцерны, вики) переходят в настоящие луга; окончательное формирование луга мы связываем с появлением манжеток. В-шестых, могут образоваться существующие неопределенно долго сообщества одичалой облепихи, где в травянистом ярусе доминирует вейник наземный.

Низинные болота в Нижнем Новгороде распространены почти исключительно в заречной части, где они образуют обширные площади, перемежаясь с мелиоративными каналами, речками и озерами. Преобладают сообщества рогоза широколистного,

тростника южного, камышей лесного и укореняющегося, отсутствующего в нагорной части города. Болота переходного типа распространены исключительно в заречной части. Эдификатором этих сообществ являются виды мха сфагнума. Здесь распространены сообщества, где в верхнем ярусе доминируют ива пепельная, в кустарниковом ярусе – багульник, в ярусе кустарничков – клюква. В окрестностях поселка Торфопредприятие (Московский и Сормовский районы) полосы сообществ сфагнума, где имеется лишь травянистый ярус с доминированием пушиц, перемежаются с гривами, где распространены сообщества сосны и ивы пепельной; в травянисто-кустарничковых ярусах – мозаика разросшихся куртинок клюквы, багульника и других растений комплекса торфяных болот. По левобережным склонам с южной экспозицией долин речек Юлы и Дубенки изредка встречаются у выходов грунтовых вод сообщества тростника с пушицей широколистной, дремликом болотным, осокой желтой и близмусом.

Прибрежно-водные экосистемы распространены по всему городу, но характер их различен в нагорной и заречной частях города. По берегам прудов и речек нагорной части распространены сообщества рогоза широколистного, тростника южного, изредка – камыша лесного, недотроги железистой. По берегам рек, озер и мелиоративных каналов заречной части помимо этих сообществ встречаются располагающиеся поясами один за другим сообщества сабельника болотного, ситняга игольчатого, двукисточника тростникового, манников большого и плавающего, камыша укореняющегося, осоки вздутой, осоки пузырчатой и ложносытевой, камыша озёрного (перечисление сообществ здесь дается в порядке частоты встречаемости, а не в порядке расположения поясов!). Части сплавины сабельника болотного, белокрыльника болотного. По берегам Оки и Волги, реже – озер заречной части встречаются сообщества клубнекамыша морского, сыти бурой, различных видов череды, в т.ч. череды олиственной.

Экосистемы поверхности водоемов всюду заняты сообществами рясок и многокоренника; в заречной части встречаются сообщества телореза алоэвидного и водокраса лягушачьего; водная толща всюду занята сообществами элодеи канадской и роголистника темнозеленого; в водах Оки и Волги у берегов, а также в водоемах заречной части доминируют различные виды рдестов; в ряде мелиоративных каналов – различные виды пузырчаток.

В связи с охраной редких и исчезающих видов растений встает проблема охраны тех растительных сообществ, где эти растения произрастают. В настоящее время в Нижнем Новгороде охраняются лесные массивы, включающие и торфяные болота, водоемы и парки. Однако, ряд редких видов произрастает на лугах, в том числе остепненных. В связи с этим необходимо сохранить от возможной застройки луга по Слуде, левобережным склонам с южной экспозицией речек Дубенки, Рахмы, Юлы, ручьев Грабиловского и Кузнецехинского. Умеренный выпас скота и сенокошение являются обязательным элементом сохранения этих лугов.

Итак, пограничное ботанико-географическое положение, различные физико-географические и экономико-географические условия, процессы динамики флоры обусловили с одной стороны, пестроту растительного покрова, а с другой стороны – появление на территории Нижнего Новгорода уроцищ со сходной флорой и растительностью. Это и дает основания для ботанико-географического районирования (деления) Нижнего Новгорода.

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Различные условия рельфа, увлажнения, почвенно-геологические условия, а также деятельность человека оказывают сильное влияние на характер распределения флоры и растительности на территории города (см. Схематическую карту растительности Нижнего Новгорода). Учитывая, поэтому, не только само распределение флоры и растительности, но и физико-географические условия, а также деятельность человека, мы делим территорию Нижнего Новгорода на два ботанико-географических района, каждый из которых включает в себя несколько подрайонов. Точно так же, как и ботанико-географическое деление области Д.С.Аверкиева и лесорастительное деление области К.К.Полуяхтова, наше ботанико-географическое деление города основывается на распределении, прежде всего, коренной растительности и флоры (т.е. является не чисто флорогеографическим) и отражено на Схематической карте ботанико-географического деления Нижнего Новгорода.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН, располагающийся почти полностью (за исключением северо-восточной части) в долине реки Оки, на абсолютных высотах 71-86 м, где на супесчаной почве в условиях близкого залегания грунтовых вод произрастает луговая пойменная растительность, пойменные дубравы, по понижениям - болотная и прибрежно-водная растительность. На прирусловом валу р. Оки, на песчаных гривах среди болот, на возвышенных местах центральной окской поймы и 1 и 2 надпойменных террас произрастают сосновые боры и их дериваты с оステнными элементами. Значительное место занимают культуры сосны, где во многих местах восстанавливается естественный растительный покров сосновых лесов различных типов. По всему подрайону распространены массивы коллективных садов. Флористическая особенность этого района, отличающего его от Правобережного района – произрастание сосны как лесообразующей породы, естественное произрастание ели, массовое распространение можжевельника, брусники, черники, произрастание голубики, клюквы, росянки, багульника, андромеды, болотного мирта, ив лапландской, черниковой и филиколистной, куманики, наголоватки васильковой, дивалы многолетней, прострела (сон-травы) и других видов растений, главным образом, гипоарктической, бореальной и степной флоры. Этот район мы делим на 5 подрайонов.

1. Приволжский пойменный подрайон. Занимает северо-восточную часть Сормовского района от Волги до линии селений Дарьино-Копосово-Высоково и северо-восточную часть Московского района (Бурнаковская низина). Расположен на центральной и притеррасной поймах Волги. Подрайон занят пойменными лугами, пойменными дубравами и их дериватами, лесными культурами, а также прибрежно-водной растительностью по берегам и водной - в воде Волги и пойменных озер. Имеются массивы коллективных садов. Здесь расположен памятник природы Копосовская роща. Дубравы содержат элементы сосновых боров: майник, дрок красильный, ракитник, грушанки и др., а также элементы флоры пойменных лугов (кострец безостый, таволга вязолистная, птармика (тысячелистник) иволистный, бубенчик лилиелистный и др.). Есть представитель степной флоры – жестер слабительный. На возвышенных участках поймы среди лугов произрастает редкая в городе серая ольха; в травостое встречаются редкие в городе виды ирис сибирский, серпуха венечная, козлобородник подольский; в пойменных озерах – леерсия рисовидная, кувшинка чистобелая и др. Дубравы восточной части подрайона (Бурнаковская низина) сильно деградированы выпасом скота и рекреацией. Из собственно дубравных элементов здесь произрастают только дуб и сныть, из боровых элементов – дрок, ракитник и ландыш. Наличие серой ольхи, жестера, бубенчика лилиелистного и леерсии рисовидной составляет флористическую особенность

данного подрайона, отличающего его от прочих подрайонов заречной части города. Наличие ириса сибирского – флористическое отличие данного подрайона от всех прочих подрайонов города.

2. Южно - окский подрайон сосновых боров на высоком прирусловом валу и возвышенных участках центральной поймы Оки в пределах Автозаводского района. Здесь сохранились высокоствольные сосновые боры (это и составляет особенность растительности данного подрайона, отличающую его от всех прочих подрайонов города), их дериваты; имеются культуры сосны и лиственницы. Сосновые боры включают в себя ряд степных элементов (прострел поникший, келерия сизая, полынь Маршалла и др.). В его пределах расположены памятники природы Стригинский бор, Малышевские грибы, Гнилицкие дачи.

3. Западно-окский подрайон пойменных дубрав в долине Оки. Занимает почти всю территорию Автозаводского и Ленинского районов, а также восточные части Московского и Канавинского районов на первой надпойменной террасе р. Оки. Преобладают дубравы и их дериваты, что и составляет особенность растительности данного подрайона. Дубравы, особенно на севере Автозаводского района, содержат значительные количества элементов боровой (дрок красильный, грушанки, майник, брусника и др.) и луговой пойменной флоры (кострец безостый, птармика иволистная, таволга вязолистная и др.). Имеются культуры сосны. В подрайоне распространены массивы коллективных садов. На севере Автозаводского района имеется торфяное болото с росянкой и ивой лапландской. Парки (Автозаводский, "Дубки", "им. 1 Мая") содержат многочисленные остатки широколиственной флоры. В пределах подрайона располагаются памятники природы Таланова роща, Гнилицкие дачи, Смирновские дачи, Доскинские дачи, Малышевские грибы, лесопарк к югу от ул. Монастырки.

4. Борово-болотный подрайон на 1 и островках 2 надпойменной террасы долины р. Оки в пределах Сормовского, Канавинского и Московского районов (в северо-восточной части первая надпойменная терраса Оки переходит в первую надпойменную террасу Волги, которая до слияния с Окой имеет в пределах города только одну надпойменную террасу; вторая надпойменная терраса Оки не прислонена к первой, а островками вложена в нее). Для него характерно сочетание небольших участков сосновых боров и их дериватов и культур сосны с торфяными болотами, мелиоративными каналами и озерами. Имеются также массивы коллективных садов. Сосновые боры, боровые пустыри и культуры сосны остеинены (келерия сизая, наголоватка васильковая, гвоздика песчаная и др.). На торфяных болотах произрастает комплекс: росянка, багульник, подбел, клюква, болотный мирт и др. Наличие этих степных и гипоарктических видов и составляет флористическую особенность данного подрайона. На западе подрайона встречается ель. Имеются представители флоры широколиственного леса (дуб, бересклет, сныть и др.). В озерах произрастает кувшинка чистobelая.

На севере подрайона, на северо-западе Сормовского района произрастают имеющие здесь восточную границу своего распространения острокильница чернеющая, ракитник Цингера, дрок германский, также составляющие флористическую особенность данного подрайона. Здесь располагается памятник природы Железнодорожные дачи (Канавинский район), леса бывшего Балахнинского лесхоза в пределах города, болото Белое, болота в окрестностях пос. Торфопредприятие.

5. Подрайон антропогенных ландшафтов по левому берегу Оки и на Стрелке. Подрайон полностью занят вторичной растительностью на искусственно созданной (намытой) первой надпойменной террасе по левому берегу Оки. Здесь распространены песчаные пустыри, поросшие ивами, тополями, сообществами с полынью высокой (это составляет особенность растительности данного подрайона, отличающей его от других подрайонов Левобережья); встречаются самосевные сосны, дрок красильный, келерия

сизая и другие представители боровой флоры. По берегам затонов Оки, Мещерского озера - прибрежно-водная растительность. Подрайон занимает северо-восток Канавинского, восток Ленинского и северо-восток Автозаводского районов. В подрайоне имеется два лесопарка на притеррасной пойме Оки – по ул. Голубева и ул. Фучика.

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН (другое весьма распространенное название – нагорная часть города), где на возвышенном плато (3 надпойменная терраса правых берегов Оки и Волги), на абсолютных высотах 97-199 м, на суглинистой почве в условиях расчлененного рельефа произрастают дубравы, их дериваты, суходольные луга, а в долинах малых рек и по берегу Оки и Волги - прибрежно-водная растительность. Флористическая особенность данного района, отличающего его от Левобережного – произрастание хохлаток, ветреницы дубравной, зубянки, гусиного лука желтого и краснеющего, вяза шершавого, осоки желтой, дремлика болотного, тайника, пальчатокоренника мясокрасного, троммсдорфии крапчатой и других видов, в основном, неморальной и степной флоры. Район делится на четыре подрайона.

1(6). Подрайон антропогенных ландшафтов правых берегов Оки и Волги, на искусственно созданной (намытой) первой надпойменной террасе. Преобладает растительность, как в 5 подрайоне, с тем отличием, что имеются многочисленные представители флоры широколиственного леса (дуб, вяз и др.). В последние годы здесь распространились самосевные сосны, дрок красильный и одичалые облепиха и ива волчниковая. В подрайон входит и участок центральной поймы Волги на полуострове Печерские Пески, занятый сообществами тополя черного, ивняками, вязовниками, поемными кострецовыми лугами; полуостров значительно замыт песком для создания городского пляжа. Здесь распространяются самосевные сосны, ели, такие представители боровой флоры, как ландыш, грушанка круглолистная, встречаются горошек двулетний, язвенник крупноголовый. Флористической особенностью подрайона, отличающего его от всех прочих является произрастание здесь в водах Волги каулинии малой. От прочих подрайонов нагорной части города данный подрайон сверх того отличается произрастанием многих водных и прибрежно-водных растений, как-то: дягиля лекарственного, леерсии рисовидной, рдеста плавающего, скрытниц, полевички волосистой и т.п.

2(7). Подрайон Окско-волжской Слуды. Крутые высокие берега Оки и Волги, имеющие три террасы (на верхней, третьей располагается вся правобережная, нагорная часть города) заняты дубравами и их дериватами, лугами с примесью пойменных и степных элементов (бубенчик лилиелистный, кровохлебка, кострец безостый, шалфей остепненный и др.). В пределах окской слуды имеются массивы коллективных садов. Кое-где встречаются сосны, а на Малиновой Гряде в недавнем прошлом произрастили ели. По оврагам и склонам с северной экспозицией встречаются представители хвойных лесов (телиптерис буковый, пузырник ломкий, грушанки, майник и др.). Флористической особенностью подрайона, отличающего его от других подрайонов города является наличие лунника оживающего, колокольчика болонского, чесночницы черешковой, лилии саранки, резака, бутеня ароматического и других видов растений, в основном неморальной и степной флоры. От других подрайонов нагорной части города данный подрайон отличается сверх того произрастанием ракитника русского. Здесь располагаются памятники природы Малиновая Грязь, Слуда; непосредственно к окской Слуде примыкает парк “Швейцария”, к волжской – Александровский сад, через проспект Гагарина - Александровские дачи. Подрайон занимает приречные части Нижегородского, Советского и Приокского районов.

3(8). Приокский дубово-сосновый подрайон. Занимает большую часть Приокского района к югу от линии ул. Терешкова - Анкудиновское шоссе - лесная дорога на Анкудиновку. Здесь среди дубрав и их дериватов, а также на пустырях и среди жилых массивов произрастают сосны и их травянистые спутники (грушанки,

майник и др.). Дериват соснового бора паркового типа имеется в окрестностях пос. Луч. В подрайоне имеются культуры сосны и лиственницы, дающие обильный самосев по соседним лугам и заброшенным пашням. В окрестностях пос. Ляхово и пос. Луч в дериватах дубрав произрастает можжевельник. По склонам с южной экспозицией встречаются оstepненные луга. На востоке подрайона имеются поля сельхозкультур; многочисленны также массивы коллективных садов. В подрайоне располагаются памятники природы Ботанический сад, дубрава в его окрестностях (по Анкудиновскому шоссе), Щелоковский хутор, лесопарк Александровские дачи, парк Швейцария. Флористической особенностью подрайона, отличающей его от прочих подрайонов города, является произрастание здесь ветренички дубравной, заразихи эльзасской, живучки женевской, мытника Кауфмана, льна слабительного, белозора болотного, троммсдорфии крапчатой и других видов, в основном неморальной и степной флоры; от других подрайонов нагорной части города данный подрайон отличается сверх того наличием здесь старовозрастных самосевых сосен, изредка имеющих возобновление.

4(9). Центральный правобережный подрайон дубрав. Занимает большую часть Советского и Нижегородского районов и север Приокского района. Преобладают дубравы и их дериваты. Дубравы содержат травянистые спутники хвойных лесов, как в предыдущем подрайоне; кроме них в дубраве Марьина роща произрастают брусника и черника, наличие которых составляет флористическую особенность данного подрайона, отличающего его от других подрайонов Правобережья. От всех других подрайонов города данный отличается произрастанием поручейницы водяной. По склонам с южной экспозицией встречаются оstepненные луга. Подрайон является наиболее освоенным, здесь имеются значительные массивы коллективных садов; на крайнем его востоке имеются обширные луга и поля сельхозкультур, тем не менее, в скверах, парках, в озеленении жилых кварталов, в полезащитных лесополосах, лесных культурах, среди различных древесно-кустарниковых пород значительное место занимают дуб, липа, вязы, клен, лещина и другие представители широколиственных лесов, которые успешно возобновляются самосевом. Здесь располагаются памятники природы Марьина роща и Щелоковский хутор.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УРОЧИЩ ГОРОДА С РЕДКОЙ ДИКОРАСТУЩЕЙ И КУЛЬТИВИРУЕМОЙ ФЛОРОЙ.

1. Леса бывшего Балахнинского лесхоза на территории Н.Новгорода в Сормовском и, отчасти, Московского районах. В составе уроцищ представлены сосновые боры (вейниковые, брусличники, черничники, ландышевые), боровые пустыри, б.ч. оステненные, культуры сосны (вышеперечисленная растительность расположена на 1 и 2 надпойменных террасах Оки и 1 надпойменной террасе Волги), пойменная растительность по берегам Волги, речек и озер. Имеются массивы коллективных садов. Из редких и охраняемых на территории города видов здесь произрастают степные виды тимофеевка степная, овсянница Беккера, полевица виноградниковая, гвоздика песчаная, гвоздика Борбаша, гвоздика пышная, песчанка Сырейщикова, ракитник Цингера, острокильница чернеющая, дрок германский, прострел раскрытый, герань кроваво-красная, ластовень ласточкин, горечавка легочная, василек раскидистый, василек сумский, наголоватка васильковая, дивала многолетняя, толокнянка, зимолюбка зонтичная, а также редкие в городе водные виды леерсия рисовидная, кубышка желтая и кувшинка чистобелая. В различных типах древесных насаждений, главным образом культур сосны, распространяются одичалые яблони, вишни, смородины, ирга и др.

2. Болото Белое в пос. Копосово. Торфяное болото переходного типа расположено в карстовой воронке на 1 надпойменной террасе Волги у подножия останца 2 надпойменной террасы. Здесь произрастают такие редкие и охраняемые в городе виды, как клюква болотная, береза приземистая, болотный мирт, багульник болотный, пушицы.

3. Копосовская роща, единственный б.-м. сохранившийся в Н.Новгороде участок пойменной дубравы по Волге, находящийся в центральной и притеррасной пойме Волги. Преобладают дубравы бересклетово-снытевые с обилием пойменных и болотных элементов (кострец безостый, птармика иволистная, василистники, дудник, рогоз, ирис желтый и др.) и присутствием боровых элементов (дрок красильный, ястребиночка аптечная, мерингия бокоцветная и др.). В отличие от нагорных дубрав здесь отсутствуют все виды весенних эфемероидов. Дубравы на гравиях сопутствуют с поенным лугами (кострецовье, вейниковые сообщества) сильно засоренными бурьяном. В понижениях – пойменные озера с сообществами манников, тростника, рогоза. Имеются культуры тополей. Здесь произрастают редкие и охраняемые в городе виды бубенчик лилиевистный, ольха серая, ирис желтый и ирис сибирский. Имеется жестер слабительный – единственное место произрастания в заречной части города.

4. Торфяное болото в окрестностях пос. Торфопредприятие Московского района; болото переходного типа непосредственно примыкает к лесным массивам Балахнинского лесхоза. Расположено на первой надпойменной террасе Оки. Характерен грядовый рельеф: на грядах – дериваты сосновых боров-брусличников, заболачивающиеся, а в понижениях между грядами – торфяные болота, частично выработанные и вновь заторфованные. Здесь произрастают редкие и охраняемые в городе представители гипоарктической и бореальной флоры: росянка круглолистная, клюква болотная, багульник, болотный мирт, подбел, пушицы, береза приземистая, ива лапландская, а также голубика, куманика и свидина белая, плауны. В мелиоративных каналах, где наблюдается интенсивный процесс заболачивания как сплавиной, так и со дна, произрастают редкие и охраняемые в городе виды рдест альпийский и хвостник болотный, а в заболоченном лесу по соседству - пальчатокоренник Траунштейнера и подъельник.

5. Железнодорожные дачи, расположенные на 1 и островках 2 надпойменных террас Оки, представляют собой сочетание остатков высокоствольных сосновых боров, культур сосны, где идет интенсивный процесс восстановления естественного

растительного покрова (б.ч. боров – брусничников), смешанных сосново-широколиственных лесов и их дериватов с примесью ели, болот и озер. Из числа элементов широколиственной флоры здесь произрастают только сньть, фиалка удивительная, чина весенняя, копытень, пролесник многолетний, лютик кашубский, осока волосистая. Здесь произрастают такие редкие и охраняемые в городе виды, как ива черниковидная, береза приземистая, голокучник Роберта, а в водах озер – кувшинка чисто белая и кубышка желтая. В сосновые боры и культуры сосны проникли одичалые культурные растения: яблони, груши, сливы, вишни, смородины, кизильники, клен американский, ясень орехолистный и т.д.

6.и 7. Смирновские и Доскинские дачи, расположенные на 1 надпойменной террасе Оки, представляют собой сочетание наиболее хорошо сохранившихся высокоствольных дубрав в заречной части с культурами сосны и лиственницы, посадками декоративных деревьев и кустарников, болот и озер. Преобладают дубравы бересклетово-сnyтевые и бересклетово-волосистоосоковые с обилием пойменных, болотных и боровых элементов, аналогичных дубравам Копосовской рощи. Виды дубравных элементов более многочисленны и включают все те, что встречаются и в нагорных дубравах, за исключением хохлаток, гусиного лука желтого и зубянки. Дубравные элементы широко проникли в культуры сосны и лиственницы, самосев в которых незначителен. Здесь произрастают редкие и охраняемые в городе виды: адокса мускусная, фиалка Ривиниуса, костер ветвистый, овсянница лесная, куманика, подъельник, ирис желтый, щавель прибрежный, кубышка желтая, кувшинка чистобелая, росянка и ива лапландская. Изредка в культурах сосны и, отчасти в дубравах, встречаются одичалые яблони, ирги, вишни, смородины, барбарис обыкновенный.

8. Леса у пос. Нагулино на 1 надпойменной террасе Оки. Сочетание дубрав, культур сосны и сосновых боров с озерами и болотами. Растительность и представители редкой флоры аналогичны таковой для Смирновских и Доскинских дач.

9. Таланова роща и Гнилицкие дачи на первой надпойменной террасе Оки и участках высокой поймы Оки. Сочетание изреженных пойменных дубрав (преобладают дубравы сnyтево-сорноразнотравные), культур сосны, тополей, посадок декоративных деревьев и кустарников, сосновых боров (вейниковых), озер и болот. Из редких и охраняемых в городе видов здесь произрастают фиалка Ривиниуса, щавель прибрежный, кубышка желтая, ирис желтый, подмаренник Рупреxта. В культурах сосны и сосновых борах одичали ирги, яблони, вишни, смородины.

10. Стригинский бор на высокой пойме Оки. Рельеф дюнно-буగристый. Наиболее сохранившиеся участки высокоствольных сосновых боров (в основном вейниковых и тонкополевичных) в сочетании с культурами сосны, дубравами, заболоченными участками. Из боровых и бореальных элементов здесь сохранились на фоне злаковых сообществ брусника, черника, майник, кислица, седмичник, грушанки, дрок, ракитник, папоротник орляк. Из редких и охраняемых в городе видов здесь произрастают степные виды прострел раскрытый, ластовень ласточкин, василек сумский, полынь Маршалла, овсянница Беккера, полевица виноградниковая, а также гипоарктические пушицы. В массе встречаются одичалые вишни, сливы, яблони, боярышники, смородины, ирги, кизильник, барбарис обыкновенный, пузыреплодник, водосбор, брюннера, гвоздика бородатая и т.д., проникшие не только в культуры сосны, но и в разреженные сосновые боры.

11. Малышевские гривы. Представляют собой сочетание разреженных, деградированных выпасом дубрав (исходный тип – дубравы бересклетово-сnyтевые) с культурами сосны, насаждений различных древесно-кустарниковых культур, остатками сосновых боров на высоком прирусловом валу Оки и на ее высокой пойме, лугов и озер. Здесь произрастают редкие в городе виды: кубышка желтая, ирис желтый, сньть бурая, коровяк черный, ива пурпурная; здесь одно из немногих мест

произрастания значительных зарослей одичалой облепихи. Из редких интродуцированных видов здесь произрастают аморфа кустарниковая и груша уссурийская, дичающие.

12. Лесопарк к югу от ул. Монастырки. Расположен на высокой пойме Оки. Представляет собой разреженные участки старовозрастного дубняка снытевого с культурами березы повислой, вяза гладкого, лиственницы сибирской, тополя бальзамического, декоративных кустарников, участков лугов. В дубняках из типично дубравной флоры отмечены сныть, чистяк, ветреничка лютичная, фиалка удивительная, земляника мускусная. Здесь же одичалые облепиха, кизильник блестящий, розы собачья и морщинистая, различные плодовые деревья и кустарники. Единственное место произрастания в заречной части города астрагала солодкового и фиалки дубравной.

13. Марьина роща и Щелоковский хутор. Одни из наиболее хорошо сохранившихся в городе участков высокоствольных дубрав. Преобладают дубравы лещиново-снытевые и их дериваты; встречаются волосистоосоковые и пролесниковые. В них – полный набор широколиственной флоры, в т.ч. – весенних эфемероидов. По склонам оврагов с северной экспозицией встречаются представители бореальной флоры: грушанки, майник, седмичник, телиптерис буковый, голокучник трехраздельный, кислица. Здесь произрастают такие редкие в городе растения, как костер ветвистый, овсянница лесная, фиалка Ривиниуса, норичник крылатый, недотрога обыкновенная, скерда болотная, пальчатокоренник Фукса, мятылик расставленный; имеется единственное в нагорной части города местообитание черники и брусники. В заболоченной низине на южной окраине произрастают редкие в городе близмус сжатый, пушица широколистная, пальчатокоренник мясокрасный. В водах озер произрастают редкие в нагорной части города сусак зонтичный, рдест пронзеннолистный, манник большой.

14. Дубравы и остепненный луга в окрестностях Ботанического сада ННГУ. Одни из наиболее хорошо сохранившихся в городе высокоствольных дубрав. Преобладают дубравы лещиново-снытевые, волосистоосоковые и пролесниковые и их дериваты (как и в предыдущем случае имеется полный набор широколиственной флоры и дубравных эфемероидов), имеются культуры ив и тополей, а также сосны и лиственницы с обильным самосевом по соседним лугам и заброшенным пашням. Сами эти лесные культуры в нижних ярусах целиком заняты растительностью дубрав. По склонам оврагов с северной экспозицией встречаются представители бореальной флоры: майник, грушанки, телиптерис буковый, голокучник трехраздельный. Здесь произрастают редкие в городе растения: ветреничка дубравная, адокса мускусная, башмачок настоящий, любка двулистная, кострец ветвистый, овсянница лесная, фиалка Ривиниуса, скерда сибирская, скерда болотная, редкий в дубравах орляк обыкновенный. В окрестностях Ботанического сада одичали ель, ольха серая, ива пурпурная, ива волчниковая, магония падуболистная, барбарис обыкновенный, кизильники черноплодный и блестящий, пузыреплодник калинолистный, рябинник рябинолистный, свидинашелковистая, несколько видов яблонь, роз, ирги, смородин и боярышников, волжанка обыкновенная, рейноутрия сахалинская, девясил гигантский, чина черная, ежевика аллеганская, малина душистая, гвоздика бородатая, телекия красивая, встречающиеся по опушкам лесов и в разреженных лесах и лесных культурах. Встречаются наиболее мощные в нагорной части города самосевные сосны с диаметром ствола до 1 метра. По остепненным лугам на левобережных склонах долин р. Дубенки и р. Грабиловского с южной экспозицией в сообществах костреца безостого, овсяницы луговой произрастают такие редкие и охраняемые в городе виды, как золототысячник, мытник Кауфмана, тимофеевка степная, кострец приречный, тайник яйцелистный, колокольчик болонский, ясколка полевая, живучка женевская. По опушкам – астрагал солодковый, астрагал нутовый. Ниже по склонам по

заболоченным местам - заразиха эльзасская, осока желтая, скерда болотная, пущица широколистная, пальчатокоренник мясокрасный, дремлик болотный, мытник болотный, кокушник длиннорогий, купальница европейская.

15. Малиновая гряда. Представляет собой поросший дубравами и их дериватами (исходный тип – дубрава лещиново-снытевая), культурами тополей, а также луговой растительностью крутой правый берег Оки от южной границы города до Мызинского моста. Здесь произрастают такие редкие и охраняемые в городе растения, как башмачок настоящий, тайник яйцелистный, любка двулистная, любка зеленоцветная, ольха серая, лен слабительный, белозор болотный, дягиль, герань Роберта, скерда сибирская; имеется единственная в городе высокоствольная роща ясеня высокого, а также встречается дикорастущий кизильник черноплодный.

16. Леса в окрестностях пос. Луч. Расположены в долине р. Ройки, левобережного притока р. Кудьмы. Представляют собой низкорослые порослевые насаждения – дериваты дубняков волосистоосокового и снытевого, которые в балках сменяются дериватами черноольшаников. Представлены культуры сосны, поросшие представителями широколиственного леса. Из редких в городе растений здесь произрастают волчаягодник обыкновенный, хохлатка промежуточная. Одно из двух мест (второе - заросли липняка у пос. Ляхово) произрастания в нагорной части города можжевельника. По травянистым склонам произрастают самосевные сосны. Дериват соснового бора паркового типа находится по склону левого берега р. Ройки у пос. Луч.

17. Окская Слуда. Крутой склон правого берега Оки к северу от Мызинского моста, занятый дубравами и их дериватами (исходный тип – дубрава лещиново-снытевая), лугами (сообщества костреца безостого, овсяницы луговой, мятыника лугового) с признаками остепнения. Произрастают пойменные элементы (спаржа лекарственная, кирказон обыкновенный, кровохлебка лекарственная, валериана и др.). Встречаются остатки садов бывших здесь когда-то поселков, ныне снесенных. Здесь произрастают такие редкие в городе растения, как лунник оживающий, бубенчик лилиелистный, адокса мускусная, тайник яйцелистный, дремлик болотный, ятрышник шлемоносный, бутень ароматический, дягиль лекарственный, резак обыкновенный, колокольчик болонский, ленец полевой, шалфей остепненный, шалфей мутовчатый, резеда желтая, коровяк черный, язвенник крупноголовый, вязель разноцветный, дикорастущий кизильник черноплодный, заросли одичалых облепихи, розы сизой и розы бедренцелистной, а также заросли ракитника русского, единственные в нагорной части города. В последние годы распространяются самосевные сосны и дрок красильный. По склонам оврагов с северной экспозицией изредка встречаются представители бореальной флоры: грушанки, майник, седмичник.

18. Волжская Слуда. Крутой правый берег Волги, поросший такой же растительностью, как Окская Слуда. Из редких и охраняемых в городе видов здесь произрастают лилия - саранка, колокольчик болонский, резак обыкновенный, шалфей остепненный, ластовень ласточкин, башмачок настоящий, воробейник лекарственный, дикорастущий кизильник черноплодный. Распространены самосевные сосны, а из боровых элементов – ландыш, иногда доминирующий в травянистом покрове.

19. Луга по склонам с южной экспозицией в левобережной части долины р. Юлы у пос. Мордвинцево. Здесь в остепненных сообществах костреца безостого и овсяницы луговой произрастают редкие в городе троммидорфия крапчатая, живучка женевская, а ниже по склону в заболоченных местах лен слабительный, белозор болотный, близмус сжатый, пальчатокоренник мясокрасный, дремлик болотный, осока желтая.

I. Кремлевский парк. В нем произрастают такие редкие в городе интродуцированные растения, как рододендрон даурский, лжетсуга Мензиеса, можжевельник казацкий и другие. В липняке на северном склоне произрастают самые

мощные на территории города деревья ясения высокого и липы европейской с диаметром ствала до 90 см.

II. Сквер на пл. Горького. Из редких интродуцированных видов растений здесь произрастают сумах-скумпия, орех манчжурский, роза сизая, бархат амурский

III. Парк университетского городка на просп. Гагарина. Его основу составляют аллеи лиственницы сибирской, туи запалной, посадки плодовых деревьев груш и яблонь, различных роз, спирей. Здесь произрастают такие редкие в городе интродуцированные виды растений, как тамарикс, роза сизая, роза мягкая, гордовина канадская, лох серебристый, груша уссурийская и др.

IV. Парк сельхозакадемии. Его основу составляет заброшенный плодовый сад, где распространился американский клен, отчасти восстанавливается естественное аборигенное сообщество – дубрава. Имеются аллеи тополей, елей, сосен разных видов. Из редких интродуцированных видов здесь произрастают черемуха поздняя, ель Энгельмана, сосны сибирская и веймутова, семь видов тополей, бархат амурский, клен явор, головчатка Литвинова, сильфий пронзеннолистный и др.

V. Центральный сормовский парк. Основу его составляют дериваты пойменной дубравы в понижении и сосняка на дюнно – бугристом рельефе. В дериватах дубравы имеются такие представители неморальной флоры, как липа, вяз гладкий, клен платановидный. В дериватах сосняков произрастают такие боровые виды, как полынь Маршалла, келерия сизая, ракитник русский. Здесь произрастают такие редкие в городе интродуцированные растения, как бирючина, карагана кустарниковая, ирга цветущая, спирея ниппонская, кизильник черноплодный, райграс высокий и другие. Многие из них одичали. Парк ценен сохранившимися старовозрастными сосновами и дубами возрастом свыше 100 лет. У сосен и дубов имеется возобновление. По берегам озера в парке произрастает редкая в городе ива филиколистная

VI. Парк им. 1 Мая. Его основу составляют аллеи сосен, берез, тополей. Единственное место произрастания в городе интродуцированного вида - клена сахаристого, дающего самосев.

VII. Парк "Дубки". Единственный из парков города, сохранивший флору дубрав (дуб, липа, вяз гладкий, клен платановидный, лещина, жимолость лесная, бересклет, овсянница гигантская, сныть, хохлатка промежуточная, ветреничка лютичная, гусиный лук желтый и др.). Сохранились старовозрастные дубы возрастом свыше 100 лет. Имеется обильный самосев и разреженный подрост широколистенной древесно-кустарниковой флоры и интродуцентов. Распространены манжетки, редкие в других парках города. Распространяется орхидея дремлик чемерицелистный.

VIII. Центральный автозаводский парк. Его основу составляют аллеи берез, лип, кленов, лиственниц, ясеней. Из редких интродуцированных видов здесь произрастают каталыпса бигнониелистная, малиноклен душистый, лох серебристый, рябина гибридная, пихта сибирская и другие.

IX. Лесопарк на ул. Фучика на притеррасной пойме Оки. Представляет собой сочетание остатков пойменной дубравы (сохранились старовозрастные насаждения дубов и вязов) с присущей им флорой с культурами тополей. Имеются насаждения различных декоративных древесно-кустарниковых пород (боярышники, спиреи, жимолости, яблони, розы).

X. Лесопарк на ул. Голубева на притеррасной пойме Оки. Представляет собой старовозрастное насаждение ивы белой, под пологом которой произрастает еще 5 видов ив, свидина, лещина, груша, пузыреплодник, чубушник и др. Из редких в городе растений здесь встречены дягиль лекарственный и мятыник расставленный.

X1. Сквер на пл. Советской. Из редких интродуцированных растений здесь произрастают дейция шершавая, фонтанезия Форчуна, яблоня пурпурная, снежная ягода западная, сибирка алтайская и другие.

X11. Ботанический сад Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского. На территории Сада имеется полночленная, отлично сохранившаяся «эталонная» дубрава лещиново-снытевая, имеется липняк лещиново-олосистоосоковый, самосевные старовозрастные сосны, самый обширный по площади в городе луг с сообществами ежи сборной, овсяницы луговой, полевицы тонкой на плакоре. Из числа редких и охраняемых в городе аборигенных видов здесь естественно произрастают астрагалы солодковый и нутовый, адокса мускусная, скерда сибирская, гусиный лук краснеющий, пальчатокоренник Фукса, любка двулистная, тайник яйцелистный; кроме этого здесь культивируется ряд редких и охраняемых в городе аборигенных видов (лилия саранка, лунник оживающий, ветреничка лесная, острокильница чернеющая и другие). Что касается редких в городе интродуцированных видов, то все они произрастают здесь и ряд из них дичает, или разрастается вегетативно (аморфа, наперстянка пурпурная, подснежник, белоцветник, телекия, жимолость каприфоль, бересклет Форчуна, подбел японский, головчатка Литвинова, сильфий пронзеннолистный и т.д.).


X111. Сквер у Научно-исследовательского института измерительных систем. Из числа редких интродуцированных видов там произрастают пираканта кроваво-красная, роза мягкая. Интересно произрастание там же искусственного насаждения дуба возрастом около 20 лет, В рощице имеется естественное возобновление дуба, липы, рябины, осины, вяза гладкого, калины. Рядом – остатки вишневого сада и культура ясения орехолистного.

XIV. Лесопарк Александровские дачи. Представляет собой сочетание разреженных участков дубравы волосистоосоковой с примесью старовозрастных сосен, с аллеями сосен, тополей, куртинами декоративных кустарников на территории расположенных там различных учреждений. Из редкой аборигенной флоры города там встречаются адокса, вяжечка, кострец ветвистый. Из редкой интродуцированной флоры там произрастают серая ольха, лапчатка кустарниковая, бархат амурский.

XV. Парк «Швейцария». Представляет собой сочетание аллей различных древесных и кустарниковых пород, в том числе сосен, что редко встречается в городских парках, ясеней американских, берез, лиственниц сибирских, лип, вязов.. Из числа редких интродуцированных растений там произрастают дуб красный, бирючина, аморфа (все три вида дичают).

XVI. Парк областной психиатрической больницы в пос. Ляхово. Имеются старовозрастные лиственницы сибирские, европейские и Гмелина, березы, липы, бальзамические, лавролистные и белые тополя. Интересно произрастание на луговинах манжеток, редких в городских парках.

**СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДЕЛЕНИЯ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА**



— — — границы города

— — — границы административных районов города

— · · — границы ботанико-географических подрайонов

Цифрами на карте обозначены номера ботанико-географических подрайонов:

1 — приволжский пойменный,

2 — южно-окский

3 — западно-окский

4 — борово-болотный

5 — антропогенных ландшафтов левобережья Оки и Стрелки

6 — антропогенных ландшафтов правобережья Оки и Волги

7 — окско-волжской Слуды

8 — приокский дубово-сосновый

9 — центральный правобережный


**СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА**



- — границы уроčищ; Ⓛ — лиственные леса (дубравы и их дериваты);
- † — сосновые леса и культуры сосны; ↑ — примесь ели в лесах;
- Ⓐ — массивы коллективных садов; Ⓜ — парки и скверы;
- — луга, в т. ч. сеянные, посевы кормовых культур; с — степные элементы;
- ⊕ — облесенные кладбища; Ⓝ — поселки индивидуальной застройки с садами на приусадебных участках;

Примечание: белый фон карты в пределах городской черты, лишенный обозначений — кварталы многоэтажной жилой или промышленной застройки.

**СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
УРОЧИЩ С РЕДКОЙ АБОРИГЕННОЙ И ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ ФЛОРОЙ**



Уроцища, богатые редкой аборигенной флорой:

1 – леса б. Балахнинского лесхоза; 2 – болото Белое; 3 – Копосовская роща; 4 – болото у пос. Торфопредприятие; 5 – Железнодорожные дачи; 6 – Смирновские дачи; 7 – Доскинские дачи; 8 – лес у пос. Нагулино; 9 – Таланова роща и Гнилицкие дачи; 10 – Стригинский бор; 11 – Малышевские гривы; 12 – Лесопарк к югу от ул. Монастырки; 13 – Марьина роща и Щелоковский хутор; 14 – дубрава в окрестностях Ботанического сада; 15 – Малиновая грязь; 16 – леса в окрестностях пос. Луч; 17 – окская Слуда; 18 – волжская Слуда; 19 – луга у пос. Мордвинцево.

Уроцища, богатые редкой интродуцированной флорой:

I – парк Кремля; II – сквер на пл. Горького; III – парк университетского городка; IV – парк сельхозакадемии; V – центральный Сормовский парк; VI – парк им. 1 мая; VII – парк «Дубки»; VIII – центральный Автозаводский парк; IX – лесопарк по ул. Фучика; X – лесопарк по ул. Голубева; XI – сквер на пл. Советской; XII – Ботанический сад; XIII – сквер у НИИС; XIV – лесопарк «Александровские дачи»; XV – парк «Швейцария».

**СПИСОК ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ АБОРИГЕННОЙ ФЛОРЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, ИЛИ В
ЕГО БЛИЖНИХ ОКРЕСТНОСТЯХ ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В НАШЕМ
РЕГИОНЕ.**

Ниже помещаются в том порядке, в каком они располагаются в Конспекте флоры Н.Новгорода, наименования видов растений, имеющих в нашей области границы своего распространения, проходящие через территорию Н.Новгорода, или его ближние окрестности.

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. (Голокучник Роберта). Северная граница.

Sparganium angustifolium Michx. (Ежеголовник узколистный). Северная граница.

Zannichellia palustris L. (Занникеллия болотная). Западная граница.

Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. (Каулинния малая). Северная и восточная границы.

Alopecurus arundinaceus Poir. (Лисохвост тростниковидный). Северная граница.

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. (Коротконожка лесная). Северная граница.

Bromopsis ramosa (Huds.) Holub (Кострец ветвистый). Северная граница.

Koeleria delavignei Czern. ex Domin. (Келерия Делявина). Северная граница.

Milium effusum L. (Бор развесистый). Северная граница.

Poa bulbosa L. (Мятлик луковичный). Северная граница.

P. compressa L. (Мятлик сплюснутый). Северная граница.

Blysmus compressus (L.) Panz. (Близмус сжатый). Северная граница.

Carex flava L. (Осока желтая). Северная граница.

C. sylvatica Huds. (О. лесная). Северная граница.

Gagea erubescens (Bess.) Roem. (Гусиный лук краснеющий). Северная граница.

G. granulesa Turz. (Г.л. зернистый). Северная граница.

Lilium martagon L. (Лилия саранка). Северная граница.

Polygonatum multiflorum (L.) All. (Купена многоцветковая). Северная граница.

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo (Пальчатокоренник Траунштейнера). Южная граница.

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. (Любка зеленоцветная). Северная граница.

Salix phylicifolia L. (Ива филиколистная). Южная граница.

Thesium arvense Horvat (Ленец полевой). Северная граница.

Axyris amaranthoides L. (Аксирис щирицеватый). Восточная граница.

Arenaria syreitschikovii P. Smirn. (Песчанка Сырейщикова). Южная граница.

Scleranthus perennis L. (Дивала многолетняя). Восточная граница.

Anemonoides nemorosa (L.) Holub (Ветреничка дубравная). Южная граница.

Batrachium kaufmannii Krecz. (Батрахий Кауфмана). Южная граница.

Corydalis intermedia (L.) Merat (Хохлатка промежуточная). Северная граница.

Fumaria schleicherii Soy-Willem (Дымянка Шлейхера). Северная граница.

Dentaria quinquefolia Bieb. (Зубянка пятилисточковая). Северная граница.

Erophila verna (L.) Bess. (Веснянка весенняя). Северная граница.

Lunaria rediviva L. (Лунник оживающий). Северо-западная граница.

Cotoneaster melanocarpa Fisch. (Кизильник черноплодный). Северная граница.

Astragalus cicer L. (Астрагал нутовый). Северная граница.

Chamaecytisus zingeri (Nenuk.) Klaskova (Ракитник Цингера). Северная граница.

Genista germanica L. (Дрок германский). Восточная граница.

Lathyrus tuberosus L. (Чина клубненосная). Северная граница.

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. (Острокильница чернеющая). Восточная граница.

Vicia biennis L. (Горошек двулетний). Северная граница.
Lavathera thuringiaca L. (Хатьма тюрингенская). Северная граница.
Viola riviniana Reichenb. (Фиалка Ривиниуса). Северная граница.
Epilobium hirsutum L. (Кипрей мохнатый). Северная граница.
Falcaria vulgaris Bernh. (Резак обыкновенный). Северная граница.
Fraxinus excelsior L. (Ясень обыкновенный). Северная граница.
Lithospermum officinalis L. (Воробейник обыкновенный). Северная граница.
Ballota nigra L. (Белокудренник черный). Северная граница.
Phlomis tuberosa L. (Зопник клубненосный). Северная граница.
Thymus serpyllum L. (Тимьян обыкновенный). Северная граница.
Lathraea squamaria L. (Петров крест чешуйчатый). Северная граница.
Pedicularis kaufmannii Pinsger (Мытник Кауфмана). Северная граница.
Scrophularia umbrosa Dumort. (Норичник крылатый). Северная граница.
Veronica incana L. (Вероника седая). Восточная граница.
V. spuria L. (В. метельчатая). Северная граница.
Utricularia intermedia Hayne (Пузырчатка промежуточная). Южная граница.
Lonicera caerulea L. (Жимолость голубая). Южная граница.
Campanula bononiensis L. (Колокольчик болонский). Северная граница.
Bidens radiata Thuill. (Череда лучистая). Южная граница.
Echinops sphaerocephalus L. (Мордовник круглоголовый). Северная граница.
Onopordum acanthium L. (Татарник колючий). Северная граница.

СПИСОК ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ АБОРИГЕННОЙ И АДВЕНТИВНОЙ ФЛОРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЙДЕННЫХ ПОКА ТОЛЬКО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, ИЛИ В ЕГО БЛИЖНИХ ОКРЕСТНОСТЯХ.

Ниже приводится список видов растений, произрастающих в Нижегородской области, но пока найденных только на территории областного центра, или в его ближних окрестностях.

Cripsis alopecuroides (Pill. et Mitt.) Schrad. – Скрытница лисохвостниковая.

C. schenoides (L.) Lam. – С. камышевидная.

Cynosurus cristatus L. – Гребневик обыкновенный.

Setaria verticillata (L.) Beauv. – Щетинник мутовчатый.

Scirpus supinus L. – Камыш раскидистый.

Juncus minutulus V.Cretz. et Gontsch. – Ситник маленький.

Bassia sedoides (Pall.) Aschers. – Бассия очитковидная.

Kochia schrenkiana (Moq.) Пијн. – Кохия Шренка.

Gypsophila perfoliata L. – Качим пронзенолистный.

Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolf – Мачок рогатый.

Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник плотноцветковый

Coronilla varia L. – Вязель разноцветный.

Lathyrus pallescens (Bieb.) C. Koch. – Чина бледноватая.

Trigonella caerulea Serg. – Пажитник голубой.

Geranium pyrenaicum Burm. fil. – Герань пиренейская.

Caucalis lappula (Hoff.) DC. – Прицепник липучковый.

Cuscuta campestris Yunck. – Повилика равнинная.

Collomia linearis Nutt. – Колломия линейная.

Echium biebersteinii Locaite – Синяк Биберштейна.

Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth. – Тригонотис длиннорожковый.

Veronica persica Poir. – Вероника персидская.

Centaurea diffusa Lam. – Василек раскидистый.

КОНСПЕКТ ФЛОРЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ВВЕДЕНИЕ

Флора Нижнего Новгорода (за исключением территории Ботанического сада, требующего специального рассмотрения) насчитывает около 1600 видов растений, относящихся к отделам Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковые, Голосеменные и Покрытосеменные.

С одной стороны, она может рассматриваться как "конкретная флора" одного из пунктов подзоны смешанных лесов. С другой стороны, она может рассматриваться как результат взаимодействия флор двух ботанико-географических районов (см. раздел Ботанико-географическое положение Нижнего Новгорода). Кроме этого она может рассматриваться как результат взаимодействия трех процессов: распространения культивируемых растений, в том числе и распространяющихся спонтанно, дичающих, или натурализующихся (в это понятие мы включили спонтанно разрастающихся вегетативно и распространяющихся семенами, дающими самосев) и включающих в различные городские экосистемы; востановления естественного растительного покрова, в т.ч. распространения аборигенных лесных растений в парках, скверах, лесополосах и т.п. искусственных экосистемах, а также в техногенных ландшафтах типа насыпей железных дорог; распространения различных заносных растений, играющих рольrudеральных.

Исходя из этих представлений, мы и включили в Конспект флоры Нижнего Новгорода не только аборигенные, но и культивируемые в открытом грунте (пусть даже с предварительной выгонкой в парнике, или теплице, или пересаживаемые на лето из комнатной культуры!), а также сорные иrudеральные виды.

Деятельность человека на территории города приводит к интенсивной динамике флоры в каждом уголке города и итоговой, хотя и значительно менее интенсивной динамике флоры всего города. Поэтому конспект флоры необходимо периодически пересоставлять. Это позволит, тем самым, вести и одну из составляющих мониторинга городской территории.

Основу для конспекта флоры составили наши личные наблюдения, а также данные, накопленные уже пятью поколениями наших ботаников (первая сводка, где были учтены и растения Н.Новгорода это "Растения Нижегородской губернии" В.И.Раевского, изданная в Н.Новгороде в 1884 г.). Несмотря на это, мы столкнулись с тем, что сведения о флоре города весьма скучны; в основном, это касается таких трудных для исследования родов, как Боярышник, Горец, Дурнишник, Кипрей, Лапчатка, Манжетка, Очанка, Роза, Ситник, Спорыш, Фиалка, Ястребинка и Ястребинка. Поэтому нашу работу следует рассматривать как провизорную.

Поскольку в нижегородской ботанической литературе уже есть две подобных работы: "Флора окрестностей Пустынской биостанции Нижегородского университета" В.П.Воротникова с соавторами (Н.Новгород, 1994) и "Сосудистые растения Керженского заповедника: аннотированный список видов" Н.М.Решетниковой и С.П.Урбановичюте (Москва, 2000), то список видов оформлен по образцу этих работ; в частности, порядок расположения семейств (по системе Энглера) и родов и видов (по алфавиту латинских названий) точно такой же. Номенклатура, синонимика и объем видов приведены в соответствие с томами серии "Флора европейской части СССР" - "Флора восточной Европы". В тех немногих случаях, когда в этом издании произрастающие на территории Н.Новгорода виды не упомянуты, название культурных видов приводиться по сводкам «Декоративные растения СССР» и «Декоративные травянистые растения для открытого грунта» (см. список литературы), а дальневосточных – по томам серии «Сосудистые растения Советского Дальнего Востока». Использовалось также и последнее, 10 издание «Флоры» П.Ф.Маевского. В некоторых случаях приведены и синонимичные названия растений, под которыми они

упомянуты в определителях Д.С. и В.Д. Аверкиевых и П.Ф.Маевского. Это должно облегчить работу с нашей сводкой.

Считаем возможным указать, что сосудистые растения, учтенные в нашем конспекте флоры Н.Новгорода, относятся к 139 семействам. Из этих семейств 36 (Актинидиевые, Амарилловые, Анакардиевые, Аралиевые, Барбарисовые, Бегониевые, Бигнониевые, Буддлеевые, Вербеновые Виноградовые, Воднолистниковые, Гортензиевые, Даваллиевые, Кактусовые, Канновые, Каперсовые, Капуциновые (Настурциевые), Коммелиновые, Конскокаштановые, Кутровые, Лаконосные, Лобелиевые, Лоховые, Магнолиевые, Шизандровые, Никтагиновые, Ореховые, Пионовые, Рутовые, Самшитовые, Свинчатковые (Кермековые), Суриановые, Тамариксовые (Гребенщиковые), Тисовые, Тыквенные и Хамамелисовые) представлены только культивируемыми видами, отчасти находящимися на различных стадиях натурализации. 37 семейств (Адоксовые, Аронниковые, Баранцовые, Белозоровые, Болотниковые, Вахтовые, Водокрасовые, Волчеядодниковые, Горечавковые, Грушанковые, Ежеголовковые, Занникеллиевые, Заразиховые, Истодовые, Крапивные, Мареновые, Монотроповые (Вертляницевые), Наядовые, Нимфейные, Плауновые, Повиликовые, Пвойничковые, Пузырчатковые, Рдестовые, Рогозовые, Росянковые, Рясковые, Сальвиевые, Сандаловые, Ситниквидные, Ситниковые, Сланоягодковые, Сусаковые, Ужовниковые, Хвостниковые, Хвощевые, Частуховые) представлены только дикорастущими и пока не использующимися в культуре видами. Остальные 66 семейств представлены как культивируемыми, так и дикорастущими видами, причем часть видов относится к обеим категориям.

Нами учтен 1561 вид и стабильно воспроизводящийся межвидовой гибрид (гибридогенный вид). Кроме этого в примечаниях указано еще около 50 видов, которые трудно отличимы от учтенных (некоторые экземпляры учтенных видов имеют их явные признаки, но этого, по нашему мнению, недостаточно для увереной идентификации) и произрастание которых является проблематичным. Из них 585 видов культивируются, причем многие находятся на различных стадиях натурализации и число последних растет год от года. Так, в последнее время наметилась натурализация видов родов Чубушник, Нарцисс, Лилейник и пр. 121 вид является заносным, причем некоторые из них одновременно являются культивируемыми (Овсяница тростниковая, Плевелы, Костры и пр.). Остальные являются аборигенными, отчасти культивируемыми (березы, ясень высокий, черемуха обыкновенная и пр.). Разумеется, наш подсчет является приблизительным, ибо относительно многих видов, в основном, степных, трудно решить, являются они аборигенными с изменчивыми границами в пределах Н.Новгорода, или же заносными. Это относиться к целому ряду степных видов (Гулявник волжский, Двурядник постенный, Мятлик луковичный, Резеда желтая и пр.). Относительно других видов трудно решить, являются ли они на территории города в малонарушенных местах аборигенными, или же одичальными культивируемыми (свидина белая, кизильник черноплодный, жимолость голубая и пр.). Кроме этого списки видов родов Лапчатка, Манжетка, Ястребинка, Ястребиночка, Очанка, Спорыш являются провизорными и вообще территория города подлежит дальнейшему интенсивному ботаническому изучению; к тому же в Н.Новгороде постоянно обнаруживаются новые виды растений, в т.ч. и аборигенной флоры. Тем не менее мы считаем наши подсчеты, пусть приблизительные, полезными для анализа флоры.

О структуре конспекта флоры. После названия вида указано распространение по городу, во многих случаях - по административным районам. Сокращения: Авт. - Автозаводский, Кан. - Канавинский, Лен. - Ленинский, Моск. - Московский, Ниж. - Нижегородский, Приок. - Приокский, Сов. - Советский, Сорм. - Сормовский. Далее указана принадлежность к географическим элементам флоры. Сокращения: Гипоаркт. - гипоарктический, т.е. более свойственный тундре и лесотундре, Бор. - boreальный, т.е. более свойственный тайге, Нем.- неморальный, т.е. более свойственный подзоне

широколиственных лесов и, отчасти, лесостепи и подзоне смешанных лесов, Степ. - степной. В эту категорию мы включили виды южно-боровые, сарматские, т.е. свойственные лесостепи, понтические, т.е. свойственные настоящим южным степям европейской России и северо-казахстанские (терминология географических элементов взята нами в том смысле, какой им придавал В.В.Алехин). Среднеевр. - среднеевропейские, т.е. имеющие в нашей, или в сопредельных областях восточную границу своего распространения. Сиб. - сибирские, т.е. имеющие в нашей, или в сопредельных областях западную границу своего распространения.

Следует отметить, что многие растения принадлежат не одному, а нескольким элементам флоры, будучи распространены в различных природных зонах и подзонах и различных географических странах. Вообще принадлежность к географическому элементу флоры зависит от объема рассматриваемой территории. Мы рассматриваем в нашем конспекте географические элементы флоры только восточной Европы. Если же выйти за рамки этой территории, то можно обнаружить, что вид относится и к другим элементам. Например, багульник относится к гипоарктическим и бореальным видам, а сверх того - к палеоарктическим, т.е. принадлежащим к зоне тундр всей Евразии. Зубянка принадлежит и к неморальным элементам, и к субатлантическим и т.п.

Для определения принадлежности вида к тому, или иному географическому элементу флоры, мы воспользовались прямыми указаниями на это в томах "Флоры Кавказа" А.А.Гроссгейма, в монографиях "Растительность европейской части СССР" и "Флоро-географический анализ северной степи европейской части СССР" Л.М.Носовой (1973), а также изучая ареалы видов по томам "Флоры европейской части СССР" - "Флоры восточной Европы", по определителям "Определитель высших растений европейской части СССР" С.С.Станкова и В.И.Талиева, "Флора средней полосы европейской части России" П.Ф.Маевского. По этим же определителям и "Флорам" определялась родина заносных растений.

Указана роль растений в городских экосистемах, растительных сообществах.

Отмечено хозяйственное использование растений местным населением, в т.ч. и их культивирование. Понятие культивирования мы даем в расширенном объеме, включая в него и сохранение по тем, или иным причинам аборигенных растений, выросших самосевом.

Для культурных растений указана родина, для чего вместе с вышеупомянутыми источниками использовались сводки по культурным растениям, в т.ч. декоративным.

Растения, нуждающиеся в охране на территории города, отмечены как Охр. В эту категорию мы включили виды растений, которые либо подвергаются прямому истреблению, ставящему под угрозу сохранение их на территории города, либо те, местообитание которых находится под угрозой деструктивного антропогенного воздействия, либо естественно вымирающие. Растения, включенные в Красную книгу Нижегородской области, отмечены как Кр.

В тех немногих случаях, когда мы не наблюдали данный вид растения на территории города, или же в гербариях отсутствуют сборы данного вида по городу, дается ссылка на источник (см. список литературы).

Основные гербарные материалы по Н.Новгороду, послужившие основой для написания данной работы, содержатся в гербарии кафедры ботаники биологического факультета Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, а также в нашем личном гербарии – гербарии Ботанического сада ННГУ (свыше 9000 листов).

Часть экземпляров нашего гербария была просмотрена известными знатоками флоры: В.Н.Тихомировым и сотрудниками возглавлявшейся им кафедры высших растений МГУ им. М.В.Ломоносова, А.Д.Смирновой, Е.В.Лукиной, И.Г.Никитиной, С.Л.Кублановой, С.В.Сидневой, Е.М.Кутыревой, И.П.Елисеевым, В.П.Воротниковым, А.И.Широковым, С.П.Урбановичу, А.В.Чкаловым которым еще раз хочется выразить свою благодарность, многим, - увы!- посмертно...

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

Отдел Lycopodiophyta - Плауновидные.

Класс Lycopodiopsida - Плауновые.

1 сем. Lycopodiaceae - Плауновые.

1.*Diphasium complanatum* (L.) Rothm., *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub (Дифазиум сплюснутый). По сосновым борам. Моск. Бор.

2.*Lycopodiella inundata* (L.) Holub, *Lycopodium inundatum* L. (Ликоподиелла топяная, Плаунок топяной, Плаун топяной). В прошлом был найден на берегу оз. Головковское (Сорм.). Бор. Кр.

3.*Lycopodium annotinum* L. (Плаун годичный). Сосновые боры и их дериваты. Кан., Моск., Сорм., Авт. Бор.

4.*L. clavatum* L. (П. булавовидный). Аналогично предыдущему.

Примечание: все виды плаунов собираются местным населением на букеты и венки.

2 сем. Huperziaceae - Баранцовые.

5.*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. (Баранец обыкновенный). В прошлом был найден в Марьиной роще (Сов). Бор. Охраняемое растение области. Кр.

Отдел Equisetophyta - Хвощевидные.

Класс Equisetopsida - Хвощевые.

3 сем. Equisetaceae - Хвощевые.

6.*Equisetum arvense* L. (Хвощ полевой). В разреженных лесах, парках, на пустырях, сорное в огородах и полях. По всему городу. Бор.

7.*E. fluviatile* L. (Х. приречный). По влажным лесам, берегам водоемов, по заболоченным местам. В некоторых местах образует сообщества. По всему городу. Бор.

8.*E. hiemale* L. (Х. зимующий). В нагорной части по лесным оврагам, по лесистым склонам, реже по лугам на склонах и насыпям железных дорог; в заречной части как заносное по насыпи железных дорог в Авт., Сорм. Стебли используются местным населением для чистки посуды. Нем.

9.*E. palustre* L. (Х. болотный). По берегам водоемов, по заболоченным местам. В некоторых местах образует сообщества. Изредка по всему городу. Бор.

10.*E. pratense* Ehrh. (Х. луговой). По разреженным лесам и паркам, опушкам, пустырям. По всему городу. Бор.

11.*E. scirpoides* Michx. (Х. камышковый). В прошлом был найден в лесу на северо-западной окраине города. Бор. Охр. Кр.

12.*E. sylvaticum* L. (Х. лесной). По широколиственным лесам в нагорной части, изредка по берегам лесных водоемов по всему городу. Бор.

Отдел Polypodiophyta - Папоротниовидные.

Класс Polypodiopsida - Папоротниковые.

4 сем. Ophioglossaceae - Ужовниковые.

13.*Botrychium lunaria* (L.) Sw. (Гроздовник полулуинный). Изредка на лесных полянах. Приок. Бор. Охр. Кр.

14.*Ophioglossum vulgatum* L. (Ужовник обыкновенный). Ранее был найден на Малиновой гряде (Приок.). Бор.-нем.-степ. Включен в Красную книгу области.

5 сем. Davalliaceae – Даваллиевые.

15.*Nephrolepis cordifolia* (L.) Presl. (Нефролепис, Почкочешуйник сердцевистный). Изредка высаживается на лето в открытый грунт из комнатной культуры. За это время он разрастается вегетативно, давая молодые растения. Родина – тропики и субтропики Старого Света.

6 сем. Onocleaceae - Оноклеевые.

16.*Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. (Страусник обыкновенный). По различным разреженным лесам, лесным оврагам, лесным лугам. Повсеместно, кроме Лен. Бор. Разводится как декоративное и вторично дичает.

17.*Onoclea sensibilis* L. (Оноклея чувствительная). Единично разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Дальний Восток.

7 сем. *Athyriaceae* - Кочедыжниковые.

18.*Athyrium filix-femina* (L.) Roth. (Кочедыжник женский). Изредка по лесам по всему городу, кроме Лен. Бор. Разводится как декоративное.

19.*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. (Пузырник ломкий). По лесным оврагам и склонам в нагорной части. Разводится как декоративное. Бор.

8 сем. *Aspidiaceae* – Щитовниковые, Аспидиевые.

20.*Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs. (Щитовник шартрский). По лесам, зарослям кустарников, паркам, садам, в трещинах кирпичных стен рассеянно по всему городу, кроме Лен. Бор. Разводится как декоративное.

21.*D. cristata* (L.) A. Gray (Щ. гребенчатый). По заболоченным лесам и окраинам болот в заречной части, кроме Лен. Бор..

22.*D. filix-mas* (L.) Schott (Щ. мужской). Аналогично щитовнику шартрскому. Бор. – нем.

23.*Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm. (Голокучник Линнея, трехраздельный). Изредка по хвойным и широколиственным лесам по всему городу, кроме Лен. По кирпичным стенам в Ниж. В некоторых местах по обнаженным склонам оврагов образует сообщества. Бор.

24.*G. robertianum* (Hoffm.) Newm. (Г. Роберта). В сосновых посадках в Кан. как занесенное. Ранее указывалось для Мызы и Малиновой Гряды (Приок.). Бор. Охр. Кр.

25.*Polystichum braunii* (Spenn.) Fee (Многорядник Брауна). В прошлом был найден на Малиновой Гряде, в лесном овраге у Ботанического сада (Приок.) и в Марьиной роще (Сов.). Среднеевр. В настоящее время единично разводится как декоративное. Охраняемое растение области. Кр.

9 сем. *Thelypteridaceae* - Телиптерисовые.

26.*Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt. (Фегоптерис буковый). По лесным склонам и оврагам с северной экспозицией в нагорной части и в смешанных лесах в Кан. Бор.

27.*Thelypteris palustris* Schott. (Телиптерис болотный). По заболоченным лесам. Сорм., Моск., Кан., Авт. Бор.

10 сем. *Hypolepidaceae* - Гиполеписовые.

28.*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn ex Decken (Орляк обыкновенный). В сосновых борах и их дериватах в заречной части (кроме Лен.), где иногда доминирует в травянистом ярусе. В нагорной части (в Приок.) в дубраве, а также как занесенное с песком на пустырях и по насыпи железной дороги. Бор. Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Местообитание орляка в дубраве в Приок. нуждается в охране.

Примечание: все крупнолистные папоротники собираются местным населением на живые и сухие букеты.

11 сем. *Salviniaceae* – Сальвиниевые.

29.*Salvinia natans* L. (Сальвиния плавающая). В пойменных озерах р. Оки в Авт; была найдена также в р. Черной (Сорм., Сидоренко М.В.,2008). Кр.

Отдел Pinophyta, Gymnospermae – Голосеменные.

Класс Taxopsida – Тисовые.

12 сем. *Taxaceae* – Тисовые.

30.*Taxus baccata* L. (Тис ягодный). Изредка разводится как декоративное. Родина – Карпаты.

Класс Pinopsida - Сосновые.

13 сем. Pinaceae - Сосновые.

31.*Abies sibirica* Ledeb. (Пихта сибирская). Разводится как декоративное. Родина наших пихт - северное заволжье нашей области.

32.*Larix decidua* Mill. (Лиственница европейская). Разводится как декоративное. Родина - Западная Европа.

33.*L. gmelinii* (Rupr.) Rupr. (Л. Гмелина). Разводится как декоративное. Родина - восточная Сибирь.

34.*L. sibirica* Ledeb. (Л. сибирская). Разводится как декоративное и в лесных культурах и дичает. Родина наших лиственниц - северное заволжье нашей области, где она является охраняемой и входящей в Красную книгу области.

35.*Picea engelmannii* Parry ex Engelm. (Ель Энгельмана). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

36.*P. x fennica* (Regel) Kom., *P. abies* (L.) Karst. (Е. финская, обыкновенная). В заречной части (кроме Лен.) как редкая примесь в сосновых и смешанных лесах. Ранее встречалась на Малиновой Гряде (Приок.). Бор. Разводится как декоративное и в лесных культурах и вторично дичает по всему городу на пустырях и в разреженных лесах и зарослях кустарников.. Ель на полуострове Печерские пески (Ниж.) нуждается в охране.

Примечание: единично в озеленении встречаются ели с признаками среднеевропейского вида ели европейской (*P. abies* (L.) Karst.) и ели сибирской (*P. obovata* Ledeb.), распространенной в нашем северном заволжье.

37.*P. mariana* (Mill.) B.P.S., *P. nigra* Link. (Е. черная). Ранее разводилась как декоративное (Отчет городского агронома. 1913). Родина – Северная Америка.

38.*P. pungens* Engelm. (Е. колючая). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

39.*P. rubens* Sarg. (Е. красная). Аналогично ели черной, но гораздо реже.

40.*Pinus nigra* Arn. (Сосна черная, австрийская). Изредка разводится как декоративное. Родина – средняя и южная Европа.

41.*P. pallasiana* D.Don. (С. Палласа, крымская). В прошлом разводилась как декоративное. Родина - Крым. (Пентин А.П., Елистратов А.В., 1975).

42.*P. sibirica* Du Tour. (С. сибирская). Разводится как декоративное. Родина - север европейской России.

43.*P. strobus* L. (С. веймутова). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

44.*P. sylvestris* L. (С. лесная). Лесообразующая порода в лесах заречной части. В нагорной части как примесь в дубравах, а также на песчаных берегах Оки и Волги, на глинистых обнажениях, где изредка образует сообщества. Разводится как декоративное и в лесных культурах и вторично дичает. Местным населением почки собираются как лекарственное сырье. Бор. Местообитание сосны на полуострове Печерские пески (Ниж.) нуждается в охране.

45.*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco (Лжетсуга Мензиса, тиссолистная). Изредка разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

14 сем. Cupressaceae - Кипарисовые.

46.*Chamaecyparis pisifera* Sieb. et Zucc. (Кипарисовник гороховидный). Разводится как декоративное. Родина – Япония.

47.*Juniperus communis* L. (Можжевельник обыкновенный). В сосновых и смешанных лесах и их дериватах в заречной части города (кроме Лен.). Единично в липняках (Приок.). Разводится как декоративное. Бор. Места произрастания в нагорной части нуждаются в охране.

48.*J. sabina* L. (М. казацкий). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - южная Россия.

49.*J. sibirica* Burgsd. (М. сибирский). Изредка разводится как декоративное. Родина – Сибирь.

50.*Thuja occidentalis* L. (Тuya западная). Разводится как декоративное, разрастается вегетативно и дичает. Родина - Северная Америка.

Отдел Magnoliophyta, Angiospermae - Покрытосеменные.

Класс Liliopsida, Monocotyledones - Однодольные.

15 сем. Typhaceae - Рогозовые.

51.*Typha angustifolia* L. (Рогоз узколистный). По берегам водоемов по всему городу Во многих местах образует сообщества. Нем. Охр.

52.*T. latifolia* L. (Р. широколистный). По берегам водоемов, сырьим лугам и пустырям по всему городу. Во многих местах образует сообщества. Бор.-Нем.-Степ.

53.*T. laxmannii* Lepech.(Р. Лаксмана). В озерах Авт. Заносное из южной России.

16 сем. Sparganiaceae - Ежеголовниковые.

54.*Sparganium angustifolium* Michx. (Ежеголовник узколистный). В прошлом был найден на болоте на западной окраине города. Бор. Охр. Кр.

55.*S. emersum* Rehm. (Е. всплывающий). По берегам водоемов повсеместно. Бор.-Нем.

56.*S. erectum* L. (Е. прямой). По берегам водоемов. Ниж., Сов. Бор.-Нем.-Степ.

57.*S. minimum* Wallr. (Е. малый). Изредка в малых водоемах. Сорм. Среднеевр. Охр.

17 сем. Potamogetonaceae - Рдестовые.

58.*Potamogeton alpinus* Balb. (Рдест альпийский). В мелиоративных каналах. Моск., Сорм. Бор. Охр.

59.*P. berchtoldii* Fieb. (Р. Берхтольда). В малых водоемах. Авт. Бор.-Нем.-Степ.

60.*P. compressus* L. (Р. сплюснутый). В водоемах заречной части. Бор.-Нем.

61.*P. crispus* L. (Р. курчавый). В водах Оки и Волги, во внутренних водоемах Авт., Сорм., Кан. Бор.-Нем.-Степ.

62.*P. lucens* L. (Р. блестящий). В водах Оки и Волги. Бор.-Нем.-Степ.

63.*P. natans* L. (Р. плавающий). Изредка в водах Оки, Волги и внутренних водоемах заречной части. Бор.-Нем.-Степ.

64.*P. obtusifolius* Mert. et Koch. (Р. туполистный). В малых водоемах. Кан. Бор.-Нем.-Понт.

65.*P. pectinatus* L. (Р. гребенчатый). В водоемах заречной части и прудах Щелоковского хутора (Сов.). Бор.-Нем.-Степ.

66.*P. perfoliatus* L. (Р. пронзеннолистный). В водах Оки, Волги, реже – водоемах заречной части; в нагорной части - в прудах Щелоковского хутора (Сов.). Бор.-Нем.-Степ.

Примечание: в водах Волги в Сорм. найден гибрид этого вида с Рдестом длиннейшим (*P. praelongus* Wulf.).

18 сем. Zannichelliaceae - Занникеллиевые.

67.*Zannichellia palustris* L. (Занникеллия болотная). В прошлом была найдена в водах Волги. Степ. Охр. Кр.

19 сем. Najadaceae - Наядовые.

68.*Caulinia minor* (All.) Coss. et Germ. (Каулиния малая). В водах Волги. Ниж. Степ. Охр. Кр.

20 сем. Juncaginaceae - Ситниковые.

69.*Triglochin palustris* L. (Триостренник болотный). Изредка по заболоченным лугам, берегам ручьев в нагорной части. В последние годы исчез из ранее замеченных местообитаний. Бор.-Нем.-Степ. Охр.

21 сем. Alismataceae - Частуховые.

70.*Alisma lanceolatum* With. (Частуха ланцетная). По берегу пруда в Приок. (случайный занос?). Степ.

71. *A. plantago-aquatica* L. (Ч. подорожниковая). По берегам водоемов, заболоченным местам по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

72. *Sagittaria sagittifolia* L. (Стрелолист обыкновенный). По берегам Оки, Волги, водоемов заречной части и прудах в лесопарке Щелоковский хутор и в окрестностях поселка учебного хозяйства Сельхозакадемии (Сов.). Образует сообщества. Бор.-Нем.-Степ.

22 сем. Butomaceae - Сусаковые.

73. *Butomus umbellatus* L. (Сусак зонтичный). По берегам Оки, Волги, водоемов заречной части, в прудах Щелоковского хутора (Сов) и в пруду – котловане в Приок. Бор.-Нем.-Степ.

23 сем. Hydrocharitaceae - Водокрасовые.

74. *Elodea canadensis* L. (Элодея канадская). В водоемах со стоячей, или медленно текучей водой по всему городу. Образует сообщества водной толщи. У нас заносное. Родина - Северная Америка.

75. *Hydrocharis morsus-ranae* L. (Водокрас лягушачий). В водоемах заречной части города. Ранее указывался для Слуды (Сов.). В ряде мест образует сообщества на поверхности водоемов. Бор.-Нем.-Степ.

76. *Stratiotes aloides* L. (Телорез алоэвидный). Аналогично предыдущему, но реже. Бор.-Нем.

24 сем. Poaceae, Graminae - Мятликовые, Злаки.

77. *Agropyron cristatum* (L.) Beauv. (Житняк гребенчатый). По лугам на склонах, по песчаным пустырям, реже по газонам. Ниж., Сов., Приок., Кан., Моск. Степ.

78. *A. desertorum* (Fisch. ex Link) Schult. – Ж. пустынnyй. По насыпям железной дороги в Кан. и Моск. и на пустырях в Ниж. Заносное из южной России.

79. *Agrostis canina* L. (Полевица собачья). По сырьим лугам, пустырям. Рассеянно по всему городу. Изредка образует сообщества. Бор.-Нем.-Степ.

80. *A. gigantea* Roth. (П. гигантская). На лугах, пустырях по всему городу. Изредка разводится как декоративное и вторично дичает; образует сообщества. Бор.-Нем.-Степ.

81. *A. stolonifera* L. (П. побегообразующая). По сырьим лугам, берегам водоемов, чаще в заречной части. Изредка образует сообщества. Бор.-Нем.-Степ.

82. *A. tenuis* Sibth. (П. тонкая). По сухим лугам по всему городу, где зачастую образует сообщества, по сухим разреженным сосновым борам, их дериватам, культурам сосны и дубравам на гривах в поймах Оки и Волги в заречной части, где часто доминирует в травянистом ярусе. Бор.-Нем.-Степ.

83. *A. vinealis* Schreb. (П. виноградниковая). По песчаным пустырям, лугам на склонах. Нагорная часть и Сорм. Нем.-Степ.

84. *Alopecurus aequalis* Sobol. (Лисохвост короткоостый). В поймах Оки и Волги на лугах, по берегам водоемов. Рассеянно во всех районах города. Бор.-Нем.-Степ.

85. *A. arundinaceus* Poir. (Л. тростниковый). По берегам пойменных озер Волги. У нас как заносное. Родина – Монголия.

86. *A. geniculatus* L. (Л. коленчатый). По сырьим лугам, берегам водоемов, реже на газонах и пустырях по всему городу. Бор.-Нем.

87. *A. pratensis* L. (Л. луговой). По лугам и пустырям, реже по газонам по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

88. *Anisantha tectorum* (L.) Nevski (Неравноцветник кровельный). На пустырях и газонах в Ниж., Приок., Авт., Моск., Лен. Заносное из южной России.

89. *Anthoxanthum odoratum* L. (Душистый колосок обыкновенный). На лугах, где зачастую образует сообщества, на пустырях, в разреженных лесах. Рассеянно по всему городу. Бор.-Нем.

90. *Apera spica-venti* (L.) Beauv. (Метлица обыкновенная). По пустырям, главным образом в заречной части. Бор.-Нем.-Степ.

91.*Arrhenatherum elatius* (L.) J. et C. Presl. (Райграс высокий). По пустырям, лугам, полянам. Приок., Сорм., Сов. У нас одичалое. Родина - Западная Европа.

92.*Avena fatua* L. (Овсюг). По пустырям рассеянно. Авт., Ниж., Кан. Бор.-Нем.-Степ.

93.*A. sativa* L. (Овес посевной). Разводится как кормовое и сидерат в Сов. и Приок. и как декоративное в Ниж. Вырастает из оброненных семян повсеместно. Родина - восточное Средиземноморье и Передняя Азия.

94.*A. strigosa* Schreb. (О. щетинистый). В прошлом был найден в посевах и по пескам по берегу Волги в Ниж. Среднеевр.

95.*Beckmannia eruciformis* (L.) Host. (Бекманния обыкновенная). По сырым лугам, чаще в поймах Оки и Волги, реже на пустырях. Ниж., Сов., Авт. Бор.-Нем.-Степ.

96.*Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. (Коротконожка перистая). По лесистым склонам. Приок. Нем. Охр.

97.*B. sylvaticum* (Huds.) Beauv. (К. лесная). По широколиственным лесам и их дериватам, на газонах в нагорной части. Нем. Охр.

98.*Brisa maxima* L. (Трясунка наибольшая). Изредка разводится как декоративное. Родина - южная Россия.

99.*B. media* L. (Т. средняя). По пойменным лугам Оки. Бор.-Нем.

100.*Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub, *Bromus inermis* Leyss. (Кострец безостый, Костер безостый). В поймах Оки и Волги, по лугам, в основном в нагорной части, где образует сообщества, реже на пустырях по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

101.*B. ramosa* (Huds.) Holub, *B. benekenii* (Lange) Holub (К. ветвистый, Бенекена). Изредка в широколиственных лесах. Нагорная часть и Авт. На газонах и пустырях в нагорной части. Нем. Охр.

102.*B. riparia* (Rehm.) Holub, *B. riparius* Rehm. (К. береговой). Изредка по травянистым склонам, пустырям и насыпям железных дорог. Приок. Степ. Охр.

103.*Bromus arvensis* L. (Костер полевой). Изредка на пустырях по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

104.*B. japonicus* Thunb. (К. японский). Изредка на пустырях, иногда культивируется как газонное. Моск., Сов., Ниж. Заносное. Родина - Япония, Китай.

105.*B. mollis* L. (К. мягкий). Изредка на пустырях, газонах. Приок., Ниж., Кан., Моск., Сорм. Бор.-Нем.-Степ.

106.*B. secalinus* L. (К. ржаной). Изредка на пустырях и газонах. Приок., Кан. Среднеевр.

107.*B. squarrosum* L. (К. растопыренный). Изредка на пустырях. Сов., Ниж., Кан., Лен., Сорм. Степ.

108.*Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth. (Вейник тростниковидный). По сосновым и смешанным лесам, культурам сосны, где иногда доминирует в травянистом ярусе, реже по пустырям по всему городу, но в заречной части чаще. Бор.-Нем.

109.*C. canescens* (Wed.) Roth. (В. седой). По торфяным болотам, заболоченным лугам. Моск., Кан., Сов. Бор.-Нем.

110.*C. epigeios* (L.) Roth. (В. наземный). По пустырям, лугам, где часто образует сообщества, по разреженным лесам, где иногда доминирует в травянистом ярусе, как сорное в огородах. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

111.*C. purpurea* (Trin.) Trin. (В. пурпурный). Изредка по заболоченным местам в заречной части. Бор. – Нем. Охр.

Примечание: все виды вейников собираются местным населением на сухие букеты.

112.*Catabrosa aquatica* (L.) Beauv. (Поручейница водяная). По берегам ручьев в Сов. Нем. – Степ. Охр.

113.*Cripsis alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Schrad. (Скрытница лисохвостниковая). На берегах Оки в Лен. В прошлом была найдена на песчаных берегах Оки и Волги в Кан. и Ниж. Степ. Охр.

114.*C. schenoides* (L.) Lam. (С. камышевидная). На песчаных берегах Волги в Ниж. и Оки в Лен. В прошлом была найдена на берегах Оки в Ниж. Степ. Охр.

115.*Cynosurus cristatus* L. (Гребенник обыкновенный). В прошлом был найден на южной окраине города. Заносное среднеевр.

116.*Dactylis glomerata* L. (Ежа сборная). В разреженных лесах, парках, где иногда доминирует в травянистом ярусе, зачастую образует сообщества на пустырях и лугах, сорное в огородах; по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

117.*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. (Щучка дернистая). По заболоченным лугам, где часто образует сообщества, лесам, реже на пустырях. По всему городу, но в заречной части чаще. Бор.

118.*Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muhl. – Росичка линейная, ишемическая. По песчаным пустырям в Моск. Нем.-Степ.

119.*Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. (Куриное просо, Ежовник обыкновенный). По пустырям, паркам, деградированным лугам и лесам, сорное в огородах. По всему городу. Степ.

Примечание: в нагорной части города на пустырях у овощных базаров изредка встречаются экземпляры, образующие переходную форму к Ежовнику рисовидному (*E. oryzoides* (Ard.) Fritsch). У этих значительно более мощных экземпляров ширина листовой пластинки доходит до 2 см, длина колосков – до 3,8 мм.

120.*Elymus caninus* (L.) L., *Roegneria canina* (L.) Nevski (Пырейник собачий, Рэгнерия собачья). По широколиственным лесам и зарослям американского клена в нагорной части и Авт. Изредка на пустырях и газонах в нагорной части, где иногда образует сообщества. Нем.

121.*Elytrigia intermedia* (Host) Nevski (Пырей средний). Изредка на пустырях в Ниж., где образует сообщества. Степ.

122.*E. repens* (L.) Nevski (П. ползучий). По лугам, пустырям, где образует сообщества, по паркам, деградированным лесам, сорное в огородах, газонное на стадионах. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ. Молодые побеги собираются местным населением как тонизирующее для кошек и собак.

123.*Eragrostis pilosa* (L.) Beauv. (Полевичка волосистая). По берегам Оки и Волги повсеместно. Изредка заносится с песком вглубь территории города. Бор.-Нем.-Степ.

124.*E. suaveolens* A.Beck. ex Claus (П. душистая). Изредка по берегам Оки и Волги повсеместно. Бор. – Нем. – Степ.

125.*Eremopyrum tricicatum* (Gaertn.) Nevski (Мортук пшеничный). Единично по насыпи железной дороги в Кан. Заносное из южной России.

126.*Festuca altissima* All. (Овсянница высокая). Изредка по широколиственным лесам. Нагорная часть и Авт. Нем. Охр.

127.*F. arundinacea* Schreb. (О. тростниковая). На пустырях в Ниж. и по обочине шоссе в Приок. и как газонное в Ниж., Авт. и Кан. Среднеевр.

128.*F. beckeri* (Hack.). *Trautv.*, *F. polesica* Zapal. (О. Беккера, полесская). По песчаным пустырям в Лен., Сорм., Моск. и как заносное в Сов. Бор.

129.*F. gigantea* (L.) Vill. (О. гигантская). По широколиственным лесам и паркам. Нагорная часть, Лен., Авт., Кан. В последнее время все чаще распространяется по газонам и пустырям в нагорной части города. Нем.

130.*F. glauca* Lam. (О. сизая). Разводится как декоративное. Родина – Западная Европа.

131.*F. ovina* L. (О. овечья). Изредка по пустырям по всему городу, но в заречной части чаще. Бор.-Нем.-Степ.

132.*F. pratensis* Huds. (О. луговая). На лугах, пустырях, где часто образует сообщества, на газонах по всему городу. В Приок. и Сов. культивируется как кормовое. В последнее время начала культивироваться как газонное растение. Бор.-Нем.-Степ.

133.*F. rubra* L. (О. красная). По разреженным лесам, сухим лугам, пустырям, газонам и насыпям железных дорог по всему городу. В последнее время начала использоваться как газонное. Бор.-Нем.

134.*F. valesiaca* Gaud., *F. sulcata* (Hack.) Nym. (О. валлийская, Типчак). По сухим лугам, пустырям, насыпям железных дорог, где иногда образует сообщества. Приок., Ниж., Сорм. Степ.

135.*Glyceria fluitans* (L.) R.Br. (Манник плавающий). По берегам Оки, Волги, пойменных озер и внутренних водоемов заречной части, где иногда образует сообщества. Бор.-Нем.

136.*G. maxima* (Hartm.) Holmb. (М. большой). Изредка по берегам водоемов в заречной части и в прудах Щелоковского хутора (Сов.), где образует сообщества. Бор.-Нем.

137.*G. nemoralis* (Uechtr.) Uechtr. (М. дубравный). Ранее было найдено на Слуде (Приок.). Среднеевр. Охр.

138.*G. plicata* (Fries) Fries (М. складчатый). По сырым лугам по всему городу. Заносится с торфом. Бор.-Нем.-Степ.

139.*Hierochloë odorata* (L.) Beauv. (Зубровка душистая). По лугам. Приок. Бор.-Нем.-Степ.

140.*Holcus mollis* L. (Бухарник мягкий). Единично разводится как декоративное. Среднеевр.

141.*Hordeum distichon* L. (Ячмень двурядный). Разводится как кормовое в Сов. и Приок. Вырастает из оброненных семян по всему городу. Родина - Эфиопия и юго-восточная Азия.

142.*H. jubatum* L. (Я. гривастый). Разводится как декоративное и дичает, изредка образуя летние эфемероидные сообщества, особенно в заречной части. Родина - Северная Америка.

143.*H. vulgare* L. (Я. обыкновенный). Как примесь в посевах других кормовых злаков в Сов. и Приок. Вырастает из оброненных семян по всему городу. Родина - Эфиопия и юго-восточная Азия.

144.*Koeleria cristata* (L.) Pers. (Келерия гребенчатая). На насыпи железной дороги в Приок. Степ.

145.*K. delavignei* Czern. ex Domin. (К. Делявиня). На гривах на полуострове Печерские Пески. Ниж. Ранее отмечена на пустырях в Приок. Степ. Охр.

146.*K. glauca* (Spreng.) DC. (К. сизая). По песчаным пустырям, где часто образует сообщества, в культурах сосны. Заречная часть и Ниж. Ранее отмечена на насыпи железной дороги в Приок. Нем.-Степ.

147.*Leersia oryzoides* (L.) Sw. (Леерсия рисовидная). Изредка по берегам Оки и Волги (Сорм., Ниж.) и во внутренних водоемах в Авт. Среднеевр. Охр.

148.*Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur. (Лерхенфельдия извилистая). В прошлом была найдена на окраине болота в Лен. Бор.

149.*Leymus racemosus* (Lam.) Tzvel. (Волоснец кистистый). Разводится как декоративное и для закрепления железнодорожной насыпи в Кан. и Моск. и дичает, образуя сообщества. Местным населением собирается на сухие букеты. Родина - юг Западной Европы.

150.*L. sabulosus* (M.B.) Tzvel. (В. приречный). Разводится как декоративное. Родина - Причерноморье. Примечание: иногда рассматривается как подвид предыдущего вида.

151.*Lolium multiflorum* Lam. (Плевел многоцветковый). По пустырям в Лен., сорное в огородах в Ниж. и как газонное в Приок. Заносное. Родина - Западная Европа.

152.*L. perenne* L. (П. многолетний). По паркам, пустырям, где образует сообщества, в посевах кормовых культур как сорное; в последнее время разводится как газонное и дичает. Заносное растение из Западной Европы.

153.*L. remotum* Schrank. (П. расставленный). Изредка как газонное. Среднеевр.

154.*Melica nutans* L. (Перловник поникший). По широколиственным и смешанным лесам. Нагорная часть, Кан., Сорм., Авт. Бор.-Нем.

155.*Milium effusum* L. (Бор развесистый). По широколиственным лесам. Нагорная часть и Авт. Нем.

156.*Molinia caerulea* (L.) Moench. (Молиния голубая). По сосновым борам, пустырям, насыпям железных дорог в Авт. и Сорм. Бор.-Нем.

157.*Nardus stricta* L. (Белоус торчащий). По заболоченным лугам, пустырям, где зачастую образует сообщества. По всему городу, но в заречной части чаще. Бор.-Нем.-Степн.

158.*Panicum miliaceum* L. (Прoso обыкновенное). Вырастает из оброненных семян по всему городу. Родина - Индия.

159.*Phalaris canariensis* L. (Канаареечник канарский). Ранее культивировалось в качестве корма для птиц и повсеместно вырастало из оброненных семян, в настоящее время – как редкое, вырастающее из оброненных семян растение. Родина - Средиземноморье.

160.*Phalaroides arundinacea* (L.) Rausch. (Двукисточник тростниковидный). По берегам водоемов, по заболоченным местам, чаще всего в поймах Оки и Волги, где часто образует сообщества. По всему городу. Разводится как декоративное (пестролистная форма) по всему городу и как кормовое в Сов. и вторично дичает, образуя сообщества. Изредка заносится с песком вглубь территории города. Бор.-Нем.-Степ.

161.*Phleum phleoides* (L.) Karst. (Тимофеевка степная). По лугам на склонах, боровым пустырям, насыпям железных дорог. Моск., Сорм., Приок. Степ. Охр.

162.*P. pratense* L. (Т. луговая). На лугах, пустырях по всему городу. В Сов. и Приок. культивируется как кормовое. Бор.-Нем.-Степ.

163.*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (Тростник обыкновенный). По берегам водоемов повсеместно, реже по сырьим лугам и пустырям, где образует сообщества. Заносится с песком вглубь города. Местным населением собирается на сухие букеты. Изредка разводится как декоративное и проявляет себя злостным сорняком. Бор.-Нем.-Степ.

Примечание: на песчаных пустырях в Авт. и по берегам водоемов в Сорм. и Моск. замечен заносный из южной России Т. высокий (*P. australis* ssp. *altissimus* (Benth.) Clayton)

164.*P. annua* L. (М. годичный). На пустырях, где часто образует сообщества, в парках и деградированных лесах, сорное в огородах, газонное на стадионах по всему городу.

165.*P. bulbosa* L. (М. луковичный). Ранее встречался по лугам на склонах и песчаным пустырям. Приок., Авт., Лен. В последние годы не замечен. Степ.

166.*P. compressa* L. (М. сплюснутый). На пустырях, по склонам. Рассеянно по всему городу. Степ.

167.*P. nemoralis* L. (М. дубравный). По опушкам широколиственных лесов, паркам, где иногда доминирует в травянистом ярусе, пустырям и лугам по всему городу, но в нагорной части чаще. Бор.-Нем.

168.*P. palustris* L. (М. болотный). По сырьим лугам, берегам водоемов, где иногда образует сообщества; по всему городу. Изредка заносится с торфом в посевы и на газоны. Бор.-Нем.-Степ.

169.*P. pratensis* L. (М. луговой). На лугах, где иногда образует сообщества, на пустырях по всему городу. Бор.-Нем.-Степ. Подвид *Ssp. angustifolia* (L.) Arcang (М.

узколистный) изредка встречается по травянистым склонам и на пустырях по всему городу.

170.*P. remota* Forsell. (М. расставленный). По берегам Оки в Лен., по заболоченным местам в Сов., как занесенное с речным песком на пустырь в Ниж. Бор.-Нем.

171.*P. supina* Schrad. (М. приземистый). Изредка на пустырях в Кан. и Ниж. Сиб.

172.*P. trivialis* L. (М. обыкновенный). Изредка на лугах и пустырях по всему городу. Бор.-Нем.

173.*P. versicolor* Bess. Ssp. *stepposa* (Kryl.) Tzvel. (М. степной). Изредка в заречной части по обочинам дорог как заносное. Степ.

174.*Puccinellia distans* (Jacq.) Parl. (Бескильница расставленная). По берегам водоемов, паркам, деградированным лугам, пустырям, где иногда образует сообщества, как сорное в огородах. Рассеянно по всему городу. Нем.-Степ.

175.*Secale cereale* L. (Рожь посевная). Как кормовое в Сов. и Приок. Повсеместно вырастает из оброненных семян. Родина - Передняя Азия.

176. *Sesleria caerulea* L. (Сеслерия голубая). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Западная Европа.

177.*Setaria glauca* (L.) Beauv. (Щетинник сизый). По пустырям, сорное в огородах; по всему городу. Степ.

178.*S. italicica* (L.) Beauv. (Щ. итальянский). Изредка разводится как декоративное. Родина – восточная Азия.

179.*S. verticillata* (L.) Beauv. (Щ. мутовчатый). На пустыре в Моск. Заносное среднеевр.

180.*S. viridis* (L.) Beauv. (Щ. зеленый). По пустырям, сорное в огородах повсеместно. Степ.

Примечание: у ряда экземпляров щетинника зеленого присутствуют явные признаки щетинника итальянского, т.е. лопастная метелка, мощный рост - это разновидность *subsp. ruscocoma* (Steud.) Tzvel. щетинника зеленого.

181.*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf (Сорго суданское). Культивируется как кормовое в Сов. и вырастает из оброненных семян в Кан. Родина - Африка.

182.*Stipa capillata* L. (Ковыль волосовидный). Ранее был найден на насыпи железной дороги на южной окраине города. Степ. Кр.

183.*Triticum aestivum* L. (Пшеница летняя). Как кормовое в Сов. и Приок. Повсеместно вырастает из оброненных семян. Родина - Эфиопия.

184.*T. durum* Desf. (П. твердая). Повсеместно вырастает из оброненных семян. Родина – Эфиопия.

185.*Zea mays* L. (Кукуруза). Разводится как пищевое и кормовое в огородах и полях на окраинах города, изредка как декоративное, вырастает из выброшенных початков и оброненных семян. Родина - Центральная и Южная Америка.

Примечание: все дикорастущие злаки на лугах, лесных полянах и, отчасти, на пустырях скашиваются местным населением на корм скоту и стравливаются при выпасе.

25 сем. Cyperaceae - Осоковые.

186.*Blismus compressus* (L.) Panz. ex Link. (Близмус сжатый). Изредка по заболоченным лугам в нагорной части. Бор.-Нем. Охр.

187.*Bulboschoenus maritimus* (L.) Palla (Клубнекамыш морской). По берегам Оки и Волги повсеместно, реже – по берегам озер в заречной части города, где часто образует сообщества и в долине ручья в Сов. Заносится с песком вглубь города. Нем.-Степ.

188.*Carex acuta* L. (Осока острая). По сырьим местам изредка по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

189. *C. acutiformis* Ehrh. (О. заостренная). Ранее была найдена на болоте у Марьиной рощи (Сов.). Бор.

190. *C. appropinquata* Schum. (О. сближенная). По заболоченным зарослям кустарников и болотам в Приок и Кан. Бор.

191. *C. aquatilis* Wahlb. (О. водяная). Изредка по берегам Оки и Волги и заболоченным лугам по всему городу. Нем.

192. *C. atherodes* Spreng. (О. прямоколосая). Изредка по заболоченным местам по всему городу. Бор.-Нем.-Степ. Охр.

193. *C. brunnescens* (Pers.) Poir. (О. буроватая). Изредка по заболоченным местам в Лен. Бор.

194. *C. caespitosa* L. (О. дернистая). По заболоченным лугам, где часто образует сообщества, и лесам, чаще в заречной части. Изредка заносится с торфом на газоны и в посевы. Бор.-Нем.

195. *C. cinerea* Poll., *C. canescens* L. (О. пепельная, седоватая). По сырьим лесам в заречной части, кроме Лен. Бор.

196. *C. contigua* Hoppe (О. соседняя). По опушкам дубрав, зарослям кустарников, реже на пустырях. Изредка по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

197. *C. digitata* L. (О. пальчатая). По сосновым борам и их дериватам в заречной части, кроме Лен. и в разреженных лесах по склонам в нагорной части. Бор.

198. *C. elata* All., *C. omskiana* Meinh. (О. высокая, омская). По заболоченным местам. Приок. Бор.

199. *C. ericetorum* Poll. (О. верещатниковая). По сосновым борам и их дериватам. Моск., Сорм. и на сухих лугах по склонам в Сов. и Приок. Бор.

200. *C. flava* L. (О. желтая). По заторфованным лугам. Приок. Бор. Охр. Кр.

201. *C. globularis* L. (О. шаровидная). Изредка по пустырям в нагорной части. Бор.

202. *C. hirta* L. (О. опущенная). По разреженным лесам, лугам на склонах, пустырям по всему городу. Бор.

203. *C. lasiocarpa* Ehrh. (О. волосистоплодная). По болотам в Моск. Бор.

204. *C. leporina* L. (О. заячья). По болотистым лугам по всему городу, но в заречной части чаще. Бор.

205. *C. montana* L. (О. горная). В разреженных дубравах по склонам. Ниж., Приок. Нем.

206. *C. muricata* L. (О. колючковая). Изредка по опушкам лесов и пустырям. Нагорная часть и Лен. Нем.

207. *C. nigra* (L.) Reich. (О. черная). По болотистым лугам, где образует сообщества; по всему городу. Заносится с торфом в посевы. Бор.

208. *C. pallescens* L. (О. бледноватая). По сухим лугам. Приок., Кан., Авт. Бор.-Нем.

209. *C. pediformis* C.A.Mey (О. пальчатая). По смешанным, реже лиственным лесам по склонам. Кан., Приок. Бор.

210. *C. pilosa* Scop. (О. волосистая). По широколиственным лесам, реже по смешанным, в зарослях кустарников, где часто доминирует в травянистом ярусе. Нагорная часть, Авт., Сорм., Кан. Нем.

211. *C. praecox* Schreb. (О. ранняя). По сухим склонам и пустырям, где иногда образует сообщества; по всему городу. Нем.-Степ.

212. *C. pseudocyperus* L. (О. ложносытевая). По берегам Оки и Волги и пойменных водоемов, где часто образует сообщества. Бор.-Нем.-Степ.

213. *C. rostrata* Stokes (О. вздутая). По берегам водоемов, заболоченным местам, где часто образует сообщества; по всему городу, но в заречной части чаще. Бор.-Нем.

214. *C. sylvatica* Huds. (О. лесная). По широколиственным лесам в нагорной части. Нем.

Примечание: в лесопарке «Марьина роща» в Сов. В.П.Юниной найдены экземпляры этой осоки с явными признаками викарирующего сибирского вида *O. Arnelia* (*C. arnellii* Christ.), включенного в Красную книгу Нижегородской области..

215.*C. vaginata* Tausch. (О. влагалищная). По сырьим лесам в заречной части, кроме Лен. Бор.

216.*C. vesicaria* L. (О. пузырчатая). Изредка по болотам в заречной части города, где иногда образует сообщества. Бор.

217.*C. vulpina* L. (О. лисья). По заболоченным лугам, чаще в заречной части. Заносится с торфом на газоны и в посевы. Бор.-Нем.-Степ.

218.*Cyperus fuscus* L. (Сыть бурая). По песчаным берегам Оки в заречной части и в Приок., по берегам Волги в Ниж. и Кан. и занесенное с песком по берегу ручья в Сов. Бор.-Нем. Охр.

Примечание: в качестве декоративного иногда высаживаются различные виды сыти, выращиваемые как комнатные культуры, осенью они убираются в помещение.

219.*Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult. (Ситняг игольчатый). По песчаным берегам Оки и Волги и озер в их пойме, где иногда образует сообщества. Бор.-Нем.

220.*E. mamillata* Lindb. fil. (С. сосочковый). По сырьим лугам. Ниж. Бор.

221.*E. palustris* (L.) Roem. et Schult. (С. болотный). По сырьим лугам, берегам водоемов, где иногда образует сообщества; повсеместно. Бор.-Нем.

222.*Eriophorum gracile* Koch (Пушица тонкая, стройная). Ранее была найдена на болоте у Марьиной рощи (Сов.). Гипоаркт.- Бор. Охр.

223.*E. latifolium* Hoppe (П. широколистная). По заторфованным лугам. Сов., Приок. Гипоаркт. Охр.

224.*E. polystachion* L. (П. многоколосковая). По торфяным болотам. Моск., Сорм. Гипоаркт.

225.*E. vaginatum* L. (П. влагалищная). Аналогично предыдущей.

226.*Scirpus lacustris* L. (Камыш озерный). Изредка по берегам Оки и Волги и пойменных озер, где иногда образует сообщества. Бор.-Нем.

227.*S. radicans* Schkuhr. (К. укореняющийся). По берегам водоемов в заречной части, где часто образует сообщества. Ранее было найдено на Слуде (Сов.). Бор.

228.*S. supinus* L. (К. раскидистый). В прошлом был найден по берегу Волги в Ниж. Степ.

229.*S. sylvaticus* L. (К. лесной). По берегам водоемов, где часто образует сообщества; повсеместно. Бор.

26 сем. Araceae - Ароидные, Аронниковые.

230.*Calla palustris* L. (Белокрыльник болотный). По окраинам торфяных болот, заболачивающимся берегам водоемов, где часто образует сообщества. В заречной части, кроме Лен. Бор.-Нем.

27 сем. Lemnaceae - Рясковые.

231.*Lemna minor* L. (Ряска малая). В водоемах со стоячей и медленно текущей водой, где часто образует сообщества в поверхностном слое водоемов; повсеместно. Бор.-Нем. - Степ.

232.*L. trisulca* L. (Р. трехдольная). Аналогично предыдущей.

233.*Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid. (Многокоренник обыкновенный). В водоемах со стоячей водой по всему городу, чаще всего в поймах Оки и Волги. Бор.-Нем.-Степ.

28 сем. Commelinaceae – Коммелиновые.

234.*Tradescantia virginiana* L. (Традесканция виргинская). Изредка высаживается из комнатной культуры в палисадники на летний период, где разрастается вегетативно. Родина – Северная Америка.

235.*Callisia fragrans* (Lindl.) Woods (Каллизия душистая, Золотой ус, Кошачий ус). Родина – Центральная Америка. Изредка высаживается из комнатной культуры в

открытый грунт и разрастается там вегетативно. Укореняется из выброшенных побегов и разрастается вегетативно. Зиму не переносит. Культивируется как лекарственное.

29 сем. Juncaceae – Ситниковые.

236.*Juncus alpinus* Vill. (Ситник альпийский). По заболоченным лугам в Приок. Бор. Охр.

237.*J. articulatus* L. (С. членистый). По берегам водоемов, сырьим лугам, пустырям, где иногда образует сообщества; газонное на стадионах; по всему городу. Бор.-Нем.

238.*J. bufonius* L. (С. жабий). По сырьим местам, пустырям повсеместно, иногда образуя сообщества; изредка заносится с песком вглубь города. Бор.-Нем.-Степ.

239.*J. compressus* Jacq. (С. сплюснутый). Аналогично предыдущему, но реже.

240.*J. conglomeratus* L. (С. скученный). По берегам водоемов, сырьим лугам по всему городу. Бор.-Нем.

241.*J. effusus* L. (С. сжатый). Изредка по сырьим местам по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

242.*J. filiformis* L. (С. нитевидный). По берегам водоемов поймы Оки и Волги, реже внутренних водоемов в заречной части, по сырьим лугам, где иногда образует сообщества. Бор.

243.*J. minutulus* V. Krecz. et Gontch. (С. маленький). Изредка по сырьим лугам в Сов. Степ. Охр.

244.*J. nastanthus* V. Krecz. et Gontsch. (С. скученоцветный). По берегам Оки в Приок. и Лен. и Волги в Ниж. Бор.-Нем.-Степ. Охр.

245. *J. tenuis* Willd. (С. тонкий). По пустырям, деградированным лугам, обочинам троп. Рассеянно по всему городу. У нас заносное среднеевр.

246.*Luzula multiflora* (Ehrh. et Retz.) Lej. (Ожика многоцветковая). Изредка по разреженным лесам и полянам в нагорной части и Кан. Бор.-Нем.

247.*L. pallescens* (Wahl.) Bess. (О. бледноватая). Изредка по лугам и зарослям кустарников в нагорной части и Сорм. Бор.-Нем.

248.*L. pilosa* (L.) Willd. (О. волосистая). По сосновым лесам и их дериватам. Заречная часть, кроме Лен. Бор.

30 сем. Liliaceae - Лилейные.

Примечание: в настоящее время из этого семейства выделены семейства Alliaceae (Луковые) и Asparagaceae (Спаржевые). Однако, поскольку во "Флоре" В.П.Воротникова с соавторами это разделение не проведено, мы оставляем семейство Лилейных в прежнем, расширенном объеме.

249.*Allium aflatunense* B. Fedtsch. (Лук афлатунский). Изредка разводится как декоративное. Родина – горы Средней Азии.

250.*A. angulosum* L. (Л. угловатый). По пойменным лугам, склонам. В нагорной части и Авт. Нем.-Степ.

251.*A. sericeum* L. (Л. репчатый). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных луковиц. Родина - Египет.

252.*A. fistulosum* L. (Лук дудчатый, Батун, Татарка). Изредка разводится как пищевое и вырастает из оброненных семян и выброшенных корневищ, разрастается вегетативно. Родина - Сибирь.

253.*A. giganteum* Regel (Л. гигантский). Разводится как пищевое и декоративное. Родина - Средняя Азия.

254.*A. montanum* F.W.Schmidt, *A. senescens* L. (Л. горный, стареющий). Разводится как декоративное и пищевое и разрастается вегетативно. Родина – Западная Европа.

255.*A. nutans* L. (Л. поникающий, Слизун). Изредка разводится как пищевое и декоративное. Родина - Сибирь.

256.*A. oleraceum* L. (Л. огородный). Изредка по лугам. Приок. Нем.

257. *A. porrum* L. (Л. порей). Изредка разводится как пищевое и разрастается вегетативно. Родина - Египет.

258. *Aloe* sp. (Алоэ, различные виды). Изредка высаживаются на летний период в палисадники из комнатной культуры. Родина – Африка.

259. *A. sativum* L. (Чеснок). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных луковиц; разрастаясь вегетативно, образует сообщества. Родина - Египет.

260. *A. schoenoprasum* L. (Л. скорода). По лугам в поймах Оки и Волги. Разводится как пищевое и декоративное и вторично дичает. Степ.

261. *A. victorialis* L. (Л. победный). Разводится как декоративное. Родина - Сибирь.

262. *Asparagus officinalis* L. (Спаржа лекарственная). Изредка по лугам в долинах Оки и Волги. По всему городу кроме Моск. Заносится с песком вглубь города. Разводится как декоративное и вторично дичает. Степ.

263. *Chionodoxa luciliae* Boiss. (Хионодокса Люцилии). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Малая Азия.

264. *C. sardensis* Barr et Sugden (Х. сардинская). Аналогично предыдущему. Родина - Малая Азия.

265. *Colchicum autumnale* L. (Безвременник осенний). Разводится как декоративное. Родина – Западная Европа.

266. *Convallaria majalis* L. (Ландыш майский). В различных лесах, парках и зарослях кустарников повсеместно. Разводится как декоративное и вторично дичает. Местным населением собирается на букеты. Бор. Охр.

267. *Gagea erubescens* (Bess.) Roem. (Гусиный лук краснеющий). По сухим лугам, газонам. Приок. Нем. Охр.

268. *G. granulesa* Turcz. (Г.л. зернистый). Аналогично предыдущему, но много реже.

Примечание: в IV томе «Флоры европейской части СССР» этот вид вообще не указан.

269. *G. lutea* (L.) Ker-Gawl. (Г.л. желтый). Изредка по широколиственным лесам в нагорной части и в парке «Дубки» в Лен. Нем. Охр. Разводится как декоративное и вторично дичает.

270. *G. minima* (L.) Ker-Gawl. (Г. л. малый). Аналогично предыдущему, но гораздо чаще. Распространен по всему городу.

271. *Fritillaria imperialis* L. (Рябчик императорский). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – горы Средней Азии.

272. *F. pallidiflora* Schrenk (Р. белоцветковый). Аналогично предыдущему.

273. *Hemerocallis lilio-asfodelus* L. (Лилейник желтый). Разводится как декоративное, разрастается вегетативно и вырастает из выброшенных корневищ. Родина - Сибирь, Кавказ, Средиземноморье.

274. *H. fulva* L. (Л. рыжий). Аналогично предыдущему, но гораздо чаще. В последнее время замечен одичалым. Родина - Кавказ, Средиземноморье.

275. *Hosta albo-marginata* (Hook.) Hyl. (Хоста белоокаймленная). Разводится как декоративное. Родина - Восточная Азия.

276. *H. fortunei* (Baker) Baily (Х. Форчуна). Разводится как декоративное. Родина – Япония. Примечание: ряд исследователей считает, что этот вид – гибридного происхождения.

Примечание: как декоративные разводятся также и другие виды хост.

277. *Hyacinthus orientalis* L. (Гиацинт восточный). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Передняя Азия.

278. *Kniphofia uvaria* (L.) Hook. (Кни phофия ягодная). Разводится как декоративное. Родина – южная Африка.

279.*Lilium martagon* L. (Лилия саранка). По лугам на склонах. Ниж. Среднеевр. Охр. Кр. Разводится как декоративное.

Примечание: в культуре имеется много гибридных форм лилий. Из отдельных видов сравнительно легко идентифицируются Л. пенсильванская (*L. pennsilvanicum* Ker-Gawl.) и Л. ланцетолистная (*L. lancifolium* Thunb.).

280.*Majanthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt (Майник двулистный). По лесам, чаще всего в заречной части. Во всех районах, кроме Лен. Бор.

281.*Muscari neglectum* Guss. (Гадючий лук незамеченный). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Среднеевр. - степ.

282.*Ornitogalum boucheanum* (Kunth) Ashers. (Птицемлечник Буша). Разводится как декоративное. Родина - Крым.

283.*O. montanum* Сур. (П. горный). Разводится как декоративное. Родина - Средиземноморье.

284.*Paris quadrifolia* L. (Вороний глаз четырехлистный). По широколиственным лесам нагорной части и Авт. Нем.

285.*Polygonatum multiflorum* (L.) All. (Купена многоцветковая). По широколиственным лесам в нагорной части. Разводится как декоративное и вторично дичает. Нем.

286.*P. odoratum* (Mill.) Druce (К. душистая). По лесам заречной части. Бор.

Примечание: в лесах нагорной части изредка встречаются растения купены, соединяющие в себе признаки обоих видов.

287.*Scilla sibirica* Haw s.l. (Пролеска сибирская). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Средиземноморье.

288.*Tulipa*. x hort. (Тюльпан, гибридные формы). Разводится как декоративное и вырастает из выброшенных луковиц. Родина - Средиземноморье.

31 сем. *Amarillidaceae* - Амариллисовые.

289.*Galanthus nivalis* L. (Подснежник). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - Средиземноморье и Северный Кавказ.

290.*Leucojum vernum* L. (Белоцветник весенний). Аналогично предыдущему, но чаще.

291.*Narcissus*. x hort. (Нарцисс, гибридные формы). Разводится как декоративное и вырастает из выброшенных луковиц, разрастается вегетативно, изредка дичает. Родина - Средиземноморье.

32 сем. *Iridaceae* - Ирисовые, Касатиковые.

292.*Crocus flavus* Weston (Шафран желтый). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Средиземноморье.

293.*C. vernus* (L.) Hill (Ш. весенний). Аналогично предыдущему, родина – Западная Европа.

294.*Gladiolus*. x hort. (Гладиолус, Шпажник, гибридные формы). Разводится как декоративное и вырастает из выброшенных луковиц, разрастается вегетативно. Родина - Средиземноморье.

295.*Iris aphylla* L. (Ирис, Касатик безлистный). Изредка разводится как декоративное. Родина – степная полоса России, в т.ч. и юг Нижегородской области. Охраняемое растение области, включенное в Красную книгу области.

296.*I. germanica* L. (И., К. германский). Разводится как декоративное и вырастает из выброшенных корневищ. Родина - Средиземноморье.

297.*I. pseudacorus* L. (И., К. желтый, ложноаировый). По берегам водоемов, сырьем лесам. Авт., Кан., Сорм., Ниж., Сов. Разводится как декоративное и вырастает из выброшенных корневищ. Нем. Охр.

298.*I. sibirica* L. (И., К. сибирский). Изредка в пойменных дубравах Копосовской роще (Сорм.) и Гнилицких дачах (Авт.). Ранее указывался для Слуды (Сов.). Бор.-Нем.-Степ. Охр. Изредка разводится как декоративное.

Примечание: в культуре встречаются и другие, гибридные формы ирисов.

299.*Tigridia pavonia* Ker – Gawl. (Тигридия павлинья). Изредка разводится как декоративное. Родина – центральная Америка.

300.*Tritonia*. x *hort.* (Тритония, гибридные формы). Разводится как декоративное. Родина - южная Африка.

33 сем. Cannaceae – Канновые.

301.*Canna x generalis* Bailey (Канна культурная). Разводится как декоративное, на зиму убирается в помещение. Вид гибридного происхождения.

34 сем. Orchidaceae - Орхидные.

302.*Coeloglossum viride* (L.) C. Hartm. (Пололепестник зеленый). Ранее был указан для Марьиной рощи (Сов). Бор.-Нем. Охраняемое растение области. Кр.

303.*Corallorrhiza trifida* Chatel. (Ладьян трехнадрезный). Ранее был найден на Слуде. (Сов.). Бор. Охр. Кр.

304.*Cypripedium calceolus* L. (Башмачок настоящий). По лесистым склонам. Приок., Ниж. Бор.-Нем. Охр. Кр.

305.*Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soo (Пальчатокоренник Фукса). По лесным полянам. Приок., Сов., Лен. Бор.-Нем. Охр.

306.*D. incarnata* (L.) Soo (П. мясокрасный). По заболоченным лугам. Приок., Сов. Бор.-Нем. Охр.

307.*D. traunsteineri* (Saut.) Soo (П. Траунштейнера). По заболоченным лугам и торфяным болотам. Моск., Сорм. Бор. Охр. Кр.

308.*Epipactis helleborine* (L.) Crantz (Дремлик чемерицелистный). По разреженным лесам и лесным культурам, зарослям кустарников, где иногда доминирует в травянистом ярусе, по паркам, скверам, пустырям. Нагорная часть, Авт., Лен., Сорм. Бор.-Нем.

309.*E. palustris* (L.) Crantz (Д. болотный). По заболоченным лугам. Приок. и Сорм. Бор.-Нем. Охр. Кр.

310.*Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. (Кокушник длиннорогий). В прошлом был найден на Слуде и в Марьиной роще (Сов.), а позднее на заболоченном лугу в Приок. Бор.-Нем. Охр. (Лукина Е.В., Баканина Ф.М., 1997).

311.*Listera ovata* (L.) R.Br. (Тайник яйцелистный). По лесным полянам и лугам. Приок., Сов. Бор.-Нем. Охр.

312.*Orchis militaris* L. (Ятрышник шлемоносный). На остеиненных склонах Слуды (Сов.), в разреженных лесах (Сорм.). Ранее указывался для Марьиной рощи (Сов.). Нем. Кр.

313.*Neottia nidus-avis* (L.) L.C.Ric. (Гнездовка настоящая). Ранее указывалась для Марьиной рощи (Сов.). Бор.-Нем.-Степ. Охр.

314.*Platanthera bifolia* (L.) Rich. (Любка двулистная). В разреженных лесах и на лугах. Приок. Бор. Охр.

315.*P. chlorantha* (Cust.) Reichb. (Л. зеленоцветная). Изредка по опушкам лесов. Приок. Нем. Охр. Кр.

Класс Magnoliopsida, Dicotyledones - Магнолиевые, Двудольные.

35 сем. Salicaceae - Ивовые.

316.*Populus alba* L. (Тополь белый). В поймах Оки, Волги, реже по берегам малых речек. Разводится как декоративное и вторично дичает. Нем.-Степ.

317.*P. angulata* Ait. (Т. угловатый). Разводится как декоративное. Гибрид неизвестного происхождения.

318.*P. balsamifera* L. (Т. бальзамический). Разводится как декоративное, в придорожных насаждениях и лесных культурах и дичает. Почки собираются местным населением как лекарственное сырье. Родина - Северная Америка.

Примечание: в культуре встречаются гибриды этого тополя с лавролистным и черным тополями.

319. *P. x canadensis* Moench (Т. канадский). Единично разводится как декоративное (в парке ННГСХА). Вид гибридного происхождения. Родина – Северная Америка.

320. *P. candicans* Ait. (Т. седоватый). Разводится как декоративное. Гибрид неизвестного происхождения.

321. *P. deltoides* Marsh. (Т. дельтовидный). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

322. *P. laurifolia* Ledeb. (Т. лавролистный). Разводится как декоративное. Родина - Сибирь.

323. *P. nigra* L. (Т. черный). В поймах Оки и Волги, где часто образует сообщества. Разводится как декоративное и вторично дичает. Нем.-Степ.

324. *P. pyramidalis* Roz. (Т. пирамидальный). Разводится как декоративное. Родина - южная Россия.

325. *P. simonii* Carr. (Т. Симона). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Китай.

326. *P. suaveolens* Fisch. (Т. душистый). Разводится как декоративное. Родина - Сибирь.

327. *P. tremula* L. (Осина). По различным лесам, где часто образует сообщества, зарослям кустарников, лугам, пустырям по всему городу. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.

Примечание: в окрестностях пос. Гнилицы встречен естественный гибрид тополя белого и осины; такие же гибриды искусственного происхождения изредка встречаются в озеленении.

328. *Salix alba* L. (Ива белая). В поймах Оки и Волги, реже - в долинах малых речек, где часто образует сообщества. Разводится как декоративное и вторично дичает. Нем.-Степ.

329. *S. acutifolia* Willd. (И. остролистная). По берегам Оки и Волги, где часто образует сообщества; заносится с песком вглубь территории города. Разводится как декоративное и вторично дичает. Весенние побеги с нераспустившимися сережками собираются местным населением на букеты, а ростовые побеги (хлысты) используются для плетения. Степ.

Примечание: многие экземпляры этого вида обнаруживают признаки западного викарирующего вида И. волчниковой (или результата гибридизации с ним?).

330. *S. arbuscula* L. (И. деревцевидная). Изредка разводится как декоративное. Родина – европейский Север.

331. *S. aurita* L. (И. ушастая). По опушкам лесов и пустырям рассеянно в заречной части. Бор.-Нем.

332. *S. babylonica* L. (И. вавилонская). Изредка разводится как декоративное, главным образом в виде гибридов с Ивой ломкой. Настоящая Ива вавилонская у нас зиму не переживает. Родина - Китай.

333. *S. caprea* L. (И. козья). В разреженных лесах, на опушках, в парках, пустырях, где часто образует сообщества. Изредка разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.

Примечание: О.П.Лаврова (ННГАСУ) обнаружила в озеленении в Лен. деревья И. козьей с явными признаками И. египетской (*S. aegyptica* L.).

334. *S. caspica* Pall. (И. каспийская). Единично разводится как декоративное. Родина - южная Россия.

335. *S. cinerea* L. (И. пепельная). По опушкам, зарослям кустарников, болотам, где часто образует сообщества. По всему городу, но в заречной части чаще. Изредка разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.

336. *S. daphnoides* Vill. (И. волчниковая). Единично в плантациях ив в Приок. и в озеленении в Сов. Одичалое по всему городу, где образует сообщества по песчаным

берегам Оки и Волги, гибридизируя с ивой остролистной и вытесняя ее; так же и по песчаным пустырям в заречной части города (см. примечание к п. 329). Среднеевр.

337. *S. dasyclados* Wimm. (И. шерстистопобеговая). По берегам водоемов, где иногда образует сообщества, изредка по пустырям. По всему городу, но в поймах Оки и Волги чаще. Бор.-Нем.

338. *S. fragilis* L. (И. ломкая). В поймах Оки и Волги. Заносится с песком вглубь территории города. Разводится как декоративное и вторично дичает. Гибридизирует с ивой белой. Среднеевр.

339. *S. lapponum* L. (И. лапландская). По торфяным болотам. Моск. Гипоаркт.-Бор. Охр. Кр.

340. *S. myrsinifolia* Salisb. (И. мирзинолистная). По берегам водоемов, опушкам лесов, где иногда образует сообщества. Изредка разводится как декоративное. По всему городу, но в заречной части чаще. Гипоаркт.-Бор.

341. *S. myrtilloides* L. (И. черниквидная). На болоте в Кан. Гипоаркт.-Бор. Охр. Кр.

342. *S. pentandra* L. (И. пятитычинковая). Изредка по берегам водоемов по всему городу, но в заречной части чаще. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.

343. *S. phyllicifolia* L. (И. филиколистная). По окраинам водоемов, чаще в виде гибридов с И. мирзинолистной. Сорм., Кан. Гипоаркт.-Бор. Охр.

344. *S. purpurea* L. (И. пурпурная). Разводится в плантациях ив, реже как декоративное и дичает по всему городу. Степ.

345. *S. rosmarinifolia* L. (И. розмаринолистная). По сосновым борам и их дериватам, песчаным пустырям, сухим лугам. Рассеянно по всему городу, но в заречной части чаще. Бор.-Нем.-Степ.

346. *S. starkeana* Willd. (И. Штарка). По песчаным пустырям. Сорм. Бор.

347. *S. schwerinii* E. Wolf (И. Шверина). Изредка разводится как декоративное. Родина – Восточная Сибирь.

348. *S. triandra* L. (И. трехтычинковая). По берегам водоемов по всему городу, где часто образует сообщества. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.-Степ.

349. *S. viminalis* L. (И. корзиночная). По берегам водоемов по всему городу, но в поймах Оки и Волги чаще. Во многих местах образует сообщества. Местным населением ростовые побеги (хлысты) используются для плетения. Бор.-Нем.

36 сем. Juglandaceae – Ореховые.

350. *Juglans cinerea* L. (Орех серый). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

351. *J. mandshurica* Maxim. (О. манчжурский). Разводится как декоративное. В культурах тополя бальзамического в Приок. встречен выросшим из оброненного ореха. Родина – Дальний Восток.

352. *J. regia* L. (О. греккий). Изредка разводится как декоративное. В условиях Н.Новгорода орехи изредка образуются, но не вызревают. Родина – Передняя Азия.

37 сем. Corylaceae - Лещиновые.

Примечание: во «Флоре восточной Европы» объединено с сем. Березовые.

353. *Corylus avellana* L. (Лещина обыкновенная). В широколиственных лесах в нагорной части города и в Авт., где часто доминирует в кустарниковом ярусе. Иногда образует сообщества. Изредка разводится как декоративное, а также вырастает из оброненных орехов. Местным населением орехи собираются как пищевое, а молодые листья – как лекарственное сырье. Толстые стволы используются как огородные колья. Нем.

38 сем. Betulaceae - Березовые.

354.*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. (Ольха клейкая). По берегам водоемов, где часто образует сообщества и в сырьих лесах по всему городу, но в заречной части чаще. Изредка разводится как декоративное. Бор.-Нем.

355.*A. incana* (L.) Moench (О. серая). Изредка разводится как декоративное и дичает, образуя сообщества. В естественном местообитании в пойме Волги в Сорм. и на Малиновой гряде в Приок. Бор. Охр.

356.*Betula humilis* Schrank. (Береза приземистая). По торфяным болотам. Кан., Сорм., Моск. Гипоаркт.-Бор. Охр. Кр.

Примечание: А.Д.Смирновой и Е.В.Лукиной в Сорм. на торфяном болоте найден гибрид этой березы с березой карликовой (*B. nana* L.).

357.*B. japonica* Sieb. (Б. японская). Изредка в озеленении. Родина – Дальний Восток.

358.*B. aggr. pendula* Roth. (Б. повислая). В лесах всех типов, где часто образует сообщества, в зарослях кустарников, в парках и на пустырях, где также образует сообщества. Разводится как декоративное, в придорожных насаждениях и лесных культурах и вторично дичает. Бор.-Нем.

359.*B. aggr. pubescens* Ehrh. (Б. пушистая). В лесах, чаще в заречной части, по болотам, где часто образует сообщества, реже на пустырях повсеместно. Бор. Сеянцы этой березы, произрастающая в трещинах каменных строений, зачастую имеют признаки, сближающие их с березой приземистой.

Примечание: облистенные побеги обоих видов берез используются местным населением на банные веники, а почки – как лекарственное сырье.

39 сем. Fagaceae - Буковые.

360.*Quercus robur* L. (Дуб летний). В различных лесах, где образует сообщества; по всему городу, но в нагорной части чаще. Разводится как декоративное, в придорожных насаждениях и лесных культурах и вторично дичает. Облистенные побеги используются местным населением на банные веники. Нем. Большие деревья нуждаются в охране.

361.*Q. rubra* L. (Д. красный). Изредка разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

40 сем. Ulmaceae - Вязовые.

362.*Ulmus glabra* Huds. (Вяз шершавый). В широколиственных лесах нагорной части города. Изредка разводится как декоративное. Нем.

363.*U. laevis* Pall. (В. гладкий). В различных лесах по всему городу. Разводится как декоративное, в придорожных насаждениях и лесных культурах и вторично дичает. Бор.-Нем.

364.*U. pumila* L. (В. малый). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Забайкалье.

Примечание: в Авт. в озеленении единично встречаются вязы с явными признаками В. граболистного (*U. caprinifolia* Rupr.ex Suckov).

41 Сем. Moraceae – Тутовые.

365.*Morus alba* L. (Шелковица белая). Единично разводится как декоративное. Родина – Малая Азия.

42 сем. Cannabaceae - Коноплевые.

366.*Cannabis sativa* L. (Конопля посевная). На пустырях по всему городу. У нас только как занесенное с юга области, где ранее выращивалось как техническое (на волокно). Родина - Средняя Азия. В последние годы становится все более редким в городе.

367.*Humulus scandens* (Lour.) Merr., *H. japonicus* Sieb. et Zucc. (Хмель густопильчатый, японский). Единично разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

368.*H. lupulus* L. (Х. вьющийся). В приречных зарослях по всему городу. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.

43 сем. Urticaceae - Крапивовые.

369.*Urtica dioica* L. (Крапива двудомная). Повсеместно в черноольшаниках, где иногда доминирует в травянистом ярусе; в деградированных лесах, парках, на пустырях, где часто образует сообщества; как сорное в огородах. Молодые побеги используются местным населением как пищевое и как лекарственное сырье. Бор.-Нем.

Примечание: по берегу Оки в Лен. и рассеянно в нагорной части произрастает крапива с явными признаками К. Сондена (*U. sondenii* (Simm.) Avror. ex Geltm.), в нагорной части найдены крапивы с явными признаками К опущенной(*U. pubescens* Ledeb.) и К. пикульниколистной (*U. galeopsifolia* Werzb. ex Opiz).

370.*U. urens* L. (К. жгучая). На пустырях, сорное в огородах. Рассеянно по всему городу. Встречается гораздо чаще в сельской местности. Бор.-Нем.-Степ.

44 сем. Santalaceae – Сандаловые.

371.*Thesium arvense* Horvat (Ленец полевой). Изредка по лугам на склонах на Слуде (Сов., Приок.). Степ. Охр. Кр.

45 сем. Aristolochiaceae - Кирказоновые.

372.*Aristolochia clematitis* L. (Кирказон обыкновенный). По берегам Оки и Волги повсеместно. Изредка заносится с песком вглубь города. Степ.

373.*A. macrophylla* Lam. (К. крупноцветковый). Изредка разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

374.*Asarum europaeum* L. (Копытень европейский). В широколиственных, реже смешанных лесах, парках, скверах, зарослях кустарников. Нагорная часть, Авт., Сорм., Кан. Нем.

46 сем. Polygonaceae - Гречишные.

375.*Aconodon weiri* (Fr. Schmidt) Nakai (Таран Вейриха). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Дальний Восток.

376.*Bistorta major* S.F.Gray, *Polygonum bistorta* L. (Змеевик большой, Горец змеинный). По заболоченным лугам, на травянистых склонах, изредка на газонах (занесенное с торфом?). Ниж., Приок. Ранее был найден у Марьиной рощи (Сов.). Корневища изредка используются местным населением как лекарственное сырье. Нем.-Степ. Охр. В последнее время исчез из многих ранее обнаруженных местообитаниях.

377.*Fagopyrum esculentum* Moench. (Гречиха посевная). Изредка разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Передняя Азия.

378.*Fallopia convolvulus* (L.) A. Love, *Polygonum convolvulus* L. (Фаллопия вьюнковая, Горец вьюнковый). На пустырях, сорное в огородах по всему городу. Бор.

379.*F. dumetorum* (L.) Holub, *P. dumetorum* L. (Ф. призаборная, Г. призаборный). Аналогично предыдущему, но реже. Бор.

380.*Persicaria amphibia* (L.) S.F.Gray, *Polygonum amphibium* L. (Горец земноводный). В водоемах поймы Оки и Волги. Бор.-Нем.-Степ.

381.*P. hydropiper* (L.) S. F. Gray, *Polygonum hydropiper* L. (Г. перечный). По берегам водоемов, изредка на пустырях, сорное в огородах. Рассеянно по всему городу. Изредка используется местным населением как лекарственное сырье. Бор.

382.*P. lapathifolia* (L.) S.F.Gray, *Polygonum lapathifolium* L. (Г. щавелелистный). По берегам водоемов, изредка на пустырях. Нагорная часть и Авт. Бор.

383.*P. maculata* (Raf.) S.F.Gray, *Polygonum persicaria* L. (Г. крапчатый, почечуйный). Изредка по берегам водоемов, сырьем местам, пустырям. Иногда образует сообщества. Бор.

384.*P. minor* (Huds.) Opiz, *Polygonum minus* Huds. (Г. малый). В сырых лесах, по лесным дорогам. По всему городу. Бор.

385.*P. orientale* (L.) Tourn., *Polygonum orientale* L. (Г. восточный). Изредка разводится как декоративное и дичает. Родина – Дальний Восток.

386.*P. patula* (Bieb.) Opiz, *Polygonum patulum* Bieb. (Г. отклоненный). В прошлом был найден на песках р. Оки на западной окраине города. Степ.

387.*P. scabra* (Moench) Mold., *Polygonum scabrum* Moench. (Г. шершавый). По берегам водоемов, пустырям, сорное в огородах. Рассеянно по всему городу. Бор.

Род *Polygonum* (Спорыш) выделен из рода *Persicaria* (Горец). Ввиду малой изученности видов этого рода нами дается лишь общее указание без уточнения распространения по городу.

388.*Polygonum arenarium* Waldst. et Kit. (Спорыш песчаный). Степ.

389.*P. arenastrum* Boreau (С. лежачий). Степ.

390.*P. aviculare* L. (С. птичий). На пустырях, в парках, деградированных лесах и лугах, газонное на стадионах, сорное в огородах; иногда образует сообщества; побеги изредка собираются местным населением как лекарственное сырье. Бор.-Нем.-Степ.

391.*P. bellardii* Ail. (С. Беллярди). Нем.-Степ.

392.*P. calcatum* Lindm. (С. топотун). Заносный среднеевр.

393.*P. neglectum* Bess. (С. незамечаемый). Бор.-Нем.-Степ.

394.*P. sabulosum* Worosch. (С. песковый). Бор.-Нем.-Степ.

395.*Reynoutria japonica* Houtt. (Рейноутрия японская). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно, в т.ч. и из выброшенных корневищ. Родина – Дальний Восток.

396.*R. sachalinensis* (Fr. Schmidt) Nakai (Р. сахалинская). Аналогично предыдущему.

Примечание: все экземпляры рейноутрий обнаруживают в себе признаки обоих видов, хотя и с тяготением то к одному, то к другому, т.е. являются гибридными.

397.*Rheum rhabonticum* L. (Ревень культурный). Разводится как пищевое и разрастается вегетативно. Родина - Болгария.

398.*Rumex acetosa* L. (Щавель кислый). По суходольным лугам рассеянно в нагорной части, реже по пустырям. Листья собираются местным населением как пищевое. Изредка разводится в огородах как пищевое. Бор.

399.*R. acetosella* L. (Щ. малый). По сухим лугам, сосновым борам и пустырям, сорное в огородах. По всему городу. Бор.

400.*R. aquaticus* L. (Щ. водный). По сырьим местам, пустырям, изредка как сорное в огородах. Нагорная часть. Бор.

401.*R. confertus* Willd. (Щ. конский). На пустырях, сорное в огородах, изредка по паркам и деградированным лесам. По всему городу. Бор.

402.*R. crispus* L. (Щ. курчавый). Аналогично предыдущему. Бор.-Нем.-Степ.

Примечание: местным населением верхушки плодоносящих побегов трех последних видов собираются на сухие букеты.

403.*R. hydrolapathum* Huds. (Щ. прибрежный). По берегам водоемов в пойме Оки. Авт. Бор.-Нем.

404.*R. maritimus* L. (Щ. приморский). По берегам Оки и Волги, заносится с песком вглубь города. Бор.

405.*R. obtusifolius* L. (Щ. туполистный). В прошлом был найден по берегу Оки в Ниж. Степ.

406.*R. rugosus* Campd. (Щ. морщинистый). Культивируется как пищевое и разрастается вегетативно. Экземпляры из заброшенных посевов по истечению нескольких лет практически неотличимы от щавеля кислого Вероятнее всего Щ. морщинистый представляет окультуренную форму Щ. кислого.

407.*R. thyrsiflorus* Fingerh. (Щ. пирамидальный). В поймах Оки и Волги по всему городу, но в заречной части чаще. Заносится с песком вглубь города. Листья изредка собираются местным населением как пищевое. Изредка разводится в огородах как пищевое. Бор.

408.*R. ucrainicus* Fisch. ex Spreng. (Щ. украинский). Изредка по берегам Оки и Волги по всему городу. Степ.

47 сем. Chenopodiaceae - Маревые.

409.*Atriplex hastata* L. (Лебеда копьевидная). Ранее была найдена на пустыре в Ниж., в настоящее время встречена на пустыре в Приок. Бор.-Нем.-Степ.

410.*A.hortensis* L. (Л. садовая). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа.

A. littoralis L. (Л. прибрежная). По обочине дороги в Приок. Степ.

412.*A. patula* L. (Л. раскидистая). На пустырях, где иногда образует сообщества; повсеместно. Бор.

413.*A. rosea* L. (Л. розовая). Разводится как декоративное и дичает. Среднеевропейский вид.

414.*A. sagittaria* Borkh., *A. nitens* Schkurb. (Л. стреловидная, лоснящаяся). Изредка на пустырях по всему городу. Степ.

415.*A. tatarica* L. (Л. татарская). Изредка на пустырях по всему городу. Степ.

416.*Axyris amaranthoides* L. (Аксирис щирицевый). Изредка по насыпям железных дорог и обочинам Московского шоссе в Кан. Заносное из южной России.

417.*Bassia sedoides* (Pall.) Aschers. (Бассия очитковидная). Была найдена в прошлом на насыпи железной дороги на южной окраине города. Степ.

418.*Beta vulgaris* L. (Свекла обыкновенная). Разводится как пищевое и кормовое и вырастает из оброненных семян и выброшенных корнеплодов. Родина - Передняя Азия.

419.*Chenopodium album* L. (Марь белая). На пустырях, где иногда образует сообщества, как сорное в огородах, в деградированных лесах и лугах. Бор.-Нем.-Степ.

420.*C. ambrosioides* L. (М. амброзиевидная). Заносное по обочине шоссе в Сорм. Заносное растение из Северной Америки.

421.*C. bonus - Henricus* L. (М. доброго Генриха). Разводится как декоративное и дичает в Приок. Родина - Западная Европа.

422.*C. foliosum* (Moench.) Aschers. (М. многолистная). Единично на пустырях. Ниж. Степ.

423.*C. glaucum* L. (М. сизая). На пустырях, сорное в огородах по всему городу. Бор.

424.*C. hybridum* L. (М. гибридная). Аналогично предыдущей.

425.*C. pedunculare* Bertol., *C. viride* L. (М. длиннорожковая, зеленая). Изредка на пустырях по всему городу. Бор.

426.*C. polyspermum* L. (М. многосемянная). Аналогично предыдущей.

427.*C. rubrum* L. (М. красная). Аналогично предыдущей.

428.*C. urbicum* L. (М. городская). Аналогично предыдущей.

Примечание: В Сов на пустырях найдена марь с признаками Мари остроконечной (*C. acuminatum* Willd.), родина которой – южная Сибирь.

429.*Corispermum hyssopifolium* L. (Верблюдка иссополистная). В прошлом была найдена на насыпях железных дорог на западной и южной окраинах города. Степ.

430.*C. marschallii* Stev. (В. Маршалла). По берегам Оки, Волги и песчаным пустырям и насыпям железных дорог по всему городу, но в заречной части чаще. Иногда образует сообщества. Степ.

431.*Kochia schrenkiana* (Moq.) Iljin. (Кохия Шренка). Изредка на пустырях. Приок. Степ.

432.*K. scoparia* (L.) Schrad. (К. венечная). Разводится как декоративное и дичает. Растения песчаных пустырей и насыпей железных дорог - самостоятельный занос с юга. По всему городу, но в заречной части чаще. Родина культурных форм - Средиземноморье.

433.*K. sieversiana* (Pall.) C.A.M. (К. Сиверса). Изредка по насыпям железных дорог. Авт. Степ. В настоящее время рассматривают как подвид *subsp. densiflora* (Moq.) Aell. Кохии венечной.

434.*Salsola collina* Pall. (Солянка холмовая). На пустырях в заречной части. Степ.

435.*S. tragus* L., *S. australis* R.Br. (С. сорная, южная). По песчаным берегам Оки и Волги, реже на песчаных пустырях и насыпях железных дорог по всему городу, но в заречной части чаще. Изредка образует сообщества. Степ.

436.*Spinacea oleracea* L. (Шпинат огородный). Изредка разводится как пищевое. Родина - Иран.

48 сем. Amaranthaceae - Амарантовые, Щирицевые.

437.*Aerva lanata* (L.) Juss ex Shult. (Эрва шерстистая). Изредка разводится как лекарственное. Родина – тропическая Африка и Аравия.

438.*Amaranthus albus* L. (Амарант белый). На пустырях повсеместно. Родина - Северная Америка.

439.*A. blitoides* Wats. (A. жминдовидный). На пустырях, насыпях железных дорог. По всему городу, но в заречной части чаще. Степ.

440.*A. blitum* L., *A. lividus* L. (A. жминдовый, синеватый). Аналогично предыдущему.

441.*A. caudatus* L. (A. хвостатый). Разводится как декоративное. Родина неизвестна.

442.*A. paniculatus* L. (A. метельчатый). Изредка разводится как декоративное и дичает. Степ.

443.*A. retroflexus* L. (A. запрокинутый). По пустырям, сорное в огородах повсеместно. Иногда образует сообщества. Родина - Северная Америка.

444.*Celosia argentea* L. (Целозия серебристая). Разводится как декоративное. Родина – Индия.

445.*Iresine herbstii* Hook. (Ирезине Хербста). Разводится как декоративное. Родина – Бразилия.

446.*I. lindenii* Van Houffe (И. Линдена). Разводится как декоративное. Родина – Эквадор.

49 сем. Nyctaginaceae - Никтагиновые, Ночесветковые.

447.*Myrabilis jalapa* L. (Мирабилис, Ночесветка обыкновенная). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Перу.

50 сем. Phytolaccaceae - Фитолакковые, Лаконосные.

448.*Phytolacca americana* L. (Фитолакка, Лаконос американский). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

51 сем. Cactaceae – Кактусовые.

449.*Opuntia* sp. (Опунция, различные неустановленные виды). Изредка высаживаются на лето из комнатной культуры. Родина – центральная Америка.

52 сем. Caryophyllaceae - Гвоздиковые.

Примечание: в настоящее время из этого семейства выделено семейство Illebraceae – Кудрявковые. Однако, поскольку во «Флоре» В.П.Воротникова с соавторами такое разделение не проведено, мы оставляем семейство Гвоздиковые в прежнем, расширенном объеме.

450.*Agrostemma githago* L. (Куколь обыкновенный). Изредка на пустырях. Ниж., Приок. Бор.

451.*Alsine media* L., *Stellaria media* (L.) Vill (Мокрица средняя, Звездчатка средняя). На пустырях и как сорное по всему городу. Иногда образует сообщества. Бор.-Нем.

452.*A. neglecta* (Weihe) A. et D. Love, *S. neglecta* Weihe (М. незамеченная, З. незамеченная). Единично в Сов. Бор.-Нем.

453.*Arenaria serpillifolia* L. (Песчанка тимьянолистная). На пустырях, в разреженных лесах. Моск., Кан., Авт., Приок., Ниж. Бор.

454.*Cerastium arvense* L. (Ясколка полевая). Изредка по травянистым склонам в нагорной части. Бор. Охр.

455.*C. biebersteinii* DC. (Я. Биберштейна). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Крым.

456.*C. holosteoides* Fries (Я. дернистая). На пустырях, сорное в огородах по всему городу. Бор.

457.*Cocciganthe flos-cuculi* (L.) Fourr, *Coronaria flos-cuculi* (L.) A. Braun (Горицвет кукушкин). На лугах, полянах, изредка на пустырях. Рассеянно по всему городу. Местным населением собирается на букеты. Бор.

458.*Dianthus arenarius* L. (Гвоздика песчаная). В сосновых борах и боровых пустырях. Сорм., Моск. Среднеевр. Охр.

459.*D. barbatus* L. (Г. бородатая). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа.

460.*D. borbasii* Vand. (Г. Борбаша). По разреженным сосновым борам и боровым пустырям. Моск., Сорм., Кан. Степ. Охр.

461.*D. caryophyllus* L. (Г. садовая). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Средиземноморье.

462.*D. chinensis* L. (Г. китайская). Разводится как декоративное. Родина - Китай.

463.*D. deltoides* L. (Г. травянка). По лугам, изредка на пустырях по всему городу. Бор.-Нем.

464.*D. fischerii* Spreng. (Г. Фишера). По лугам и песчаным пустырям в поймах Оки и Волги; в Сов. по лугам на склонах. Степ. Охр.

465.*D. superbus* L. (Г. пышная). По разреженным борам и боровым пустырям. Изредка по всей заречной части кроме Лен. и на оstepненных склонах Слуды в Ниж. Среднеевр. Охр.

Примечание: все виды дикорастущих гвоздик собираются местным населением на букеты и изредка культивируются как декоративные.

466.*Elisanthe noctiflora* (L.) Willk. (Ночесветница ночесветная). Изредка по пустырям в заречной части. Бор.-Нем.

467.*Eremogone biebersteinii* (Schlecht.) Holub, *Arenaria biebersteinii* Schlecht. (Пустынница Биберштейна, Песчанка Биберштейна). Сорное на газонах, песчаных пустырях по берегу Волги в Ниж., изредка разводится как декоративное. Степ. Охраняемое растение области, входящее в Красную книгу области.

468.*E. longifolia* (Bieb.) Fenzl, *Arenaria longifolia* (M.B.) Bieb. (П. длиннолистная, П. длиннолистная). По боровым пустырям в Сорм. Степ. Охр.

469.*E. saxatilis* (L.) Ikonn., *A. syreitschikovii* P. Smirn. (П. каменистая, П. Сырейщикова). По сосновым борам и боровым пустырям. Сорм., Моск. Среднеевр. Охр.

470.*Gypsophila paniculata* L. (Качим метельчатый). Разводится как декоративное. Аборигенный вид области. Степ.

471.*G. perfoliata* L., *G. trichotoma* Wend. (К. пронзеннолистный, триждывильчатый). По насыпям железной дороги в Моск. и Сорм. Заносное из южной России.

472.*Herniaria glabra* L. (Грыжник голый). По пустырям, разреженным сосновым борам. Рассеянно по всему городу, но в заречной части чаще. Бор.

473.*H. polygama* J. Gray (Г. многобрачный). Изредка на пустырях в Авт. Нем. – Степ.

474.*Hybelia nemorum* (L.) Fourr., *Stellaria nemorum* L. (Мокричник дубравный, Звездчатка дубравная). Изредка по широколиственным лесам в нагорной части. Бор.-Нем.

475.*Lychnis chalcedonica* L. (Зорька халкедонская). Разводится как декоративное и дичает. Аборигенный степной вид области.

476.*L. coronaria* L. (З. увенчанная). Разводится как декоративное. Родина – Крым, Кавказ.

477.*Melandrium album* (Mill.) Garcke (Дрема белая). Изредка по пустырям по всему городу. Изредка разводится как декоративное и вторично дичает. Нем. – Степ.

478.*M. dioicum* (L.) Coss. et Germ. (Д. двудомная). Изредка по боровым пустырям. Сорм. Нем. Охр. Кр.

479.*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl. (Мерингия бокоцветная). По опушкам лесов, песчаным пустырям. Сорм., Авт. Бор.

480.*M. trinervia* (L.) Clair. (М. трехжилковая). По опушкам лесов, паркам, пустырям, как сорное в огородах. Рассеянно по всему городу. Бор.

481.*Myosoton aquaticum* (L.) Moench. (Мягковолосник водный). По берегам водоемов, лесам, пустырям, сорное в огородах. По всему городу, но в нагорной части чаще. Бор.

482.*Oberna behen* (L.) Ikonn., *Silene vulgaris* (Moench) Garcke (Хлопушка обыкновенная, Смолевка обыкновенная). По лугам, разреженным лесам, паркам, на пустырях, реже как сорное. По всему городу. Местным населением собирается на букеты. Бор.

483.*O. procumbens* (Murr.) Ikonn., *S. procumbens* Murr. (Х. лежачая, С. лежачая). По берегам Оки и Волги повсеместно, изредка заносится с песком вглубь города. Нем.

484.*Otites borysthenica* (Gruner) Klok., *S. borysthenica* (Gruner) Walters. (Ушанка днепровская, С. днепровская). По песчаным пустырям и опушкам сосняков. Заречная часть кроме Лен. Степ.

485.*Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn., *Gypsophila muralis* L. (Песколюбочка постенная, Качим постенный). На пустырях, сорное в огородах по всему городу. Бор.

486.*Sagina procumbens* L. (Мшанка лежачая). По сырым местам, реже пустырям и как сорное в огородах рассеянно по всему городу, но в заречной части чаще. Иногда образует сообщества. Степ.

487.*Saponaria officinalis* L. (Мыльнянка лекарственная). Разводится как декоративное и дичает. В поймах Оки и Волги может быть в естественном местообитании. Бор.

488.*Scleranthus annuus* L. (Дивала однолетняя). По песчаным пустырям и разреженным лесам в заречной части. Иногда образует сообщества. Бор.-Нем.

489.*S. perennis* L. (Д. многолетняя). В разреженных сосновых борах и боровых пустырях. Моск., Сорм. Среднеевр. Охр.

490.*Silene multiflora* (Waldst. et Kit.) Pers. (Смолевка многоцветковая). В прошлом была найдена на южной окраине города. Степ.

491.*S. nutans* L. (С. поникшая). По лугам в нагорной части. Бор.

492.*S. tatarica* (L.) Pers. (С. татарская). По сухим лугам рассеянно по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

Примечание: оба этих вида собираются местным населением на букеты.

493.*Spergula arvensis* L. (Торица полевая). На песчаных пустырях, как сорное в посевах преимущественно в заречной части. Бор.

494.*Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl. (Торичник красный). На пустырях, сорное в огородах. Рассеянно по всему городу. Бор.-Нем.

495.*Stellaria crassifolia* Ehrh. (Звездчатка толстолистная). Ранее была найдена на заболоченном лугу у Марьиной рощи (Сов.), в настоящее время обнаружена на заболоченном лугу в Ниж. Бор.-Нем.

496.*S. graminea* L. (З. злаковидная). По лугам, изредка на пустырях. По всему городу. Бор.-Нем.

497.*S. hebecalyx* Fenzl (З. пушисточашечная). По опушкам лесов в пойме Волги. Моск. Бор.

498.*S. holostea* L. (З. ланцетная). По широколиственным и смешанным лесам. Нагорная часть, Авт., Кан., Сорм., Моск. Нем. Изредка разводится как декоративное и вторично дичает.

499.*S. longifolia* Muchl. ex Willd., *S. diffusa* Willd. ex Shlecht. (З. длиннолистная, раскидистая). Изредка на лугах, реже пустырях по всему городу. Бор. –нем.

500.*S. palustris* Retz. (З. болотная). По сырым лугам повсеместно. Изредка заносится с торфом в посевы. Бор.-Нем.

501.*Viscaria viscosa* (Scop.) Aschers. (Смолка клейкая). Изредка по лугам по всему городу. Местным населением собирается на букеты. Бор

53 сем. Nymphaeaceae - Нимфейные.

502.*Nuphar lutea* (L.) Smith (Кубышка желтая). В пойменных озерах и заливах Оки и Волги, во внутренних водоемах заречной части города и как занесенное в заброшенном котловане в Приок. Бор.-Нем.-Степ. Охр.

503.*Nymphaea candida* J. et C. Presl. (Кувшинка чисто белая). В пойменных озерах и заливах Оки и Волги, реже в водоемах в глубине заречной части городской территории. Сорм., Моск., Авт., Кан. Бор.-Нем. Охр.

54 сем. Ceratophyllaceae- Роголистниковые.

504.*Ceratophyllum demersum* L. (Роголистник темнозеленый). В стоячих и медленно текучих водоемах по всему городу. Иногда образует сообщества в толще водоемов. Бор.-Нем.

55 сем. Paeoniaceae - Пионовые.

505.*Paeonia anomala* L. (Пион необыкновенный, Марьин корень). Изредка разводится как декоративное и лекарственное и разрастается вегетативно. Культивируемые экземпляры вывезены корневищами из разных мест Сибири и европейского Севера.

506.*P. x hort.* (Пион, садовые гибридные формы). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно.

507.*P. lutea* Franch. (П. желтый). Единично разводится как декоративное. Родина – западный Китай.

56 сем. Ranunculaceae - Лютиковые.

508.*Aconitum lycostonum* L. (Борец северный). В широколиственных и смешанных лесах. Нагорная часть, Кан., Моск., Сорм. Бор. Охр. Иногда собирается местным населением на букеты.

509.*A. napellus* L. s.l. (Б. аптечный). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Скандинавия.

510.*Actaea spicata* L. (Воронец колосистый). По широколиственным лесам и их дериватам, реже паркам в нагорной части города. Нем. Охр.

511.*Adonis aestivalis* L. (Адонис летний). Изредка разводится как декоративное. Родина – степная полоса России.

512.*A. vernalis* L. (А. весенний). Ранее был найден на склонах у пос. Печеры (Ниж.). Степ. Охр. Кр.

513.*Aquilegia vulgaris* L. (Водосбор обыкновенный). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа.

514.*Anemone japonica* hort. non Sieb. et Zucc. (Ветреница японская садовая гибридная). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Продукт гибридизации нескольких дальневосточных видов.

515.*A. sylvestris* L. (Б. лесная). Ранее была найдена на Слуде (Сов.). Степ. Охр. Кр. Изредка разводится как декоративное.

516.*Anemonoides altaica* (С.А.М.) Holub (Ветреничка алтайская). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - Сибирь.

517.*A. nemorosa* (L.) Holub (В. дубравная). По широколиственным лесам и их дериватам рассеянно в Приок. Изредка разводится как декоративное. Нем. Охр.

518.*A. ranunculoides* (L.) Holub (В. лютичная). В лесах, реже в аллеях и парках по всему городу, но в нагорной части чаще. Местным населением собирается на букеты. Разводится как декоративное и вторично дичает. Нем. Охр.

519.*Batrachium circinnatum* (Sibth.) Spach (Батрахий, Шелковник жестколистный). Изредка во внутренних водоемах в Авт. Бор.-нем.- степ. Охр.

520.*B. kauffmannii* (Clerc) V. Krecz. (Б., Ш. Кауфмана). Изредка в водах Волги. Ниж. Бор. Охр.

521.*Caltha palustris* L. (Калужница болотная). Изредка по берегам водоемов в заречной части кроме Лен. Ранее указывалась в нагорной части. В последнее время не найдена, возможно вовсе исчезла с территории города. Единично разводится как декоративное. Бор. Охр.

522.*Cimicifuga simplex* Wormsk. (Клопогон простой). Изредка разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

523.*Clematis flammula* L. (Ломонос жгучий). Разводится как декоративное. Родина - Кавказ.

524.*C. x hort.* (Л., гибридные садовые формы). Разводится как декоративное.

525.*Consolida regalis* S.F. Gray (Консолида полевая). По пустырям, деградированным лугам, насыпям железных дорог, реже как сорное в огородах. Местным населением собирается на букеты. По всему городу. Степ.

526.*Delphinium x hort.* (Дельфиниум, Живокость, гибридные садовые формы). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно.

527.*Ficaria verna* Huds. (Чистяк весенний). По смешанным и широколиственным лесам, реже паркам и скверам. Нагорная часть, Авт., Кан. Нем. Разводится как декоративное и вторично дичает.

528.*Helleborus caucasicus* A.Br. (Морозник кавказский). Единично разводится как декоративное. Родина – Кавказ.

529.*H. purpurascens* Waldst. et Kit. (М. краснеющий). Аналогично предыдущему. Родина – Западная Европа.

530.*Hepatica nobilis* Mill. (Перелеска благородная). Разводится как декоративное. Родина наших перелесок - лесное заволжье нашей области. Охраняемое растение области, входящее в Красную книгу области.

531.*Myosurus minimus* L. (Мышехвостник маленький). Изредка по полям и лугам, где образует эфемерные сообщества. Приок., Сов. Бор.

532.*Nigella x hort.* (Чернушка, гибридные садовые формы). Разводится как декоративное. Родина - Средиземноморье.

533.*Pulsatilla patens* (L.) Mill. (Прострел раскрытий). Изредка в сосновых борах и их дериватах. Заречная часть кроме Лен. В последние годы встречается все реже. Степ. Охр.

534.*Ranunculus acris* L. (Лютик едкий). По лугам, пустырям, сорное в огородах. По всему городу. Степ.

535.*R. aggr. auricomus* L. (Л. золотистый). По опушкам. разреженным лесам, лугам, пустырям. Рассеянно по всему городу, кроме Лен. Степ.

536.*R. aggr. cassubicus* L. (Л. кашубский). В широколиственных, реже смешанных лесах и их дериватах, в парках, скверах. По всему городу, но в нагорной части чаще. Нем. Охр. Разводится как декоративное и вторично дичает.

537.*R. aggr. fallax* (Wimm. et Grab.) Schur (Л. обманчивый). Аналогично предыдущему.

Примечание: крупноцветковые формы трех последних видов нуждаются в охране. Изредка они разводятся как декоративное.

538.*R. flammula* L. (Л. жгучий). По сырым местам в заречной части. Бор.

539.*R. aggr. obtusulus* Markl. (Л. туповатый). Аналогично Л. золотистому.

540.*R. polyanthemus* L. (Л. многоцветковый). По опушкам лесов, лугам, пустырям. Рассеянно по всему городу. Степ.

Примечание: этот вид лютика, а также лютики едкий, золотистый, кашубский и обманчивый собираются местным населением на букеты.

541.*R. repens* L. (Л. ползучий). По сырьим местам, сорное в огородах. По всему городу. Бор.

542.*R. sceleratus* L. (Л. ядовитый). По сырьим местам, берегам водоемов. По всему городу. Бор.

543.*Thalictrum aquilegifolium* L. (Василистник водосборолистный). Разводится как декоративное. Родина - черноземная полоса России, в т.ч. юг Нижегородской области. Охраняемое растение области, входящее в Красную книгу области.

544.*T. flavum* L. (В. желтый). В поймах Оки и Волги. Бор.

545.*T. lucidum* L. (В. светлый). В поймах Оки и Волги. Бор.

546.*T. minus* L. (В. малый). В поймах Оки и Волги, реже по травянистым склонам в нагорной части. Бор.

547.*T. simplex* L. (В. простой). По травянистым склонам в нагорной части. Бор.

Примечание: все виды василистников собираются местным населением на букеты.

548.*Trollius asiaticus* L. (Купальница азиатская). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - Сибирь, северо-западное Приуралье.

549.*T. chinensis* Bunge (К. китайская). Аналогично предыдущему, но родина – Дальний Восток.

550.*T. europaeus* L. (К. европейская). Изредка по заболоченным лугам в Приок. Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Изредка собирается местным населением на букеты. Бор. Охр.

Примечание: при совместном культивировании все эти виды купальниц легко гибридизируют.

57 сем. Berberidaceae - Барбарисовые.

551.*Berberis thunbergii* DC. (Барбарис Тунберга). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Дальний Восток.

552.*B. vulgaris* L. (Б. обыкновенный). Разводится как декоративное и дичает, включаясь в опушечные сообщества лесов и лесных культур, главным образом сосны. Родина - южная Россия.

553.*Mahonia aquifolium* Nutt. (Магония падуболистная). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

58 сем. Magnoliaceae – Магнолиевые.

554. *Magnolia kobus* Thunb. (Магнолия кобус). Единично разводится как декоративное. Родина – Япония.

59 сем.Schizandraceae - Шизандровые.

555.*Schizandra chinensis* (Turcz.) Baill. (Лимонник китайский). Разводится как декоративное, лекарственное и пищевое. Родина – Дальний Восток.

556.*S. propinqua* (Bl.) Hook. fil. (Л. сближенный). Аналогично предыдущему. Родина Гималаи.

60 сем. Papaveraceae - Маковые.

557.*Chelidonium majus* L. (Чистотел большой). На пустырях, сорное в огородах, в парках и деградированных лесах по всему городу. Местным населением собирается как лекарственное сырье. Бор.-Нем.-Степ.

558.*Eshsholtzia californica* Cham. (Эшшольция калифорнийская). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Северная Америка.

559.*Glaucium corniculatum* (L.) J. Rudolf (Мачок рогатый). Изредка на пустырях. Ниж. Заносное из южной России.

560.*Papaver pseudoorientale* (Fedde) Medw. (Мак ложновосточный). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - Кавказ.

561.*P. rhoeas* L. (М. самосейка). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Балканы.

562.*P. somniferum* L. (М. сноторный). Разводится как декоративное, пищевое и наркотическое и вырастает из оброненных семян, иногда тайно рассеивается в огородах наркоманами. Родина неизвестна.

61 сем. Fumariaceae - Дымянковые.

563.*Corydalis intermedia* (L.) Merat (Хохлатка промежуточная). Изредка по широколиственным лесам и аллеям в нагорной части и в парке «Дубки» в Лен. Нем. Охр.

564.*C. solida* (L.) Clairv. (Х. плотная). По широколиственным лесам в нагорной части, реже по паркам и скверам. Разводится как декоративное и вторично дичает. Нем. Охр.

565.*Dicentra formosa* Walp. (Дицентра красивая). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

566.*D. spectabilis* DC. (Д. великолепная). Разводится как декоративное. Родина - Китай.

567.*Fumaria officinalis* L. (Дымянка лекарственная). По пустырям, сорное в городах по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

568.*F. schleicherii* Soy-Willem. (Д. Шлейхера). Изредка на пустырях. Приок. Степ.

62 сем. Brassicaceae, Cruciferae - Капустные, Крестоцветные.

569.*Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande (Чесночница черешковая). По лесным оврагам Оки и Волги в нагорной части, где иногда доминирует в травянистом ярусе. Разводится как декоративное и вторично дичает, иногда образуя сообщества. Нем.

570.*Alissum desertorum* Stapf. (Бурачок пустынный). Изредка по песчаным пустырям по всему городу. Степ.

571.*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. (Резуховидка Талля). По пустырям, сорное в городах. Рассеянно по всему городу. Степ.

572.*Arabis alpina* L. (Резуха альпийская). Разводится как декоративное, разрастается вегетативно и дичает, иногда образуя сообщества. Родина - Арктика, Полярный Урал, Карпаты.

573.*A. pendula* L. (Р. повислая). Изредка на пустырях. Сов. Нем.

574.*A. sagittata* (Bertol.) DC. (Р. стреловидная). По песчаным пустырям в Сорм., травянистым склонам в Приок. Ранее была найдена на Слуде (Сов.). Степ.

575.*Armoracia rusticana* Gaertn., Mey et Schreb. (Хрен обыкновенный). Разводится как пищевое и дичает. Родина - Западная Европа, Кавказ. Сибирь.

576.*Barbarea stricta* Andrz. (Сурепка прямостоячая). В пойме Оки, Волги и изредка на близлежащих пустырях. Бор.-Нем.-Степ.

577.*B. vulgaris* R. Br. (С. обыкновенная). На пустырях, сорное в огородах по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

578.*Berteroa incana* (L.) DC. (Икотник серозеленый). На пустырях, в парках и деградированных лугах по всему городу. Степ.

579.*Brassica campestris* L. (Капуста полевая). Ранее изредка произрастала на пустырях и как сорное в огородах по всему городу; в последние годы не замечена. Бор.-Нем.-Степ.

580.*B. juncea* (L.) Czern. (Горчица сарептская). Изредка разводится как пищевое и дичает, а также произрастает как заносное на пустырях. Родина - южная Россия.

581.*B. napus* L. (Брюква, Рапс). Единично разводится как пищевое и кормовое и вырастает из выброшенных корнеплодов и оброненных семян, занесенных с

черноземом, на газоны и пустыри по всему городу. Родина - Средиземноморье, Средняя Европа.

582.*B. oleracea* L. (Капуста огородная). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных кочерыжек и оброненных семян. Листовая форма распространяется в огородах самосевом. Есть декоративные формы. Родина - Средиземноморье.

583.*B. rapa* L. (Репа). Разводится как пищевое и кормовое и вырастает из выброшенных корнеплодов и оброненных семян. Родина - Передняя азия.

584.*Bunias orientalis* L. (Свербига восточная). На пустырях, деградированных лугах, изредка как сорное в огородах. По всему городу. Местным населением собирается на букеты. Степ.

585.*Camelina microcarpa* Andrz. (Рыжик мелкоплодный). Изредка на пустырях в нагорной части. Степ.

586.*Capsella bursa-pastoris* (L.) Med. (Сумочник пастуший). На пустырях, в парках, деградированных лугах и лесах, сорное в огородах повсеместно. Местным населением изредка собирается как лекарственное сырье. Степ.

587.*Cardamine amara* L. (Сердечник горький). По окраинам водоемов, сырьем оврагам в нагорной части города и Кан. Бор.

588.*C. dentata* Schult. (C. зубчатый). Изредка по сырьим местам по всему городу. Бор.

589.*C. impatiens* L. (C. недотрога). Изредка по густым лиственным лесам по склонам и по сырьим местам в нагорной части, заносится на пустыри. Нем. Охр.

590.*C. parviflora* L. (C. мелкоцветный). Аналогично предыдущему, но реже. Изредка заносится с торфом в посевы.

591.*C. pratensis* L. (C. луговой). По сырьим лугам. Ниж. Бор.

592.*Cardaria draba* (L.) Desv. (Кардария крупковая). На пустырях, по травянистым склонам. Нагорная часть и Лен. Степ.

593.*Chorispora tenella* (Pall.) DC. (Четкoplодник нежный). На пустырях, где иногда образует эфемерные сообщества. Нагорная часть и Авт. Степ.

594.*Dentaria quinquefolia* Bieb. (Зубянка пятилисточковая). По широколиственным лесам в нагорной части. Местным населением собирается на букеты. Нем. Охр. Кр.

595.*Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl (Дескурайния Софьи). По пустырям, сорное в огородах. По всему городу. Степ.

596.*Diplotaxis muralis* (L.) DC. (Двурядник постенный). Изредка на пустырях в Сов. Заносное из Южной России.

597.*Draba nemorosa* L. (Крупка дубравная). По пустырям, разреженным сосновым лесам, лугам на склонах, изредка как сорное в огородах. По всему городу. Степ.

598.*Erophila verna* (L.) Bess. (Веснянка весенняя). По песчаным пустырям и разреженным борам, где образует эфемерные сообщества. Моск., Сорм., Авт. Степ.

599.*Erucastrum armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Gruchet (Рогачка хреноидная). В прошлом была найдена на пустыре на южной окраине города, в настоящее время найдена на обочинах дорог в Сов., Приок., Кан., Моск. Занос из южной России.

600.*Erysimum cheiranthoides* L. (Желтушник левкойный). На пустырях, сорное в огородах, по деградированным лугам, лесам и в парках. По всему городу. Местным населением собирается на букеты. Степ.

601.*E. diffusum* Ehrh. (Ж. раскидистый). В прошлом был найден на насыпи железной дороги на западной окраине города, в настоящее время найден на пустыре в Приок. Заносное из южной России.

602.*E. durum* J. et C. Presl. (Ж. твердый). По насыпям железных дорог, пустырям. Ниж., Сов., Приок., Авт., Лен., Моск. Единично разводится как декоративное. Заносное среднеевр.

603.*E. hieracifolium* L. (Ж. ястребинковый). Изредка на пустырях. Сов., Ниж, Авт. Степ.

604.*E. odoratum* Ehrh. (Ж. душистый). Ранее был найден на Слуде (Сов.).
Заносное с Украины.

605.*Hesperis matronalis* L. (Вечерница обыкновенная, Ночная фиалка).
Разводится как декоративное и дичает, иногда образуя сообщества. Родина - Западная Европа и Кавказ.

606.*Iberis umbellata* L. (Иберис зонтичный). Разводится как декоративное и изредка дичает. Родина - Средиземноморье.

607.*Isatis tinctoria* L. (Вайда красильная). В прошлом была найдена на насыпи железной дороги на юго-восточной окраине города. Занесенное из южной России.

608.*Lepidium densiflorum* Schrad. (Клоповник плотноцветковый). Изредка на пустырях по всему городу. Степ.

609.*L. latifolium* L. (К. широколистный). На пустырях, где часто образует сообщества. Рассеянно по всему городу. Местным населением собирается на букеты. Степ.

610.*L. perfoliatum* L. (К. пронзенолистный). Единично на пустырях. Ниж. Степ.

611.*L. ruderale* L. (К. мусорный). На пустырях, сорное в огородах по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

612.*L. sativum* L. (К. посевной, Кресс-салат). Разводится как пищевое и дичает. Родина - Передняя Азия.

613.*Lobularia maritima* (L.) Desv. (Лобулярия морская). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Крым.

614.*Lunaria annua* L. (Лунник однолетний). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Средиземноморье.

615.*L. rediviva* L. (Л. оживающий). Изредка по лесистым склонам Оки. Сов., Приок. Нем. Охр. Кр.

616.*Mattiola annua* Sweet (Левкой однолетний). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Средиземноморье.

617.*M. incana* R.Br. (Л. седой). Аналогично предыдущему.

618.*Raphanus raphanistrum* L. (Редька дикая). На пустырях, сорное в огородах по всему городу. Бор.

619.*R. sativus* L. (Редька, Редис). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных корнеплодов и оброненных семян. Родина - Средиземноморье.

620.*Rorippa amphibia* (L.) Bess. (Жерушник земноводный). По берегам Оки и Волги, реже – озер в заречной части города; иногда образует сообщества. Бор.

621.*R. austriaca* (Crantz) Bess. (Ж. австрийский). По сырьим местам, пустырям, сорное в огородах. Рассеянно по всему городу. Степ.

622.*R. brachycarpa* (C.A.Mey) Hayek (Ж. короткоплодный). Изредка по сырьим местам и пустырям по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

623.*R. palustris* (L.) Bess. (Ж. болотный). По сырьим местам по всему городу, реже как сорное в посевах; заносится с торфом. Бор.-Нем.-Степ.

624.*R. prostrata* (J.P.Bergeret) Schinz ex Thell., *R. anceps* (Wahlb.) Reichenb. (Ж. простертый, обоюдоострый). Изредка по заторфованным лугам по всему городу. Заносится с торфом в посевы. Бор.-Нем.-Степ.

625.*R. sylvestris* (L.) Bess. (Ж. лесной). По сырьим местам, пустырям по всему городу, но в заречной части чаще. Бор.

626.*Sinapis alba* L. (Горчица белая). Разводится как пищевое и дичает, реже – заносное в посевах кормовых культур. Родина - южная Россия.

627.*S. arvensis* L. (Г. полевая). Изредка на пустырях в нагорной части города. Степ.

628.*Sisymbrium altissimum* L. (Гулявник высокий). На пустырях рассеянно по всему городу. Степ.

629.*S. loeselii* L. (Г. Лёзеля). Аналогично предыдущему.

630.*S. officinale* (L.) Scop. (Г. лекарственный). На пустырях, сорное в огородах по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

631.*S. polymorandum* (Murr.) Roth. (Г. изменчивый). В прошлом был найден на насыпи железной дороги на западной окраине города, в настоящее время на пустырях в Лен. и Приок. Заносное из южной России.

632.*S. wolgense* Bieb. ex Fourn. (Г. волжский). Изредка на пустырях по всему городу, где иногда образует сообщества; изредка культивируется как декоративное. Степ.

633.*Thlaspi arvense* L. (Ярутка полевая). На пустырях и сорное в огородах по всему городу. Иногда образует сообщества. Бор.-Нем.-Степ.

634.*Turritis glabra* L. (Вяжечка гладкая). Изредка по пустырям. Приок., Сов., Авт. Степ.

63 сем. Capparaceae – Каперсовые

635.*Cleome speciosa* Raf. (Клеоме красивая). Изредка разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

64 сем. Resedaceae - Резедовые.

636.*Reseda lutea* L. (Резеда желтая). По открытым склонам Оки на Слуде. Ниж., Сов. Степ. Охр.

65 сем. Begoniaceae - Бегониевые.

637.*Begonia*. x hort. (Бегония, гибридные формы). Разводится как декоративное. Родина - Бразилия.

66 сем. Droseraceae - Росянковые.

638.*Drosera rotundifolia* L. (Росянка круглолистная). По торфяным болотам. Моск., Сорм., Авт. Бор. Охр.

67 сем. Crassulaceae - Толстянковые.

639.*Aizopsis aizoon* (L.) Grulich (Живучник вечно живой). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Сибирь.

640.*A. hybrida* (L.) Grulich., *Sedum hybridum* L. (Ж. гибридный, Очиток гибридный). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Урал.

641.*Hylotelephium maximum* (L.) Holub, *S. telephium* L. (Очитник наибольший, О. заячья капуста). Изредка на полях, по сухим лугам, в разреженных сосновых борах и их дериватах. Рассеянно по всему городу. Степ.

642.*H. spectabile* (Boreau) H. Ohba, *S. spectabile* Boreau (О. видный). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Китай, Корея.

643.*H. triphyllum* (Haw.) Holub, *S. purpureum* (L.) Schult. (О. трилистный, пурпурный). Распространен как Очитник наибольший, но гораздо шире. Местным населением собирается на букеты. Изредка разводится как декоративное и вторично дичает. Степ.

644.*Jovibarba globifera* (L.) J. Parnell, *J. sobolifera* (Sims) Opiz, *Sempervivum soboliferum* Sims (Бородник шароносный, побегоносный, Молодило побегоносное). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Степ. Аборигенное растение области, внесенное в Красную книгу области.

645.*Kalanchoe pinnata* (Lam.) Pers. (Каланхоз перистое). Изредка высаживается из комнатной культуры в открытый грунт на лето. Родина – юго-восточная Азия.

646.*Phedimus spurius* (Bieb.) 't Hart., *S. spurius* Bieb. (Федимус ложный, О. ложный). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Кавказ.

647.*P. stoloniferus* (S.G.Gmel.) t Hart. (Ф. побегообразующий). Аналогично предыдущему. Родина – Кавказ.

648.*Rhodiola rosea* L. (Родиола розовая). Разводится как декоративное и лекарственное. Родина - Арктика, Урал.

649.*R. sachalinensis* Boriss. (Р. сахалинская). Разводится как декоративное и лекарственное. Родина - Дальний Восток.

650.*Sedum acre* L. (Очиток едкий). В разреженных сосновых борах и их дериватах, на сухих деградированных лугах, стенах строений. По всему городу. Степ.

651.*S. album* L. (О. белый). Разводится как декоративное. Родина - Западная Европа, Кавказ.

652.*S. lineare* L. (О. линейный). Разводится как декоративное. Родина - Китай, Япония.

653.*S. reflexum* L. (О. отогнутый). Разводится как декоративное. Родина - Западная Европа.

654.*S. sexangulare* L. (О. шестилистовой). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Украина.

655.*Sempervivum tectorum* L. (Молодило кровельное). Разводится как декоративное и дичает на песчаных пустырях в Сорм. Родина - Западная Европа.

68 сем. Saxifragaceae - Камнеломковые.

656.*Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. et Savat. (Астильбе китайская). Разводится как декоративное. Родина - Дальний Восток.

657.*A. thunbergii* (Sieb. et Zucc.) Miq. (А. Тунберга). Аналогично предыдущему.

658.*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch. (Бадан толстолистный). Разводится как декоративное и лекарственное и разрастается вегетативно. Родина - Сибирь.

659.*Chrysosplenium alternifolium* L. (Селезеночник очереднолистный). Изредка по сырым оврагам в нагорной части города. Бор.

660.*Heuchera sanguinea* Engl. (Гейхера кроваво-красная). Разводится как декоративное. Родина - Мексика.

661.*Saxifraga caespitosa* L. (Камнеломка дернистая). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно, образуя сообщества. Родина - европейский север.

662.*S. umbrosa* L. (К. теневая) Аналогично предыдущему. Родина - Западная Европа.

69 сем. Parnassiaceae - Белозоровые.

663.*Parnassia palustris* L. (Белозор болотный). Изредка по сырым лугам в Приок., ранее указывалось для Слуды (Сов.) Бор. Охр.

70 сем. Hydrangeaceae – Гортензиевые.

664.*Deutzia scabra* Thunb. (Деция шершавая). Разводится как декоративное. Родина - Япония, Китай.

665.*Hydrangea arborescens* L. (Гортензия древовидная). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

666.*H. bretschneideri* Dipp. (Г. Бретшнейдера). Разводится как декоративное. Родина - Китай.

667.*H. paniculata* Sieb. (Г. метельчатая). Разводится как декоративное. Родина - Дальний Восток.

668.*H. petiolaris* Sieb. et Zucc. (Г. черешчатая). Изредка разводится как декоративное. Родина - Дальний Восток.

669.*Phyladelphus* L. (Чубушник). В Н.Новгороде разводится как декоративное множество трудноотличимых форм этого рода, из которых с наибольшей достоверностью удается выделить следующие гибридные формы:

670.*P. coronarius* L. (Ч. венечный).

671.*P. falconeri* Sarg. (Ч. Фальконера).

672.*P. floribundus* Schrad. (Ч. цветущий).

673.*P. latifolius* Schrad., *P. pubescens* Loisel (Ч. широколистный, опущенный).

674.*P. schrenkii* Rupr. et Maxim. (Ч. Шренка).

675.*P. tenuifolia* Rupr. et Maxim. (Ч. тонколистный).

В последние годы наблюдается процесс натурализации этого рода: самосевные экземпляры чубушника появляются на насыпях железных дорог, каменных стенах и т.п.

71 сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые.

676.*Ribes alpinum* L. (Смородина альпийская). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Карпаты, Кавказ.

677.*R. aureum* Pursh. (Смородина золотистая). Разводится как декоративное и пищевое и дичает. Родина - Северная Америка.

678.*R. grossularia* L., *R. reclinatum* L., *Grossularia reclinata* (L.) Mill. (Крыжовник отклоненный). Разводится как пищевое и дичает, включаясь в кустарниковый ярус разреженных лесов, главным образом сосновых и культур сосны. Аборигенный окультуренный вид. Бор.

679.*R. lucidum* Kit. (Смородина блестящая). Разводится как декоративное. Родина - северо-западная Россия.

680.*R. nigrum* L. (С. черная). По берегам водоемов, сырьим оврагам и лесам. Изредка по всему городу. Местным населением плоды собираются как пищевое и лекарственное, как лекарственное и ароматическое собираются почки. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор. Естественные заросли черной смородины нуждаются в охране.

681.*R. odoratum* Wendl. (С. душистая). Разводится как декоративное и пищевое и дичает. Родина - Северная Америка.

682.*R. rubrum* L. (С. садовая, красная). Разводится как пищевое и дичает, в т. ч. белоплодые формы. Встречаются также садовые смородины с признаками смородины колосистой и смородины альпийской (в селекции смородин используется несколько видов). В таком случае часть экземпляров одичалых смородины альпийской и смородины колосистой могут быть выросшими из семян смородины садовой, занесенных птицами, или людьми.

683.*R. spicatum* Robson, *R. pubescens* (Hartm.) Hedl, *R. hispidulum* A. Pojark. (С. колосистая, пушистая, щетинистая). По лесным оврагам и тенистым опушкам рассеянно по всему городу, кроме Лен. Бор. Охр.

684.*R. uva-crispa* L. (Крыжовник обыкновенный). Разводится как пищевое, часто в виде гибридов с К. отклоненным и дичает.

72 сем. Hamamelidaceae – Хамамелисовые.

685.*Hamamelis virginiana* L. (Хамамелис виргинский). Единично разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

73 сем. Rosaceae - Розовые.

686.*Agrimonia eupatoria* L. (Репяшок аптечный). На пустырях, деградированных лугах и лесах изредка в нагорной части. Местным населением собирается как лекарственное сырье. Нем.-Степ.

687.*A. pilosa* Ledeb. (Р. волосистый). Аналогично предыдущему, но в основном произрастает по лугам на склонах. Нем.

Alchemilla L. (Манжетка). По лугам (преимущественно в нагорной части города), лесным полянам, реже на пустырях, в разреженных лесах и парках (преимущественно в заречной части города) с травянистым ярусом лугового типа, а также в расположенных там же заброшенных садовых участках.

Помещаемый ниже список видов этого рода ввиду плохой изученности не содержит указаний на распространение по городу.

Сборы, содержащиеся в нашем гербарии были просмотрены известным знатоком манжеток Нижегородской области А.В.Чкаловым.

688.*A. baltica* Sam. ex Juz. (М. балтийская).

Примечание: часть экземпляров обнаруживает явные признаки более северного вида *M. Vixhurya* (*A. wichurae*(Buser) Stefansson).

689.*A. breviloba* H.Lindb. (М. коротколопастная).
690.*A. calvipes* Juz. (М. голочерешковая). Этот вид приведен в 9 издании “Флоры” П.Ф.Маевского для Горького, но не указан в 10 томе “Флоры восточной Европы”, где считается синонимом *A. devestiens* Juz.(М. неприкрытая).

691. *A. cheirochlora* Juz. (М. яркозеленая).
692. *A. conglobata* H.Lindb. (М. шаровидноскученная).

693. *A. cymatophylla* Juz. (М. волнистолистная).
694. *A. gibberulosa* H. Lindb.(М. бугорчатая).

695. *A. glaucescens* Wall (М. сизоватая).
696. *A. glyphodonta* Juz. (М. вырезано-зубчатая).

697. *A. heptagona* Juz. (М. семиугольная).
698. *A. hirsutocaulis* H.Lindb. (М. шершавостебельная).

A. leiophylla Juz. (М. гололистная).
700. *A. lessingiana* Juz. (М. Лессинга).

701. *A. lindbergiana* Juz., *A. atrifolia* Zam. (М. Линдберга, чернолистная).
702. *A. litwinowii* Juz. (М. Литвинова).

703. *A. micans* Buser, *A. gracilis* Opiz (М. блестящая, стройная).

704. *A. monticola* Opiz (М. городчатая).
705. *A. nemoralis* Alech. (М. дубравная).

A. plicata Buser (М. складчатая).
707. *A. prasina* Juz. (М. бледнозеленая).

708. *A. propinqua* H.Lindb. ex Juz. (М. близкая).

709. *A. sarmatica* Juz. (М. сарматская).

710. *A. semilunaris* Alech. (М. полулуная).
711. *A. stellaris* Juz. (М. звездчатая).

712. *A. subcrenata* Buser (М. городковатая).

713. *A. substrigosa* Juz. (М. щетинистая)

714. *A. vulgaris* L., *A. acutiloba* Opiz (М. обыкновенная, остролистная).

Примечание: особняком стоят 715.*A. mollis* (Buser) Rothm. (М. мягкая), разводимая как декоративное и разрастающаяся вегетативно; ее родина – Западная Европа и также разводимая и разрастающаяся вегетативно 716.*A. flabellata* Buser (М. вееровидная), чья родина – Карпаты, Крым.

717. *Amelanchier alnifolia* (Nutt.) Nutt. (Ирга ольхолистная). Разводится как декоративное и пищевое и дичает, включаясь в кустарниковый ярус сосновых боров и культур сосны. Родина - Северная Америка.

718. *A. florida* Lindl. (И. цветущая). Аналогично предыдущей.

719. *A. spicata* (Lam.) C. Koch (И. колосистая). Аналогично предыдущей.

720. *Amygdalus nana* L. (Миндаль, Бобовник низкий). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - черноземная полоса России, в т.ч. юг Нижегородской области. Охраняемое растение области, входящее в Красную книгу области.

721. *Armeniaca manshurica* (Koehne) Skvortz. (Абрикос манчжурский). Изредка разводится как декоративное. Родина - Дальний Восток.

722. *A. vulgaris* Lam. (А. обыкновенный). Изредка разводится как декоративное и пищевое и вырастает из оброненных косточек. Подобные самосевные экземпляры обыкновенно живут не более 3 – 5 лет, потом вымерзают. Единственное самосевное деревце, дававшее цветы и единичные плоды произрастало на пустыре в Сов. Родина – Кавказ.

723. *Aronia mitcshurinii* A. Skvorts. et Maitull. (Арония Мичурина). Разводится как пищевое и декоративное и дичает. Вид искусственного гибридного происхождения.

724.*Aruncus vulgaris* Raf. (Волжанка обыкновенная). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Кавказ и Западная Европа.

725.*Cerasus avium* (L.) Moench. (Вишня птичья, Черешня). Изредка разводится как декоративное. Родина - Кавказ, южная европа, Малая Азия.

726.*C. besseyi* Wangh. (Б. Бесси, песчаная). Изредка разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

727.*C. pennsylvanica* Lois (Б. пенсильванская). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

728.*C. tomentosa* (Thunb.) Wall. (Б. войлочная). Разводится как пищевое и дичает. Родина - Япония, северо-западный Китай, Гималаи.

729.*C. vulgaris* Mill. (Б. обыкновенная). Разводится как пищевое и декоративное и дичает, включаясь в кустарниковый ярус сосновых боров и культур сосны. Гибрид черешни и вишни степной, кустарниковой (*C. fruticosa* Pall.), аборигенного растения черноземной полосы России, в т.ч. юга нашей области.

730.*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach., *C. maulei* (Mast.) C.K.Schneid. (Айвочка, Хеномелес японский, Маулея). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - Япония.

731.*Comarum palustre* L. (Сабельник болотный). По берегам водоемов, сырьим лугам, болотам в заречной части. Ранее изредка встречался в нагорной части. Бор.

732.*Cotoneaster horizontalis* Dcne (Кизильник горизонтальный). Единично разводится как декоративное. Родина – западный Китай и Гималаи.

733.*C. integrifolia* Medik. (К. цельнокрайний). Изредка разводится как декоративное и дичает. Родина – Крым, Кавказ, Западная Европа.

734.*C. lucidus* Schlecht. (К. блестящий). Разводится как декоративное и дичает, включаясь в кустарниковый ярус сосновых боров и культур сосны. Родина - Восточная Сибирь.

735.*C. melanocarpa* Fisch. ex Blytt. (К. черноплодный). Изредка разводится как декоративное и дичает. Экземпляры на мергелистых склонах Оки и Волги в нагорной части города могут быть в естественном местообитании и нуждаются в охране. Растение внесено в Красную книгу области. Степ.

736.*C. racemiflora* (Desf.) C. Koch (К. кистецветный). Изредка разводится как декоративное. Родина – Кавказ, Средняя Азия.

737.*C. tomentosus* (Ait.) Lindl. (К. войлочный). Аналогично предыдущему. Родина - южная Европа, западная Азия.

738.*Crataegus x almaatensis* A. Pojark. (Боярышник алмаатинский). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Средняя Азия.

749.*C. ambigua* C.A.Mey ex A. Beck. (Б. сомнительный). Разводится как декоративное. Родина – Кавказ.

740.*C. arnoldiana* Sarg. (Б. Арнольди). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

741.*C. chlorocarpa* Ashe Lenne et C.Koch, *C. altaica* Lge (Б. желтоплодный, алтайский). Разводится как декоративное. Родина – Сибирь.

742.*C. chlorosarca* Maxim. (Б. зеленомясый). Разводится как декоративное. Родина - Дальний Восток.

743.*C. flabellata* (Bosc ex Spach) C. Koch (Б. веерообразный). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

744.*C. korolkovii* L. Henry (Б. Королькова). Разводится как декоративное. Родина – Средняя Азия.

745.*C. x kyrtostila* Fingerh. (Б. согнутостолбиковый). Гибрид *C. rhipidophylla* x *C. monogyna*. Разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Россия.

746.*C. maximoviczii* Schneid. (Б. Максимовича). Разводится как декоративное. Родина - Дальний Восток.

747.*C. mollis* (Torr et Gray) Scheele (Б. мягкий). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

748.*C. nigra* Waldst. et Kit. (Б. черный). Разводится как декоративное. Родина - юго-восточная Европа.

749.*C. pentagina* Waldst. et Kit. (Б. пятипестичный). Разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Россия.

750.*C. rhipidophylla* Gand., *C. monogyna* Jacq.(Б. опахалолистный, Б. однопестичный). Разводится как декоративное, родина – Западная Европа, Кавказ.

751.*C. rivularis* Nutt. (Б. приречный). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

752.*C. sanguinea* Pall. (Б. кроваво-красный). Разводится как декоративное, лекарственное и пищевое и дичает. Аборигенный вид юга нашей области. Сиб.

753.*C. songarica* C. Koch (Б. сонгарский). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Средняя Азия.

754.*C. stevenii* A. Pojark. (Б. Стевена). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Крым.

755.*C. submollis* Sarg. (Б. мягкокративное). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

Примечание: боярышники кроваво-красный, алмаатинский, опахалолистный, алтайский, согнутостолбиковый, зеленомясый разводятся и в придорожных аллеях и в лесных культурах.

Примечание: плоды боярышников (особенно красноплодных видов) собираются местным населением как лекарственное сырье.

756.*Cydodia oblonga* Mill. (Айва обыкновенная). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно, изредка вырастает из оброненных плодов. Родина – Кавказ.

757.*Filipendula kamtschatica* (Pall.) Maxim. (Таволга камчатская). Единично разводится как декоративное. Родина - Дальний Восток.

758.*F. ulmaria* (L.) Maxim. (Т. вязолистная). По берегам водоемов, сырьим лугам и лесам по всему городу. Бор.

759.*F. vulgaris* Moench. (Т. обыкновенная). По лугам на склонах, реже на газонах в нагорной части. Местным населением собирается на букеты. Степ.

760.*Fragaria grandiflora* Ehrh. (Земляника крупноцветковая, садовая) Разводится как пищевое и дичает. Продукт гибридизации в Голландии двух американских видов земляники: *F. chiloensis* Duch.(З. чилийская) и *F. virginiana* Duch.(З. виргинская). Исходные виды изредка встречаются у нас в культуре и также дичают.

761.*F. moschata* Duch. (З. мускусная). Изредка по широколиственным лесам нагорной части города. Нем. Охр. В прошлом культивировалось как пищевое и одично по всему городу. Гибридизирует с З. садовой и З. лесной; плоды этих гибридов несъедобны.

762.*F. vesca* L. (З. лесная). По опушкам, полянам, разреженным лесам и лугам по всему городу. Разводится как пищевое и декоративное и вторично дичает. По всему городу. Бор.-Нем.

763.*F. viridis* Duch. (З. зеленая). По лугам на склонах в нагорной части. Изредка разводится как пищевое и декоративное и вторично дичает; гибридизирует с З. лесной. Степ.

Примечание: плоды всех дикорастущих земляник собираются местным населением как пищевое и лекарственное.

764.*Geum coccineum* Sibth. (Гравилат кроваво-красный). Разводится как декоративное. Родина - Кавказ.

765.*G. rivale* L. (Г. речной). По сырьим широколиственным и смешанным лесам, зарослям кустарников, реже по заболоченным лугам по всему городу. Местным населением собирается на букеты. Бор.

766.*G. urbanum* L. (Г. городской). По разреженным лесам, пустырям, паркам, сорное в огородах. По всему городу. Бор.-Нем.

767.*Malus baccata* L. (Яблоня ягодная). Разводится как декоративное, а также в составе придорожных насаждений и лесных культур и дичает. Родина - Сибирь.

768.*M. cerasifera* Spach. (Я. вишнеплодная). Изредка разводится как декоративное и плодовое, а также в составе придорожных насаждений и дичает. Вид неясного гибридного происхождения.

769.*M. domestica* Borkh. (Я. домашняя). Разводится как пищевое и декоративное и дичает, включаясь в опушечные сообщества. Плоды таких одичалых яблонь крупнее плодов диких яблонь, сочны, но большей частью безвкусны. Родина - Кавказ и Средняя Азия. Часть сортов - продукт местной российской селекции.

770.*M. manshurica* (Max.) Kom. (Я. манчжурская). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Дальний Восток.

771.*M. niedzwetzkiana* Diekk. (Я. Недзвецкого). Изредка разводится как декоративное. Родина - Средняя Азия.

772.*M. praecox* (Pall.) Borkh. (Я. ранняя). Изредка по опушкам лесов в нагорной части и Авт. Нем. Охр.

773.*M. prunifolia* Willd. (Я. сливолистная, Китайка). Изредка разводится как пищевое и дичает. Продукт российской селекции, гибридный вид не вполне ясного происхождения.

774.*M. x purpurea* (Barbier) Rehd. (Я. пурпурная). Изредка разводится как декоративное. Вид гибридного происхождения.

775.*M. sylvestris* Mill. (Я. лесная). В лесах по всему городу, кроме Лен. Среднеевр. Охр.

Примечание: поскольку при селекции культурных яблонь использовались яблоня лесная и яблоня ранняя, то не исключено, что часть экземпляров диких яблонь (особенно яблоня ранняя, которая плохо отличима от одичалой яблони домашней) выросла из выброшенных плодов культурных яблонь. Не исключено также, что часть произрастающих в лесах экземпляров яблони ягодной выросла из выброшенных плодов культурной яблони ранетки, продукта гибридизации яблони домашней и яблони ягодной.

776.*Mespilus germanica* L. (Мушмула германская). Ранее разводилась как декоративное. (Отчет о деятельности городского агронома. 1913). Родина - Кавказ, Средняя и Передняя Азия.

777.*Padus avium* Mill. (Черемуха обыкновенная). По берегам водоемов, опушкам по всему городу, плоды собираются местным населением как лекарственное сырье, почки - для ароматизации водки, цветущие побеги - на букеты; разводится как декоративное и вторично дичает. Бор. Охр.

778.*P. maackii* (Rupr.) Kom. (Ч. Маака). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Дальний Восток.

779.*P. serotina* (Ehrh.) Borkh. (Ч. поздняя). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

780.*P. virginiana* (L.) Mill. (Ч. виргинская). Разводится как декоративное и пищевое и дичает. Родина - Северная Америка.

Примечание: в прошлом на территории города разводился как пищевое церападус, гибрид виргинской черемухи и вишни обыкновенной.

781.*Persica vulgaris* Mill. (Персик обыкновенный). Однажды вырос из оброненной косточки на насыпи железной дороги в Моск. Зиму этот сеянц не пережил. Родина - Китай.

782.*Physocarpus capitatus* (Pursh.) Ktzl. (Пузыреплодник головчатый). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

783.*P. intermedia* (Rydb.) C.K. Schneid. (П. промежуточный). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

784.*P. opulifolia* (L.) Maxim. (П. калинолистный). Разводится как декоративное, в составе придорожных насаждений и лесных культур и дичает, включаясь в опушечные сообщества лесов и лесных культур, главным образом, сосны. Родина - Северная Америка.

785.*Potentilla anserina* L. (Лапчатка гусиная). По берегам водоемов, пустырям, деградированным лугам, газонное на стадионах. По всему городу. Бор.

786.*P. arenaria* Borkh. (Л. песчаная). На песчаных пустырях и в разреженных сосновых борах. Сорм. Степ. Охр.

787.*P. argentea* L. (Л. серебристая). По сухим лугам и сухим разреженным лесам, пустырям по всему городу. Степ.

788.*P. bifurca* L. (Л. двувильчатая). Изредка в скверах, на пустырях и насыпях железных дорог по всему городу. Степ.

789.*P. erecta* (L.) Raeusch. (Л. прямостоячая). По сырым лесам и лугам, болотам в заречной части. Ранее изредка встречался в нагорной части. Бор.

790.*P. fruticosa* L., *Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwartz (Л. кустарниковая, Пятилисточник кустарниковый). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Дальний Восток.

791.*P. goldbachii* Rupr. (Л. Гольдбаха). Изредка по травянистым склонам и пустырям по всему городу, но в нагорной части чаще. Степ.

792.*P. heptaphylla* L. (Л. семилистная). Изредка на пустырях по всему городу. Степ.

793.*P. indica* (Andr.) Th. Wolf, *Duchesnea indica* (Andrews) Focke (Л. индийская, Дюшения индийская). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Индия, Китай, Япония.

794.*P. intermedia* L. (Л. промежуточная). Изредка по травянистым склонам и пустырям в нагорной части. Степ.

795.*P. norvegica* L. (Л. норвежская). Изредка на пустырях по всему городу. Степ.

796.*P. supina* L. (Л. лежачая). Изредка на песчаных пустырях по всему городу. Сиб.

797.*Prunus cerasifera* Ehrh. (Алыча). Разводится как пищевое очень редко, но выросшие самосевом из оброненных косточек слив дерева алычи встречаются на пустырях и в разреженных лесах по всему городу, поскольку алыча - одна из родительских форм сливы. Родина алычи - Кавказ.

798.*P. domestica* L. (Слива домашняя). Разводится как пищевое и дичает. Продукт гибридизации алычи и терна. Родина - Кавказ и Передняя Азия.

799.*P. insititia* L. (Тернослива). Изредка разводится как пищевое. Гибрид терна и сливы. Родина - Кавказ.

800.*P. spinosa* L. (Терн). В прошлом разводился как пищевое, в настоящее время очень редок, возможно, вовсе исчез из культуры. Родина - Средиземноморье, Кавказ, Центральная Европа.

801.*Rugacantha coccinea* Roem. (Пираканта кроваво-красная). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - Крым, Кавказ, Балканы, Гималаи, Китай.

802.*Pyrus communis* L. (Груша обыкновенная). Разводится как пищевое и декоративное и дичает, включаясь в опушечные сообщества, в подлесок культур сосны и разреженных сосновых боров. Родина - Средиземноморье.

Примечание: ряд самосевно выросших экземпляров груш обнаруживает явные признаки Г. дикой - *P. pyraster* (L.) Burgsd., южнорусского степного вида.

803.*P. ussuriensis* Maxim. (Груша уссурийская). Разводится как декоративное и дичает аналогично предыдущей. Родина - Дальний Восток.

804.*Rosa acicularis* Lindl. (Роза иглистая). Изредка разводится как декоративное и дичает. Родина - европейский север России, в т.ч. и наше лесное заволжье.

805.*R. arvensis* Huds. (Р. пашенная). Разводится как декоративное и встречается как заносное по насыпям железных дорог и обочинам шоссе. Среднеевропейский вид.

806.*R. canina* L. s.l.(Р. собачья). Разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Россия.

Примечание: изредка встречаются экземпляры с признаками близких видов *R. subcanina* (Christ) Dalla Torre et Sarnt.(Р. почти-собачья) и *R. lupulina* Dubovik (Р. волчья).

807.*R. x centifolia* L. (Р. столистная). Разводится как декоративное. Вид гибридного происхождения.

808.*R. corymbifera* Borkh. (Р. щитконосная). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Кавказ, Средняя Азия.

Примечание: в культуре распространены гибриды этой розы с розой французской, приближающиеся то к одному, то к другому родителю и имеющие собственное название *R. x alba* L. Плоды их большей частью не образуются или не вызревают.

809.*R. foetida* Herrm. (Р. вонючая). Разводится как декоративное. Родина - горы Средней Азии.

810.*R. x francofurtiana* Munchh. (Р. франкфуртская). Разводится как декоративное. Вид гибридного происхождения.

811.*R. gallica* L. (Р. французская). Разводится как декоративное, б.ч. в оранжереях. В открытом грунте на зиму укрывается, или пересаживается обратно в оранжерею. Родина - Средиземноморье.

812.*R. glauca* Pourret (Р. сизая). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа.

813.*R. majalis* Herrm. s.l. (Р. майская). Изредка по берегам водоемов, сырьим лесам и зарослям кустарников. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.

Примечание: в культуре и дикорастущими встречаются розы с признаками близких видов *R. glabrifolia* C.A.Mey ex Rupr.(Р. гололистная), *R. pratorum* Sukacz. (Р. луговая), *R. gorenkensis* Bess. (Р. горенковская).

814.*R. maximowicziana* Regel (Р. Максимовича). Культивируется как декоративное. Родина – Дальний Восток.

815.*R. multiflora* Thunb. (Р. многоцветковая). Разводится как декоративное. Родина - Корея, Тайвань, Япония.

816.*R. pimpinellifolia* L., *R. spinosissima* L. (Р. бедренцелистная, колючайшая). Разводится как декоративное и дичает. Родина – южная Россия. На мергелистых склонах Оки и Волги может быть в естественном местообитании.

Примечание: в культуре и одичалыми встречаются розы с признаками близкого вида *R. tschatyrdagi* Chrshan. (Р. чатырдагская).

817.*R. rubiginosa* L., *R. eglanteria* L. (Р. ржавчинная, эглантерия). Изредка разводится как декоративное и дичает. Среднеевр.

818.*R. rugosa* Thunb. (Р. морщинистая). Разводится как декоративное и пищевое и дичает. Родина - Дальний Восток.

819.*R. villosa* L. s.l., *R. pomifera* Herrm. (Р. мохнатая, яблочная). Культивируется как декоративное и дичает.

Примечание: в пределах этого сборного вида встречаются экземпляры роз с признаками розы мягкой (*R. mollis* Smith).

Примечание: как декоративное разводятся т.н. «сортовые розы», представляющие собой сложные гибриды, часто нескольких видов, в т.ч. с участием розы китайской («чайной») – *R. chinensis* Jack., родина которого Япония – Китай. В

последнее время предпринимаются попытки содержать этот вид в открытом грунте с укрытием на зиму.

Примечание: плоды всех видов роз собираются местным населением как лекарственное сырье.

820.*Rubus alleghenensis* Porter (Ежевика аллеганская). Разводится как пищевое и дичает. Родина - Северная Америка.

Примечание: ряд экземпляров обнаруживают признаки Е. канадской (*R. canadensis* L.).

821.*R. caesius* L. (Е. сизая). По берегам водоемов, опушкам, зарослям кустарников, пустырям по всему городу. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.

Примечание: изредка встречается гибрид ежевики сизой и малины обыкновенной.

822.*R. idaeus* L. (Малина обыкновенная). По разреженным лесам, лесным культурам, главным образом, сосны, зачастую доминируя в кустарниковом ярусе, по вырубкам, зарослям кустарников. Иногда образует сообщества. По всему городу, но в заречной части чаще. Разводится как пищевое и вторично дичает. Одичалые экземпляры культурной малины отличаются от дикорастущей большей величиной плодов. Местным населением плоды культурной и дикорастущей малин заготавливаются как лекарственное сырье. Бор.

Примечание: изредка разводятся как пищевое и дичают гибриды малины обыкновенной и щетинистой (*R. strigosus* Michx., североамериканский вид)

823.*R. nessensis* W. Hall (Куманика нессская). Изредка по опушкам заболоченных лесов и окраинам болот. Авт., Моск. Бор. -Среднеевр. Охр.

824.*R. occidentalis* L. (М. западная, или ежевикообразная). Единично разводится как пищевое в Сов. Родина – Северная Америка. Примечание: гибриды этой малины с малиной обыкновенной достаточно распространены в культуре как пищевые и дичают.

825.*R. odoratus* L., (М. душистая). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Северная Америка.

826.*R. parviflorus* Nutt. (М. мелкоцветная). Аналогично предыдущей.

827.*R. saxatilis* L. (Костянника). Рассеянно по лесам. По всему городу, кроме Лен., но в заречной части чаще. Бор.

828.*Sanguisorba officinalis* L. (Кровохлебка обыкновенная). По пойменным, реже суходольным лугам и пустырям по всему городу. В заречной части изредка встречается по разреженным лиственным и смешанным лесам. Местным населением собирается на букеты и изредка выращивается как декоративное.. Степ.

Примечание: как декоративное изредка выращиваются садовые гибриды разнообразного происхождения, на основе кровохлебки обыкновенной под названием *S. tenuifolia* Fischer ex Link (К. тонколистная).

829.*Sibiraea laevigata* (L.) Maxim., *S. altaiensis* (Laxm.) C.K.Schneid. (Сибирка гладкая, алтайская). Разводится как декоративное. Родина – Сибирь.

830.*Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br. (Рябинник рябинолистный). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Сибирь.

831.*Sorbaronia hybrida* (Moench.) C.K.Schn. (Сорбарония гибридная). Разводится как декоративное. Гибрид рябины обыкновенной и аронии.

832.*Sorbus aucuparia* L. (Рябина обыкновенная). В разреженных лесах, культурах сосны, где иногда доминирует в подлеске; в зарослях кустарников, на пустырях повсеместно. Местным населением плоды заготавливаются как лекарственное сырье и для производства наливок и настоек. Разводится как декоративное и пищевое и вторично дичает. Бор.

833.*S. hybrida* L. (Р. гибридная). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Скандинавия.

834. *Spiraea chamaedryfolia* L. (Спирея дубровколистная). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Сибирь.

835. *S. crenata* L. (С. городчатая). Разводится как декоративное. Родина - черноземная полоса России, в т.ч. юг нашей области. Охраняемое растение области, включенное в Красную книгу области.

836. *S. hypericifolia* L. (С. зверобоелистная). Разводится как декоративное. Родина - южная Россия.

837. *S. japonica* L. (С. японская). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Япония, Китай.

838. *S. media* Fr. Schmidt (С. средняя). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – европейский северо-восток.

839. *S. micropetala* Zbl. (С. мелколистная). Разводится как декоративное. Гибрид С. зверобоелистной и С. средней.

840. *S. nipponica* Maxim. (С. ниппонская). Разводится как декоративное. Родина - Япония.

841. *S. salicifolia* L. (С. иволистная). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Сибирь.

842. *S. superba* (Froeb.) Zbl. (С. пышная). Разводится как декоративное. Гибридное происхождение.

843. *S. tomentosa* L. (С. войлочная). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

844. *Stephanandra tanakae* Franch. et Sav. (Стефанандра Танаки). Изредка разводится как декоративное. Родина – Япония.

74 сем. Fabaceae, Leguminosae - Бобовые.

845. *Amorpha fruticosa* L. (Аморфа кустарниковая). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

846. *Anthyllis macrocephala* Wend. (Язвенник крупноголовый). На лугах по склонам, и в пойме Волги. Ниж., Сов., Приок. Степ. Охр.

847. *Astragalus arenarius* L. (Астрагал песчаный). По пустырям и лугам на песчаной почве. Изредка по всему городу, но в заречной части чаще. Среднеевр.

848. *A. cicer* L. (А. нутовый). По пустырям, лугам, зарослям кустарников. Изредка по всему городу, но в нагорной части чаще. Степ.

849. *A. danicus* Retz. (А. датский). На лугах, пустырях изредка по всему городу. Степ.

850. *A. falcatus* Lam. (А. серповидный). Изредка по травянистым склонам на окской и волжской слудах. В последние годы исчез из ранее зафиксированных местообитаний. Сов., Ниж. Степ. Охр.

851. *A. glycyphyllos* L. (А. солодковый). По лугам на склонах. Сов., Приок., Авт. Степ. Охр.

852. *Caragana arborescens* Lam. (Карагана древовидная). Разводится как декоративное, в придорожных насаждениях и в лесных культурах и дичает. Родина - Сибирь.

853. *C. frutex* (L.) C. Koch (К. кустарниковая). Разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Россия.

854. *C. fruticosa* (Pall.) Bess. (К. кустарниковая). Ранее разводилась как декоративное. Родина - Дальний восток.

855. *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloczcz.) Klaskova (Ракитник русский). По сосновым борам, боровым пустырям, лугам по склонам, изредка на пустырях и насыпях железных дорог. Иногда образует сообщества. Кан., Сорм., Моск., Авт., Ниж., Сов. Изредка разводится как декоративное. Степ. Естественные местообитания ракитника в нагорной части нуждаются в охране.

856. *C. zingeri* (Nenuk.) Klaskova (Р. Цингера). По сосновым борам и боровым пустырям (Сорм., Лен., Моск., Кан.). Изредка заносится с песком в нагорную часть города. Среднеевр. Охр. Кр. Иногда разводится как декоративное.

857. *Chrysaspis aurea* (Poll.) Greeve, *Trifolium aureum* Poll. (Златощитник золотистый, Клевер золотистый). Изредка по лугам по всему городу. Степ.

858. *Coronilla varia* L. (Вязель разноцветный). Изредка по лугам и пустырям в нагорной части. Степ.

859. *Galega orientalis* Lam. (Козлятник восточный). Разводится как кормовое в Сов. и Приок. и как декоративное в Приок. и дичает. Родина – Кавказ.

860. *Genista germanica* L. (Дрок германский). В прошлом был найден на песчаных пустырях на северо-западной окраине города. Среднеевр. Охр.

861. *G. tinctoria* L. (Д. красильный). По сосновым борам, боровым пустырям, песчаным берегам Оки и Волги, мергелистым склонам. Иногда образует сообщества. Повсеместно, но в заречной части гораздо чаще. Степ. Изредка разводится как декоративное.

862. *Glycyrrhiza glabra* L. (Солодка голая). Единично разводится как лекарственное и декоративное. Родина – Южная Россия.

863. *Laburnum anagyroides* Medik. (Золотой дождь анагиридовидный). Единично разводится как декоративное. Родина – Западная Европа.

864. *Lathyrus niger* (L.) Bernh. (Чина черная). Однажды было найдено одичалым на поляне в лесу у Ботанического сада, на территории которого культивируется. Среднеевропейский вид.

865. *L. odoratus* L. (Ч. душистая). Разводится как декоративное. Родина - Средиземноморье.

866. *L. pallescens* (Bieb.) C.Koch. (Ч. бледноватая). В прошлом была найдена на южной окраине города. Занос из южной России.

867. *L. pisiformis* L. (Ч. гороховидная). По опушкам лесов, лугам. Приок. Нем. В последние годы не замечено.

868. *L. pratensis* L. (Ч. луговая). По лугам, по пустырям, изредка как сорное в огородах. По всему городу. Бор.-Нем.

869. *L. sylvestris* L. (Ч. лесная). По опушкам широколиственных, реже сосновых лесов, пустырям и как сорное в огородах. Нагорная часть и Авт. Нем.

870. *L. tuberosus* L. (Ч. клубненосная). По лугам на склонах в нагорной части. Степ.

871. *L. vernus* (L.) Bernh. (Ч. весенняя). По лиственным лесам. Нагорная часть, Авт., Кан., Сорм. Изредка разводится как декоративное и вторично дичает. Нем. Охр.

872. *Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. (Острокильница чернеющая). По боровым пустырям, опушкам сосновых боров, в культурах сосны. Сорм. Среднеевр. Охр. Кр.

873. *Lotus corniculatus* L. (Лядвенец рогатый). По лугам, пустырям, сорное в огородах. По всему городу. Степ.

874. *Lupinus polyphyllus* Lindl. (Люпин многолистный). Разводится как декоративное и дичает, образуя сообщества. Родина - Северная Америка.

875. *Medicago falcata* L. (Люцерна серповидная). По лугам, на пустырях, сорное в огородах. В Сов. и Приок. культивируется как кормовое. По всему городу. Степ.

876. *M. lupulina* L. (Л. хмелевая). По лугам, на пустырях, сорное в огородах. По всему городу. Степ.

877. *M. sativa* L. (Л. посевная). Разводится как кормовое в Сов. и Приок. и дичает. Родина - различные области Азии.

Примечание: в нагорной части города изредка встречаются гибриды этой люцерны с люцерной серповидной.

878. *Melilotus albus* Medic. (Донник белый). По лугам, на пустырях, изредка по всему городу. Иногда разводится как декоративное. Степ.

879.*M. officinalis* (L.) Pall. (Д. лекарственный). Аналогично предыдущему, но чаще.

880.*M. wolgicus* Poir. (Д. волжский). Ранее было найдено по глинистым обрывам на южной окраине города, в настоящее время найдено на пустырях в Кан., Моск. и Сов. и по лугам на склонах в Приок. Степ.

881.*Ononis arvensis* L. (Стальник полевой). По обнаженным мергелистым склонам в Приок. и насыпям железных дорог в Кан. Степ. Охр.

882.*Phaseolus acutifolius* A. Gray (Фасоль остролистная). Изредка разводится как пищевое. Родина - Центральная Америка.

883.*P. siccineus* L. (Ф. огненно-красная). Разводится как декоративное и пищевое (белоплодные формы). Родина - Центральная Америка.

884.*P. vulgaris* L. (Ф. обыкновенная). Разводится как пищевое. Родина - Центральная и Южная Америка.

885.*Pisum sativum* L. (Горох посевной). Разводится как пищевое и вырастает из оброненных семян. Родина - Передняя Азия.

886.*Robinia pseudoacacia* L. (Робиния ложноакация). Разводится как декоративное, разрастается вегетативно и дичает. Родина - Северная Америка.

887.*Trifolium arvense* L. (Клевер пашенный). По пустырям и лугам, изредка как сорное в огородах. По всему городу. Бор.-Нем.

888.*T. hybridum* L. (К. гибридный). По лугам, реже на пустырях. Рассеяно по всему городу. Нем.-Степ.

889.*T. incarnatum* L. (К. мясокрасный). Ранее разводился как кормовое и был найден одичалым у Щелковского хутора (Сов., Приок.). Родина - южная Европа.

890.*T. medium* L. (К. средний). По лугам, пустырям по всему городу. Нем.-Степ.

891.*T. montanum* L. (К. горный). По лугам, пустырям повсеместно, но в нагорной части гораздо чаще. Местным населением собирается на букеты. Степ.

892.*T. pratense* L. (К. луговой). По лугам, пустырям по всему городу. В Сов. и Приок. разводится как кормовое. Нем.-Степ.

893.*T. repens* L. (К. ползучий). По сырьим местам, пустырям, сорное в городах. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

Примечание: все виды многолетних клеверов используются как газонное.

894.*Trigonella caerulea* Serg. (Пажитник голубой). По обочине шоссе в Приок. Заносное с юга Нижегородской области. Степ.

895.*Vicia angustifolia* Reichard (Горошек узколистный). В поймах Оки и Волги изредка. Среднеевр.

896.*V. biennis* L., *V. picta* Fisch. et Mey (Г. двулетний, пестрый). Изредка по лугам поймы Оки и Волги, заносится с песком вглубь города. Степ. Охр.

897.*V. cassubica* L. (Г. кашубский). Ранее единично отмечалось на остеиненных склонах Слуды (Сов., Приок.). В последние годы не отмечена. Бор.-нем.-степ. Охр.

898.*V. cracca* L. (Г. мышиный). На лугах, реже пустырях по всему городу. Нем.-Степ.

899.*V. faba* L. (Бобы). Разводится как пищевое и вырастает из оброненных семян. Родина - Средиземноморье.

900.*V. hirsuta* (L.) S.F.Gray (Г. шершавый). Изредка по лугам, пустырям, сорное в огородах. Среднеевр.

901.*V. pisiformis* L. (Г. гороховидный). Изредка по лугам на склонах. Приок. Нем. Охр. В последнее время не замечен.

902.*V. sativa* L. (Г. посевной). В посевах кормовых культур в Сов. и Приок., изредка на пустырях. Родина - Средиземноморье.

903.*V. sepium* L. (Г. заборный). На лугах, пустырях, сорное в огородах. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

904.*V. sylvatica* L. (Г. лесной). По лесистым склонам, опушкам дубрав, реже по лесным культурам, зарослям кустарников и пустырям в нагорной части и Авт. Нем.

905.*V. tenuifolia* Roth. (Г. тонколистный). Изредка по лугам. Ниж. Степ.

906.*V. tetrasperma* (L.) Roth. (Г. четырехсемянный). Изредка на пустырях, сорное в огородах в нагорной части города. Среднеевр.

907.*V. villosa* Roth (Г. мохнатый). Культивируется как кормовое в Сов., в других районах города как заносное. Степ.

Примечание: все дикорастущие травянистые бобовые, произрастающие на лугах, лесных полянах и, отчасти, на пустырях скашиваются местным населением на корм скоту и справляются при выпасе.

75 сем. Geraniaceae - Гераниевые.

908.*Erodium cicutarium* (L.) L' Herit. (Аистник цикутный). По пустырям, сорное в огородах повсеместно. Бор.-Нем.-Степ.

909.*Geranium palustre* L. (Герань болотная). По сырьим лесам и лугам повсеместно. Бор.-Нем.

910.*G. pratense* L. (Г. луговая). По лугам, опушкам, паркам, пустырям, разреженным лесам по всему городу. Бор.-Нем.

911.*G. pyrenaicum* Burm. fil (Г. пиренейская). Изредка по пустырям и насыпям железных дорог. Приок., Авт. Заносный западноевропейский вид. В Приок. в окрестностях Ботанического сада как одичалое.

912.*G. robertianum* L. (Г. Роберта). Изредка по лесистым склонам в Приок., ранее указывалась для Марьиной рощи (Сов.). Бор.-Нем. Охр.

913.*G. sanguineum* L. (Г. кроваво-красная). В разреженных сосновых борах и боровых пустырях. Моск., Сорм. Ранее указывалась для Марьиной рощи (Сов.). Степ. Охр. В последние годы не замечена на территории города.

914.*G. sibiricum* L. (Г. сибирская). На пустырях рассеянно в нагорной части, Лен. и Авт. Иногда образует сообщества. Бор.-Нем.

915.*G. sylvaticum* L. (Г. лесная). По опушкам лесов, полянам, паркам, изредка по пустырям и зарослям кустарников по всему городу. Бор.-Нем.

Примечание: герани лесная, луговая, болотная собираются местным населением на букеты.

916.*Pelargonium grandiflora* Willd. (Пеларгония крупноцветковая). Разводится как декоративное. Родина - южная Африка.

76 сем. Oxalidaceae - Кисличные.

917.*Ionoxyalis tetraphylla* (Cav) J. Rose, *I. violacea* (L.) Small. (Клубнекислица четырехлистная, фиалковая). Разводится как декоративное. Родина - Мексика.

918.*Oxalis acetosella* L. (Кислица обыкновенная). По хвойным и смешанным лесам в заречной части, изредка по лесным оврагам и лесистым склонам в нагорной части. По всему городу кроме Лен. Бор.

919.*Xanthoxalis corniculata* (L.) Small (Желтокислица рогатая). Изредка разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

920.*X. stricta* (L.) Small (Ж. прямостоячая). Аналогично предыдущей.

77 сем. Tropaeolaceae – Капуциновые, Настурциевые.

921.*Tropaeolum major* L. (Капуцин большой). Разводится как декоративное, изредка вырастает из оброненных семян. Родина - Южная Америка.

922.*T. minor* L. (К. малый). Аналогично предыдущему.

923.*T. peregrinum* L. (К. путешественников). Аналогично предыдущему.

78 сем. Linaceae - Льновые.

924.*Linum catharticum* L. (Лен слабительный). На лугах по склонам правого берега Оки и на заболоченных лугах по р. Юле в Приок., ранее указывалась для Слуды (Сов.). Бор. Охр.

925.*L. grandiflorum* Desf. (Л. крупноцветковый). Разводится как декоративное. Родина - Средиземноморье.

926.*L. usitatissimum* L. (Л. обыкновенный). Изредка на пустырях выросшее из оброненных семян. В Кан. одичалое на обочине Московского шоссе. Родина - Средиземноморье.

79 сем. Rutaceae – Рутовые.

927.*Dictamnus gymnostylis* Stev. (Ясенцы голостолбиковые). Разводится как декоративное. Родина – южная Россия.

928.*Phellodendron amurensis* Rupr. (Бархат амурский). Разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

929.*Ptelea trifoliata* L. (Вязовник трехлистный). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

80 сем. Polygalaceae - Истодовые.

930.*Polygala comosa* Schkuhr. (Истод хохлатый). Изредка по лугам на склонах в нагорной части. Нем.-Степ.

931.*P. vulgaris* L. (И. обыкновенный). Аналогично предыдущему, но гораздо реже. Охр.

Примечание: оба вида собираются местным населением на букеты.

81 сем. Euphorbiaceae - Молочайные.

932.*Euphorbia borodinii* Sambuk (Молочай Бородина). В поймах Оки и Волги рассеянно, заносится с песком вглубь территории города. Степ.

933.*E. cyparissias* L. (М. кипарисовый). Разводится как декоративное и дичает. Среднеевр.

934.*E. esula* L. (М. острый). Ранее был найден на Слуде (Сов.). Заносный среднеевр.

935.*E. helioscopia* L. (М. солнцегляд). Изредка на пустырях в Ниж. и сорное в посевах в Приок. Заносное из южной России, в том числе юга нашей области.

936.*E. marginata* L. Pursh (М. окаймленный). Разводится как декоративное. Родина – Западная Европа.

937.*E. polychroma* Kerner, *E. lingulata* Heuff. (М. многоцветный, язычковый). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа.

938.*E. waldsteinii* (Sojak) Czern., *E. virgata* Waldst. et Kit. (М. Вальдштейна, прутовидный). На лугах, пустырях повсеместно. Нем.-Степ.

939.*Mercurialis perennis* L. (Пролесник многолетний). В широколиственных лесах, зарослях кустарников, где иногда доминирует в травянистом ярусе, и на пустырях в нагорной части и Авт. Нем.

940.*Ricinus communis* L. (Клещевина обыкновенная). Разводится как декоративное. Родина - Африка.

82 сем. Callitrichaceae - Болотниковые.

941.*Callitrichche hermaphroditica* L. (Болотник обоеполый). По мелким водоемам, лесным лужам, где иногда образует сообщества. Рассеянно по всему городу. Бор.-Нем.

942.*C. palustris* L. (Б. болотный). Аналогично предыдущему, но гораздо чаще.

83 сем. Buxaceae – Самшитовые.

943.*Buxus sempervirens* L. (Самшит вечнозеленый). Разводится как декоративное. Ранее был широко распространен, в последние годы встречается все реже – вымерзает. Родина – Средиземноморье.

84 сем. Anacardiaceae – Анакардиевые.

944.*Cotinus coggygria* Scop. (Сумах скумпия). Разводится как декоративное. Родина – южная Европа.

85 сем. Celastraceae – Древогубцевые, Бересклетовые.

945.*Celastrum orbiculata* Thunb. (Древогубец круглолистный). Разводится как декоративное. Родина - Восточная Сибирь, Япония.

946.*Euonymus europaea* L. (Бересклет европейский). Разводится как декоративное и дичает. Среднеевропейский вид.

947.*E. fortunei* (Turcz.) Hand. – Mazz. (Б. Форчуна). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Китай.

948.*E. verrucosa* Scop. (Б. бородавчатый). По широколиственным, реже хвойным и смешанным лесам по всему городу. Иногда доминирует в кустарниковом ярусе. Разводится как декоративное. Нем.

86 сем. *Surianaceae* – Суриановые.

949.*Cadellia* sp. (Каделлия, видовая принадлежность не установлена). Единично разводится как декоративное. Родина – Австралия.

87 сем. *Aceraceae* - Кленовые.

950.*Acer campestre* L. (Клен полевой). Разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Россия.

951.*A. ginnala* Maxim. (К. приречный.). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Восточная Сибирь.

952.*A. negundo* L. (К. американский.). Разводится как декоративное, в придорожных насаждениях и лесных культурах и дичает, образуя сообщества. Родина - Северная Америка.

953.*A. platanoides* L. (К.платанолистный). В лесах, где иногда образует сообщества, в зарослях кустарников и на пустырях. По всему городу, но в нагорной части чаще. Нем. Разводится как декоративное и вторично дичает.

954.*A. pseudoplatanus* L. (К. явор). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Западная Европа, Кавказ.

955.*A. saccharinum* L. (К. сахаристый). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

956.*A. semenovii* Rgl. et Herd. (К. Семенова). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Средняя Азия.

957.*A. tataricum* L. (К. татарский). Разводится как декоративное, в придорожных насаждениях и в лесных культурах и дичает. Родина - черноземная полоса России.

88 сем. *Hippocastanaceae* - Конскокаштановые.

958.*Aesculus hippocastanum* L. (Конский каштан обыкновенный). Разводится как декоративное и дает самосев. Родина - южная Европа.

89 сем. *Balsaminaceae* - Бальзаминовые.

959.*Impatiens balsamina* L. (Недотрога бальзаминовая). Разводится как декоративное. Родина – Индия.

960.*I. glandulifera* Royle (Н. железистая). Разводится как декоративное и дичает, главным образом, по берегам малых речек, где иногда образует сообщества. Родина - западные Гималаи.

961.*I. noli-tangere* L. (Н. обыкновенная). По лесным оврагам. Сов., Приок. Бор.-Нем.

962.*I. parviflora* DC. (Н. мелкоцветная). По пустырям, где иногда образует сообщества, разреженным лесам, где играет роль летнего эфемероида и доминирует в травянистом ярусе. По всему городу. Заносное растение из Средней Азии.

90 сем. *Rhamnaceae* - Крушинные.

963.*Frangula alnus* Mill. (Крушина ломкая). По лесам, зарослям кустарников повсеместно, но в заречной части чаще. Изредка разводится как декоративное. Бор.-Нем.

964.*Rhamnus cathartica* L. (Жестер слабительный.). По опушкам лесов в нагорной части; в заречной только в Копосовской роще (Сорм.). Плоды изредка собираются местным населением как лекарственное сырье. Разводится как лекарственное и декоративное. Степ. Охр.

91 сем. *Vitaceae* – Виноградовые.

965.*Ampelopsis aconitifolia* Bunge (Виноградовник аконитолистный). Изредка разводится как декоративное. Родина – Китай.

966.*Parthenocissus inserta* (Kern.) Fritsch (Девичий виноград прикрепляющийся). Разводится как декоративное и дичает, б.ч. как почвопокровная лиана. Образует сообщества с американским кленом. Родина – Северная Америка.

967.*P. quinquefolia* (L.) Planch. (Д. в. пятилисточковый). Аналогично предыдущему, но очень редко.

968.*Vitis amurensis* Rupr. (Виноград амурский). Разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

969.*V. cinerea* Engelm. (В. серый). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

970.*V. labrusca* L. (В. лабруска). Разводится как декоративное и пищевое (в последнем случае б.ч. в виде гибридов с виноградом культурным). Родина – Северная Америка.

971.*V. palmata* Vahl. (В. лапчатый). Аналогично предыдущему.

972.*V. riparia* Michx. (В. приречный). Аналогично предыдущему.

973.*V. thunbergii* Sieb. et Zucc. (В. Тунберга). Разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

974.*V. vinifera* L. s.l. (В. культурный). Разводится как декоративное и пищевое и вырастает из выброшенных плодов и семян (такие сеянцы не перезимовывают). Родина неизвестна.

975.*V. vulpina* L. (В. лисий). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

92 сем. Tiliaceae - Липовые.

976.*Tilia amurensis* Rupr. (Липа амурская). Разводится как декоративное. Родина - Дальний Восток.

977.*T. cordata* Mill. (Л. сердцелистная). В лесах, где образует сообщества; по всему городу, но в нагорной части чаще. Разводится как декоративное и в придорожных насаждениях и вторично дичает. Нем.

978.*T. europea* L. (Л. европейская). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа. Гибрид между липой сердцелистной и липой крупнолистной.

979.*T. platyphyllos* Scop. (Л. крупнолистная). Разводится как декоративное. Родина - средняя и юго-восточная Европа.

Примечание: цветки всех видов лип собираются местным населением как лекарственное и ароматическое сырье.

93 сем. Malvaceae – Мальвовые, Просвирниковые.

980.*Abutilon darwinii* Hook. (Канатник Дарвина). Единично разводится как декоративное, на зиму пересаживается в помещение. Родина – Бразилия.

981.*Alcea rosea* L. (Шток-роза розовая). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Балканы.

982.*A. rugosa* Alef. (Ш.-р. морщинистая.). Разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Россия.

983.*Althaea officinalis* L. (Алтей лекарственный.). Разводится как декоративное и лекарственное и разрастается вегетативно. Родина - южная Россия.

984.*Lavatera thuringiaca* L. (Хатьма тюрингенская). По лугам на склонах в нагорной части. Изредка разводится как декоративное и вторично дичает. Степ.

985.*L. trimestris* L. (Х. трехмесячная). Разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Европа.

986.*Malope trifida* Cav. (Малопе, Дыравка трехраздельная.). Разводится как декоративное. Родина - Средиземноморье.

987.*Malva excisa* Reichenb. (Мальва, Просвирник рассеченная). Разводится как декоративное и дичает. Среднеевропейский вид.

988.*M. mauritiana* L. (М. мавританская). Разводится как декоративное и дичает. Среднеевропейский вид.

989.*M. moschata* L. (М. мускусная). Изредка разводится как декоративное и дичает. Родина – Западная Европа.

990.*M. pusilla* J. Smith (М. приземистая). На пустырях, сорное в огородах по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

Примечание: у ряда экземпляров имеются признаки, сближающие их с Мальвой незамеченной (*M. neglecta* Wallr.)

94 сем. Actinidiaceae – Актинидиевые.

991.*Actinidia arguta* Miq. (Актинидия острая). Разводится как пищевое, лекарственное и декоративное. Родина – Дальний Восток.

992.*A. colomicta* Maxim. (А. коломикта). Аналогично предыдущему, но гораздо чаще.

95 сем. Hypericaceae - Зверобойные.

993.*Hypericum elegans* Steph. ex Willd. (Зверобой изящный.). Изредка по лугам в нагорной части. Степ. Охр. Кр. В последние годы не найдено.

994.*H. maculatum* Crantz (З. пятнистый). По лугам, пустырям, сорное в огородах по всему городу. Изредка культивируется как лекарственное и ароматическое (сохраняются экземпляры, выросшие самосевом). Степ.

995.*H. perforatum* L. (З. продырявленный). Аналогично предыдущему.

Примечание: верхушки цветущих побегов всех видов зверобоев собираются местным населением как лекарственное и ароматическое сырье а также на букеты.

96 сем. Elatinaceae - Повойничковые.

996.*Elatine alsinastrum* L. (Повойничек мокричный). Изредка в стоячей воде малых водоемов. Авт. Степ. Охр.

97 сем. Violaceae - Фиалковые.

997.*Viola arvensis* Murr. (Фиалка полевая). На пустырях, деградированных лугах, сорное в огородах по всему городу. Бор.-Нем.

999.*V. canina* L. (Ф. собачья). По опушкам, зарослям кустарников, деградированным лугам, реже пустырям и насыпям железных дорог по всему городу. Бор.-Нем.

999.*V. collina* Bess. (Ф. холмовая). По опушкам лесов в нагорной части и Кан. Степ.

1000.*V. epipsila* Ledeb. (Ф. сверху голая). Изредка по болотам. Моск. Бор. Охр.

1001.*V. hirta* L. (Ф. опущенная). По опушкам широколиственных лесов, насыпям железных дорог в нагорной части и Кан. Нем. Гибридизирует с фиалкой холмовой.

1002.*V. labradorica* Schrank (Ф. лабрадорская). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Северная Америка.

1003.*V. mirabilis* L. (Ф. удивительная). По широколиственным лесам. Нагорная часть, Кан., Авт. Нем.

1004.*V. nemoralis* Kütz., *V. montana* L. (Ф. дубравная, горная). Изредка по опушкам лесов в нагорной части, Сорм. и Авт. Нем.

1005.*V. odorata* L. (Ф. душистая). Разводится как декоративное и дичает, иногда доминируя в травянистом ярусе в скверах и зарослях американского клена. Изредка образует сообщества. Среднеевропейский вид.

1006.*V. palustris* L. (Ф. болотная). На торфяных болотах. Моск. Бор. Охр.

1007.*V. persicifolia* Schreb., *V. stagina* Kit. (Ф. персоколистная, прудовая). Изредка в дубравах окской поймы в Авт. Бор.-Нем.-Степ. Охр.

1008.*V. riviniana* Reichenb. (Ф. Ривиниуса). Изредка по широколиственным лесам. Нагорная часть, Кан., Авт. Нем. Охр.

1009.*V. rupestris* F.W. Schmidt (Ф. скалистая). Изредка по сухим лугам в нагорной части и в сосновых борах и боровых пустырях в заречной. Нем.-Степ.

1010.*V. selkirkii* Pursh. et Goldie (Ф. Селькирка). В прошлом была найдена в Марьиной роще (Сов.) и на Слуде (Приок.). Бор. Охр.

1011.*V. tricolor* L. (Ф. трехцветная). Изредка по лугам в нагорной части. Разводится как декоративное и дичает. Бор.-Нем.

Примечание: как декоративные разводятся также различные гибридные формы фиалок, объединенные в вид 1012. Фиалка Виттрока (*V. x wittrokiana* Gams ex Hegi), вырастающий из оброненных семян.

98 сем. Thymelaeaceae - Волчеягодниковые.

1013.*Daphne mezereum* L. (Волчеягодник обыкновенный). Ранее произрастал по опушкам лесов в Приок. Бор. Охр. Единично встречался в озеленении. В настоящее время этот вид либо является одним из самых редких растений города, либо совсем исчез с его территории и единственное достоверное его местообитание – культуры тополя бальзамического в Приок.

99 сем. Elaeagnaceae - Лоховые.

1014.*Elaeagnus angustifolia* L. (Лох узколистный). Разводится как декоративное и дичает на песчаных пустырях в Лен. и по мергелистым склонам в Сов.Родина - Кавказ, Средняя Азия.

1015.*E. commutata* Bernh. ex Rydb., *E. argentea* Pursh. (Л. смешиваемый, серебристый). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - Северная Америка.

1016.*Hippophaë caucasica* (Rousi) Tzvel. (Облепиха кавказская). Разводится как пищевое, лекарственное и декоративное и дичает, образуя сообщества. Значительные самосевные заросли облепихи нуждаются в охране. Родина – Кавказ.

1017.*H. hamnoides* L. (О. жестеровидная). Аналогично предыдущему. Родина этой облепихи – Сибирь, Средняя Азия, Прибалтика. Часты гибридные формы обеих видов.

100 сем. Lythraceae - Дербенниковые.

1018.*Lythrum salicaria* L. (Дербенник иволистный). По берегам водоемов и сырьим лугам повсеместно. Иногда образует сообщества. Заносится с песком вглубь города. Бор.

1019.*L. virgatum* L. (Д. прутовидный). Изредка в поймах Оки и Волги. Нем.

Примечание: оба вида собираются местным населением на букеты и изредка разводятся как декоративное.

1020.*Peplis portula* L. (Бутерлак портулаковидный). Изредка по берегам водоемов и сырьим местам. Авт., Кан. Бор.-Нем. Охр.

101 сем. Onagraceae - Ослинниковые.

1021.*Chamerion angustifolium* (L.) Holub (Иван-чай узколистный). На пустырях, вырубках, полянах, в разреженных лесах (главным образом, сосновых). По всему городу. Местным населением собирается на букеты и как лекарственное. Бор.

1022.*Circaeae lutetiana* L. (Цирцея парижская). Обнаружено в парках, на газонах и пустырях в Приок. (занесенное?). Нем. Охр.

1023.*Clarkia amoena* (Lehm.) Nelson et Macbr. (Кларкия прелестная). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

1024.*C. unguiculata* L. (К. ноготковая). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

1025.*Epilobium adenocaulon* Hausskn. (Кипрей железистый). Рассеяно по всему городу. Заносное из Северной Америки.

1026.*E. collinum* C.C.Gmel. (К. холмовой). На пустырях, лесных дорогах. По всему городу. Среднеевр.

1027.*E. hirsutum* L. (К. шершавый). По сырым местам в нагорной части, где часто образует сообщества. Местным населением собирается на букеты. Разводится как декоративное. Бор.

1028.*E. montanum* L. (К. горный). По опушкам лесов в нагорной части города. Бор.-Нем.

1029.*E. palustre* L. (К. болотный). По болотам, берегам водоемов. Моск., Кан., Сорм., Приок. Бор.

1030.*E. parviflorum* Schreb. (К. мелкоцветный). Ранее был найден на Слуде и в Марьиной роще (Сов.). Нем.-Степ.-Среднеевр. Охр.

1031.*E. roseum* (Schreb.) Pers. (К. розовый). Изредка как заносное в Ниж. Бор.-Нем.-Степ.

1032. *E. smyrneum* Boiss. et Balansa, *E. nervosum* Boiss. et Buhse (К. смирнский, жилковатый). Единично по сырым местам по всему городу. Бор.-нем.-степ. Охр.

1033.*E. tetragonum* L. (К. четырехгранный). По сырым местам в нагорной части. Нем.-Степ.

1034.*Oenothera biennis* L. (Ослинник двулетний). По песчаным пустырям, чаще в пойме Оки и Волги, по насыпям железных дорог. По всему городу, но в заречной части чаще. Местным населением собирается на букеты. Заносное из Северной Америки. Изредка разводится как декоративное и дичает.

1035.*O. missouriensis* Sims. (О. миссурский). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

1036.*O. oakesiana* (A. Gray) Robbins ex S. Watson (О. Океса). Аналогично О. двулетнему, но много реже.

1037.*O. rubricaulis* Klebahn (О. красностебельный). Аналогично предыдущему.

1038.*O. silesiaca* Renner (О. силезский). Аналогично предыдущему.

102 сем. Haloragaceae - Сланоягодковые.

1039.*Myriophyllum spicatum* L. (Уруть колосистая). В воде малых водоемов. Моск., Кан., Авт., Сорм. Бор.-Нем.-Степ. Охр.

103 сем. Hippuridaceae - Хвостниковые.

1040.*Hippuris vulgaris* L. (Хвостник обыкновенный). По торфяным болотам и малым водоемам. Моск., Сорм. Бор. Охр.

104 сем. Araliaceae – Аралиевые.

1041.*Aralia mandschurica* Rupr. et Maxim. (Аралия манчжурская). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Дальний Восток.

1042.*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.). Maxim. (Элеутерококк колючий). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно и дает самосев. Родина – Дальний Восток.

1043.*Hedera helix* L. (Плющ обыкновенный). Разводится как декоративное. На зиму пересаживается в помещение. Родина – Западная Европа.

1044.*Panax schin-seng* Nees (Женьшень обыкновенный). Единично разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток (Дубинина, 2009).

105 сем. Apiaceae, Umbelliferae - Сельдереевые, Зонтичные.

1045.*Aegopodium podagraria* L. (Сныть обыкновенная). По широколиственным и смешанным лесам, паркам, где часто доминирует в травянистом ярусе. По пустырям, где иногда образует сообщества. По всему городу, но в нагорной части чаще. Местным населением стравливается скоту на лесных пастбищах и скашивается на корм скоту. Изредка собирается как пищевое. Нем. Имеются пестролистные декоративные формы.

1046.*Aethusa cynapium* L. (Собачья петрушка). Изредка на пустырях, в скверах, сорное в огородах. Ниж., Приок., Сов., Кан. Нем.-Степ.

1047.*Anetum graveolens* L. (Укроп). Разводится как пищевое и дичает. Родина - Средиземноморье.

1048.*Angelica sylvestris* L. (Дудник лесной). По берегам водоемов, сырьим лесам и лугам по всему городу. Бор.

1049.*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. (Купырь лесной). По опушкам лесов, пустырям по всему городу, но в нагорной части чаще. Степ.

1050.*Apium graveolens* L. (Сельдерей). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных корневищ и оброненных семян. Родина - Средиземноморье.

1051.*Archangelica officinalis* Hoffm. (Дягиль лекарственный). Изредка в зарослях кустарников по берегам Оки в Приок. и Лен. и Волги в Ниж.Степ. Охр.

1052.*Cارum carvi* L. (Тмин). Разводится как пищевое и дичает. На лугах и лесных полянах в Приок., Ниж., Сорм., Авт. может быть в естественном местообитании. Среднеевр.

1053.*Caucalis platycarpos* L., *C. lappula* (Houff.) DC. (Прицепник плоскоплодный, липучковый). В прошлом был найден на насыпи железной дороги на южной окраине города. Заносное из южной России.

1054.*Cenolophium denudatum* (Hornem.) Tutin. (Пусторебрышник обнаженный). В пойме Оки и Волги. Изредка заносится с песком вглубь нагорной части города. Степ.

1055.*Chaerophyllum aromaticum* L. (Бутень ароматный). В разреженных лесах на Слуде (Сов., Приок.) и в парке НГСХА (заносное? одичалое?). Среднеевр. Охр.

1056.*C. bulbosum* L. (Б. клубненосный). Изредка на пустырях, в разреженных лесах и зарослях кустарников. Чаще в нагорной части города, реже в заречной. В разреженных лесах в Кан. иногда доминирует в травянистом ярусе. Последнее местообитание нуждается в охране. Степ.

1057.*C. prescottii* DC. (Б. Прескотта). Изредка на пустырях. Сов. Степ.

1058.*Cicuta virosa* L. (Вех ядовитый). Изредка по берегам водоемов в заречной части города. Бор.

1059.*Conioselinum tataricum* Hoffm. (Гирчовник татарский). По заболоченным лугам в Приок. Нем. Охр.

1060.*Conium maculatum* L. (Болиголов крапчатый). Изредка на пустырях, где иногда образует сообщества; по всему городу, но в нагорной части чаще. Изредка собирается местным населением как лекарственное. Бор.- Нем.- Степ.

1061.*Coriandrum sativum* L. (Кориандр посевной). По пустырям, скверам как выросшее из оброненных семян. Родина - Средиземноморье.

1062.*Daucus carota* L. (Морковь обыкновенная). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных корнеплодов и оброненных семян. Несъедобная дикорастущая форма изредка встречается по сухим лугам в Приок.

1063.*Eryngium planum* L. (Синеголовник плосколистный). По сухим лугам рассеянно по всему городу, но в нагорной части чаще. Местным населением собирается на живые и сухие букеты, изредка разводится как декоративное. Степ.

1064.*Falcaria vulgaris* Bernh. (Резак обыкновенный). На лугах по склонам. Приок., Ниж. Степ. Охр.

1065.*Heracleum sibiricum* L. (Борщевик сибирский). На лугах, пустырях, в разреженных лесах изредка по всему городу. Бор.

1066.*H. sosnowskii* Manden. (Б. Сосновского). На пустырях, где иногда образует сообщества, в парках, разреженных лесах. Ранее разводилось как кормовое и одичало по всему городу. Родина - Кавказ.

1067.*Kadenia dubia* (Schkuhr) Lavrova et Tichom., *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. (Кадения сомнительная, Жгун – корень сомнительный). Изредка по сырьим местам в Моск., Авт. Бор. Охр.

1068.*Levisticum officinale* Koch (Любисток лекарственный). Разводится как пищевое и ароматическое и вырастает из выброшенных корневищ и оброненных семян. Родина - южная Европа.

1069.*Myrrhis odorata* (L.) Scop. (Миррис душистый). Разводится как ароматическое и дичает. Родина - Западная Европа.

1070.*Oenanthe aquatica* (L.) Poir. (Омежник водяной). По берегам водоемов изредка по всему городу, но в поймах Оки и Волги чаще. Бор.

1071.*Pastinaca sativa* L. (Пастернак посевной). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных корневищ и оброненных семян. Несъедобная дикорастущая форма встречается по лугам, опушкам и пустырям, а также как сорное в огородах по всему городу.

1072.*Petroselinum crispum* (Mill.) Nym. (Петрушка). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных корневищ и оброненных семян. Родина – Средиземноморье.

1073.*Pimpinella saxifraga* L. (Бедренец камнеломка). По лугам, пустырям, сорное в огородах повсеместно. Местным населением собирается на букеты. Бор.-Нем.-Степ.

1074.*Sanicula europaea* L. (Подлесник европейский). Ранее было найдено в дубраве Марьина роща и на Слуде (Сов.). Нем.-Среднеевр. Охраняемое растение области, включенное в Красную книгу области.

1075.*Seseli annuum* L. (Жабрица однолетняя). Изредка на пустырях в Ниж. Заносное с юга области. Степ. Охраняемое растение области, включенное в Красную книгу области

1076.*S. libanotis* (L.) Koch (Ж. порезниковая). По лугам на склонах, реже по пустырям и опушкам по всему городу, но в нагорной части чаще. Местным населением собирается на букеты. Степ.

1077.*Sium latifolium* L. (Поручейник широколистный). В водоемах в поймах Оки и Волги. Бор.

Примечание: изредка встречаются экземпляры, образующие переходную форму к П. сизаровидному (*S. sisaroides* M.B.).

1078.*Thyselinum palustre* (L.) Raf, *Peucedanum palustre* (L.) Moench (Гирчовница болотная, Горичник болотный). По болотам и сырьим лугам в заречной части. Бор.

1079.*Torilis japonica* (Houtt.) DC. (Торилис японский). На пустырях, где иногда образует сообщества, реже по лесным дорогам; по всему городу, но в нагорной части чаще. Нем.-Степ.

106 сем. Cornaceae - Кизиловые.

1080.*Swida alba* (L.) Opiz (Свидина белая). Разводится как декоративное и дичает. По берегам заболоченных водоемов в Моск. может быть в естественном местообитании. Бор. Охр.

1081.*S. hungarica* (Karpati) Sojak, *S. sanguinea* (L.) Opiz (Свидина венгерская, кроваво-красная). Разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Россия.

1082.*S. sericea* (L.) Holub, *S. stolonifera* (Michx.) Rydb. (С. шелковистая, побегообразующая). Разводится как декоративное и дичает, образуя сообщества. Ростовые побеги (хлысты) используются местным населением для плетения. Родина - Северная Америка.

107 сем. Pyrolaceae - Грушанковые.

1083.*Chimaphila umbellata* (L.) W. Bart. (Зимолюбка зонтичная). Изредка в сосновых борах в Моск. и Сорм. Ранее указывалась для Слуды (Сов). Местным населением собирается на букеты. Бор.-Нем. Охр.

1084.*Orthilia secunda* (L.) House (Ортилия однобокая). По смешанным, хвойным и, реже, по широколиственным лесам и их дериватам. Сорм., Моск., Приок. Бор.

1085.*Pyrola minor* L. (Грушанка малая). По хвойным, смешанным, реже по широколиственным лесам и их дериватам. По всему городу (кроме Лен.), но в заречной части чаще. Бор.

1086.*P. rotundifolia* L. (Г. круглолистная). Аналогично предыдущей. Кроме этого произрастает в сообществах ивняка на полуострове Гребневские пески в Ниж.

108 сем. Monotropaceae - Монотроповые. Вертляницевые.

1087.*Hypopitis monotropa* Crantz (Монотропа, Вертляница обыкновенная). Изредка по лесам и в искусственных древесно-кустарниковых насаждениях. Моск., Авт. Бор. Охр.

109 сем. Ericaceae - Вересковые.

1088.*Andromeda polifolia* L. (Подбел многолистный). На торфяных болотах. Моск., Сорм. Бор. Охр.

1089.*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Speng. (Толокнянка обыкновенная). На боровых пустырях в Сорм., где образует сообщества и там же в культурах сосны. Бор.-Нем. Охр.

1090.*Calluna vulgaris* (L.) Hull. (Вереск обыкновенный). По сосновым борам и их дериватам. Кан., Сорм., Моск. Бор. Охр. Местным населением собирается на букеты.

1091.*Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench. (Болотный мирт). На торфяных болотах. Моск., Сорм. Бор. Охр.

1092.*Erica carnea* L. (Эрика румяная). Единично разводится как декоративное. Родина – Западная Европа.

1093.*Ledum palustre* L. (Багульник болотный). По торфяным болотам и сырьим соснякам. Моск., Сорм. Гипоаркт.-Бор. Охр. Местным населением собирается как репеллент и инсектицид.

1094.*Oxycoccus macrocarpus* (Ait.) Pers. (Клюква крупноплодная). Единично разводится как пищевое и разрастается вегетативно. Родина – Северная Америка.

1095.*O. palustris* Pers. (К. болотная). По торфяным болотам. Моск., Сорм., Кан. Бор. Охр. Примечание: в Сорм. в прошлом А.Н.Петрова находила клюкву мелкоплодную (*O. microcarpus* Turcz.). Местным населением собирается как лекарственное и пищевое.

1096.*Rhododendron dahuricum* L. (Рододендрон даурский). Разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

1097.*R. japonicum* Sw. (Р. японский). Разводится как декоративное. Родина – Япония.

1098.*R. luteum* Sweet (Р. желтый). Разводится как декоративное. Родина - Малая Азия, Кавказ, горы Западной Европы.

1099.*Vaccinium corymbosum* L. (Голубика щитковая). Изредка разводится как пищевое и декоративное. Родина – Северная Америка.

1100.*V. myrtillus* L. (Черника). По сосновым, смешанным и, реже, лиственным лесам. Заречная часть (кроме Лен.) и Сов. Ранее указывалось для Приок. Бор. Местообитание черники в Советском районе (Марьина роща) должно быть взято под охрану.

1101.*V. uliginosum* L. (Голубика). По болотам и заболоченным лесам. Моск. Бор. Охр.

1102.*V. vitis-idaea* L. (Брусника). По сосновым борам и их дериватам, реже по широколиственным лесам. Заречная часть (кроме Лен.) и Сов. Ранее указывалось для Приок. Бор. Местообитание брусники в Советском районе (Марьина роща) должно быть взято под охрану.

Примечание: плоды всех видов последнего рода собираются местным населением как пищевое и лекарственное сырье.

110 сем. Primulaceae - Первоцветные.

1103.*Androsace elongata* L. (Проломник удлиненный). На песчаных пустырях в Кан. Степ.

1104.*A. filiformis* Retz. (П. нитевидный). Изредка по лесным дорогам, пустырям. Приок., Ниж. Бор.-Нем.

1105.*A. septentrionalis* L. (П. северный). Изредка на пустырях и склонах в нагорной части. Нем.

1106.*Cortusa brotheri* Pax ex Lipsky (Кортузя Бротера). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Западная Европа.

1107.*Lisimachia nummularia* L. (Вербейник монетчатый). По лугам, полянам, берегам водоемов, на пустырях по всему городу. Бор.

1108.*L. punctata* L. (В. точечный). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Западная Европа.

1109.*L. vulgaris* L. (В. обыкновенный). По сырьим местам, берегам водоемов, на пустырях по всему городу. Заносится с торфом. Местным населением собирается на букеты. Изредка разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.

1110.*Naumburgia thirsiflora* (L.) Reichenb. (Кизляк кистецветный). Изредка по берегам болот. Моск. Сорм. Приок. Бор. Охр.

1111.*Primula denticulata* Smith (Первоцвет мелкозубчаторый). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Афганистан, Гималаи, юго-западный Китай.

1112.*P. macrocalyx* Bunge (П. крупночашечный). Изредка по склонам в нагорной части. Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - южная Россия, Кавказ.

Примечание: часто рассматривается как подвид П. весеннего.

1113.*P. veris* L. (П. весенний). Изредка на лугах и опушках в нагорной части и Кан. Местным населением собирается на букеты. Разводится как декоративное и вторично дичает. Нем. Охр.

Примечание: как декоративное разводятся также различные гибридные формы первоцветов, разрастающиеся вегетативно. Основой этих форм являются Первоцвет высокий (*P. elatior* (L.) Hill) и П. обыкновенный (*P. vulgaris* Huds.) – родина – Западная Европа, и П. сибирский (*P. sibirica* Jacq.).

1114.*Trientalis europaea* L. (Седмичник европейский). По смешанным, хвойным, реже широколиственным лесам. Авт., Моск., Сорм., Приок., Сов. Бор. Местообитания седмичника в нагорной части города нуждаются в охране.

111 сем. Limoniaceae – Кермековые.

1115.*Limonium sinuatum* (L.) Mill. (Кермек выемчатый). Разводится как декоративное. Родина – Средиземноморье.

112 сем. Oleaceae - Маслиниевые.

1116.*Fontanesia fortunei* Carr. (Фонтанезия Форчуна). Единично разводится как декоративное, Родина – Китай.

1117.*Forsythia viridissima* Lindl. (Форзиция зеленая). Изредка разводится как декоративное. Родина - Китай.

Примечание: изредка встречаются и другие, гибридные формы форзиций.

1118.*Fraxinus excelsior* L. (Ясень высокий). В широколиственных лесах в нагорной части города, где иногда образует сообщества. Ясень высокий Копосовской рощи (Сорм.) и парка “Дубки” (Лен.) вероятнее всего высажен искусственно, или занесен из культуры. Разводится как декоративное и вторично дичает. Среднеевр.-Нем. Большие деревья ясеня нуждаются в охране.

1119.*F. juglandifolia* Lam. (Я. орехолистный). Разводится как декоративное, в придорожных насаждениях и в лесных культурах и дичает. Родина – Северная Америка.

1120.*F. lanceolata* Borkh. (Я. ланцетный). Аналогично предыдущему.

1121.*F. pennsylvanica* Marsh. (Я. пенсильванский). Аналогично предыдущему.

1122.*Ligustrina amurensis* Rupr., *Syringa amurensis* Rupr.(Трескун амурский, Лигустрина амурская, Сирень амурская). Изредка разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

1123.*Ligustrum vulgare* L. (Бирючина обыкновенная). Разводится как декоративное, разрастается вегетативно и дичает. Родина - Кавказ, Западная Европа.

1124.*Syringa josikaea* Jacq. fil. (Сирень венгерская). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа.

1125.*S. oblata* Lindl. (С. широколистная). Изредка разводится как декоративное. Родина – Китай.

1126.*S. vulgaris* L. (С. обыкновенная). Разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Европа, Передняя Азия. Примечание: изредка встречаются экземпляры с признаками предыдущего вида.

113 сем. Gentianaceae - Горечавковые.

1127.*Centaurium erythraea* Rafn. (Золототысячник обыкновенный). Изредка на лугах в Приок. и пойме Оки в Авт. Бор.-Нем.-Степ. Охр.

1128.*Gentiana cruciata* L. (Горечавка перекрестнолистная). Ранее указывалась для Слуды (Сов.). Изредка культивируется и разрастается вегетативно. Бор.-Нем.-Степ. Охр.

1129.*Gentiana pneumonanthe* L. (Горечавка легочная). Изредка по сырьим лугам в Приок. и культурам сосны в Сорм. Бор. Охр.

Примечание: все виды этого семейства собираются местным населением на букеты.

114 сем. Menyanthaceae - Вахтовые.

1130.*Menyanthes trifoliata* L. (Вахта трехлистная). По окраинам болот, где иногда образует сообщества. Кан., Сорм., Моск. Бор. Охр.

115 сем. Apocynaceae - Кутровые.

1131.*Vinca herbacea* Waldst. et Kit. (Барвинок травяной). Разводится как декоративное. Родина - южная Россия.

1132.*V. minor* L. (Б. малый). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа.

116 сем. Asclepiadaceae - Ластовневые.

1133.*Vincetoxicum hirundinaria* Medik. (Ластовень ласточкин). Изредка по сосновым борам и боровым пустырям и по травянистым склонам. Сорм., Моск., Сов. Степ. Охр.

117 сем. Convolvulaceae - Вьюнковые.

1134.*Calystegia inflata* Sweet. (Повои вздутый). Повсеместно разводится как декоративное и дичает на пустырях и по берегам водоемов. Родина – Северная Америка.

1135.*C. sepium* (L.) R. Br. (П. призаборный). В поймах Оки и Волги в зарослях. Разводится как декоративное и вторично дичает. Степ. Распространен значительно реже предыдущего.

1136.*Convolvulus arvensis* L. (Вьюнок полевой). На пустырях, деградированных лугах, сорное в огородах по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1137.*C. tricolor* L. (В. трехцветный). Разводится как декоративное. Родина - южная Европа.

1138.*Ipomoea hederacea* (L.) Jacq. (Ипомея плющелистная). Разводится как декоративное. Родина - тропическая Америка.

1139.*I. purpurea* (L.) Roth. (И. пурпурная). Аналогично предыдущей, но способна и вырастать из оброненных семян. В Кан. одичала по берегу озера у жел. дор. станции Костариха в сообществе тростника..

Примечание: в Ниж. в палисаднике обнаружена ипомея с признаками южноамериканской тропической И. Слотера (*I. sloteri* Neuwl.).

118 сем. Cuscutaceae – Повиликовые.

1140.*Cuscuta campestris* Yunck. (Повилика равнинная). На пустырях на бурьянных растениях. Сов. Степ.

1141. *C. europaea* L. (П. европейская). На пустырях на бурьянных растениях рассеянно по всему городу. Вид североамериканского происхождения.

1142. *C. lupuliformes* Krock. (П. хмелевидная). В приречных зарослях Оки и Волги на ивах, в скверах на декоративных кустарниках, на пустырях на крапиве, реже на других бурьянных растениях. Ниж., Сов., Лен., Кан. Степ.

119 сем. Polemoniaceae - Синюховые.

1143.*Collomia linearis* Nutt. (Колломия линейная). На пустырях в Лен., где иногда образует сообщества. Заносное из Северной Америки.

1144.*Phlox divaricata* L. (Флокс растопыренный). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Северная Америка.

1145.*P. drummondii* Hook. (Ф. Друммонда). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

1146.*P. paniculata* L. (Ф. метельчатый). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Северная Америка.

1147.*P. subulata* L. (Ф. шиловидный). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Северная Америка.

1148.*Polemonium caeruleum* L. (Синюха лазоревая). Изредка по лугам в нагорной части. Местным населением собирается на букеты. Разводится как декоративное и вторично дичает. Степ. Охр.

120 сем. Hydrophyllaceae - Воднолистниковые.

1149.*Phacelia tanacetifolia* Benth. (Фацелия пижмолистная). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Северная Америка.

121 сем. Boraginaceae - Бурачниковые.

1150.*Anchusa officinalis* L. (Воловик аптечный). Ранее изредка встречался на пустырях (одичалое, или заносное). Приок. Родина - Западная Европа.

1151.*Asperugo procumbens* L. (Острица лежачая). Изредка на пустырях Ниж., Степ. В последнее время не замечена.

1152.*Borago officinalis* L. (Бурачник лекарственный). Изредка разводится как пищевое и декоративное и дичает. Родина - Средиземноморье.

1153.*Brunnera sibirica* Stev. (Брюннера сибирская). Разводится как декоративное и дичает, разрастаясь вегетативно и образуя сообщества. Родина - Сибирь.

1154.*Buglossoides arvensis* (L.) Johnst. (Буглоззоидес полевой). Изредка по лугам на склонах. Ниж. Степ.

1155.*Cynoglossum officinale* L. (Чернокорень лекарственный). На лугах по склонам, пустырях. Рассеянно по всему городу. Степ.

1156.*Echium biebersteinii* Locaite (Синяк Биберштейна). В прошлом был найден на насыпи железной дороги на южной окраине города. Заносное с Кавказа и Средней Азии.

1157.*E. lycopsis* L. (С. кривоцветный). Единично разводится как декоративное. Родина – Крым, Кавказ.

1158.*E. vulgare* L. (С. обыкновенный). На пустырях по всему городу. Изредка разводится как декоративное. Степ.

1159.*Lappula patula* (Lehm.) Menyharth (Липучка поникшая). В прошлом была найдена на насыпи железной дороги, в настоящее время – на пустыре в Сов. Заносное из Кавказа, или Сибири.

1160.*L. scuarrosa* (Retz.) Dumort. (Л. растопыренная). По пустырям, сорное на огородах. Рассеянно по всему городу. Степ.

1161.*Lithospermum officinale* L. (Воробейник лекарственный). Изредка на лугах по склонам. Ниж. Степ.

1162.*Lycopsis arvensis* L. (Кривоцвет полевой). Изредка на пустырях и как сорное в огородах в нагорной части. Степ.

1163.*Myosotis arvensis* (L.) Hill (Незабудка полевая). На пустырях, в парках и деградированных лесах рассеянно в нагорной части. Бор.

1164.*M. caespitosa* K.F.Schultz (Н. дернистая). По сырым местам по всему городу. Бор.

1165.*M. scorpioides* L., *M. palustris* (L.) L. (Н. крючковатая, болотная). На сырьих местах по всему городу. Бор.

1166.*M. stricta* Link ex Roem. et Schult., *M. micrantha* auct. (Н. торчащая, мелкоцветная). По сухим лугам и пустырям рассеянно по всему городу, но в нагорной части чаще. Бор.-Нем.-Степ.

1167. *M. sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. (Н. лесная). По широколиственным лесам в нагорной части, реже на газонах там же. Местным населением собирается на букеты. Бор. Разводится как декоративное и вторично дичает. Не исключено, что местонахождение в лесах вторичное, как одичалое.

Примечание: ряд культивируемых и дикорастущих экземпляров обнаруживает признаки незабудок Попова и альпийской (*M. popovii* Dobrocz., *M. alpestre* Schmidt).

1168.*Nonea pulla* (L.) DC. (Нонеа темнобурая). Изредка по лугам на склонах в нагорной части. Степ.

1169.*Pulmonaria obscura* Dumort. (Медуница неясная). По широколиственным, реже смешанным лесам и паркам по всему городу (кроме Лен.), но в нагорной части чаще. Местным населением собирается на букеты. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.

1170.*Strophiostoma sparsiflorum* (Mikan ex Pohl) Turcz., *Myosotis sparsiflora* Pohl (Строфиостома редкоцветная, Незабудка редкоцветная). По опушкам лесов изредка в нагорной части. Бор.-Нем.

1171.*Symphytum asperum* Lepech. (Окопник шершавый). Разводится как декоративное, разрастается вегетативно и дичает, иногда образуя сообщества. Родина - Кавказ.

1172.*S. officinale* L. (О. лекарственный). Аналогично предыдущему, но реже. Аборигенный вид области. Дикорастущим встречается в пойме Волги в Сорм. и в пойме Рахмы в Сов. Степ.

Примечание: как декоративное разводится гибрид этих видов 1173.*S. x uplandicum* Nym. (О. упландский), разрастающийся вегетативно и дичающий.

1174.*Trigonotis peduncularis* (Trev.) Benth. (Тригонотис длиннорожковый). В прошлом было найдено на пустыре в Сов. Заносное из Сибири, или Средней Азии.

122 сем. Verbenaceae – Вербеновые.

1175.*Verbena canadensis* (L.) Britt. (Вербена канадская). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

1176.*V. hybrida* Voss., *V. x hybrida* hort. (В. гибридная). Разводится как декоративное. Продукт гибридизации нескольких североамериканских видов.

123 сем. Lamiaceae, Labiateae - Яснотковые, Губоцветные.

1177.*Acinos arvensis* (Lam.) Dandy (Щебрушка полевая). На лугах по склонам и пустырям по всему городу. Степ.

1178.*Ajuga genevensis* L. (Живучка женевская). Изредка по травянистым склонам. Приок. Ранее была найдена у Кузнецихи (Сов.). Бор.-Степ. Охр. Часть экземпляров обнаруживает признаки гибридизации с живучкой ползучей (*A. reptans* L.). Краснолистная форма разводится как декоративное и вторично дичает.

1179.*A. reptans* L. (Ж. ползучая). Разводится как декоративное, главным образом, краснолистная форма, разрастается вегетативно и дичает, иногда образуя сообщества. Аборигенный вид области. Бор.- нем.- степ.

1180.*Ballota nigra* L. (Белокудренник черный). Изредка на пустырях, где образует сообщества. Приок., Ниж. Степ.

1181.*Betonica officinalis* L. (Буквица лекарственная). Изредка по лугам на склонах, опушкам и полянам по всему городу, но в нагорной части чаще. Местным населением собирается на букеты. Изредка разводится как декоративное. Нем.

1182.*Chaiturus marrubiastrum* (L.) Ehrh. et Reichenb. (Щетинохвост шандровый). В зарослях кустарников по берегу Оки в Лен. и Волги в Ниж. Заносное из южной России.

1183.*Clinopodium vulgare* L. (Пахучка обыкновенная). По разреженным лесам, паркам, пустырям, сорное в огородах. По всему городу. Нем.-Степ.

1184.*Coleus blumei* Benth. (Колеус пестрый). Разводится как декоративное. Родина – Индонезия.

1185.*Dracocephalum moldavica* L. (Змееголовник молдавский). Разводится как декоративное и дичает. Родина - юго-восточная Европа, юг Сибири.

1186.*D. ruischiana* L. (З. Рюйша). В разреженных сосновых борах и боровых пустырях. Моск., Сорм. Степ. Охр.

1187.*D. thymiflorum* L. (З. тимьяноцветный). По травянистым склонам и песчаным пустыням по всему городу. Степ.

1188.*Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyl. (Эльсгольция реснитчатая). Одичалое на пустырях, главным образом в нагорной части. Родина - Кавказ, юг Западной Сибири.

1189.*Galeobdolon luteum* Huds. (Зеленчук желтый). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Среднеевр. Охраняемое растение области, внесенное в Красную книгу области.

1190.*Galeopsis bifida* Boenn. (Пикульник двунадрезный). Изредка на пустырях в Ниж. Степ.

1191.*G. ladanum* L. (П. ладанный). На пустырях, как сорное в посевах. По всему городу. Степ.

1192.*G. speciosa* Mill. (П. красивый). Аналогично предыдущему.

1193.*G. tetrachit* L. (П. обыкновенный). Аналогично предыдущему.

1194.*Glechoma hederacea* L. (Будра плющелистная). По разреженным лесам, паркам, пустырям, сорное в огородах. По всему городу. Нем. Единично разводится как декоративное.

1195.*G. hirsuta* Waldst. et Kit. (Б. шершавая). Изредка по разреженным лесам в нагорной части. Нем.

1196.*Hyssopus officinalis* L. (Иссоп лекарственный). Разводится как декоративное и ароматическое. Родина - Средиземноморье.

1197.*Lamium album* L. (Яснотка белая). По паркам, пустырям по всему городу, но в нагорной части чаще. Местным населением собирается на букеты. Изредка разводится как декоративное. Бор.

1198.*L. amplexicaule* L. (Я. стеблеобъемлющая). По пустырям, сорное в огородах и полях. Ниж., Приок., Авт. Среднеевр.

1199.*L. hybridum* Will. (Я. гибридная). По пустырям, паркам, сорное в огородах. По всему городу. Среднеевр.

1200.*L. maculatum* L. (Я. крапчатая). Аналогично предыдущей. Пестролистная форма разводится как декоративное и вторично дичает.

1201.*L. purpureum* L. (Я. пурпурная). Аналогично ясноткам гибридной и стеблеобъемлющей.

1202.*Lavandula angustifolia* Mill., *L.officinalis* Chaix. (Лаванда узколистная, лекарственная). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Средиземноморье.

1203.*Leonurus quinquelobatus* Gilib. (Пустырник пятилопастный). По паркам, пустырям, разреженным лесам, сорное в огородах. Иногда образует сообщества. По

всему городу. Местным населением собирается как лекарственное сырье. Бор.-Нем.-Степ.

1204.*Lophanthus anisatus* Benth. (Лофантус анисовый). Разводится как декоративное и ароматическое и дичает. Родина – Северная Америка.

1205.*Lycopus europaeus* L. (Зюзник европейский). По сырым местам, берегам водоемов, с торфом заносится в посевы. Рассеянно по всему городу. Бор.-Нем.

1206.*L. exaltatus* L. fil. (З. высокий). Аналогично предыдущему, но значительно реже. Нем.

1207.*Melissa officinalis* L. (Мелисса лекарственная). Разводится как декоративное и ароматическое и дичает. Родина - Кавказ, Западная Европа.

1208.*Mentha arvensis* L. (Мята полевая). По берегам водоемов, сырьим лугам, пустырям, сорное в огородах. Разводится как ароматическое (сохраняются самосевно выросшие экземпляры) и вторично дичает. Бор.-Нем.

1209.*M. longifolia* (L.) Nathh. (М. длиннолистная). Изредка по сырьим местам и берегам водоемов. Разводится как ароматическое и вторично дичает. Бор.-Нем.

Примечание: оба этих вида мяты собираются местным населением как лекарственное и ароматическое сырье.

1210.*M. x piperita* (М. перечная). Разводится как ароматическое и дичает. Вид гибридного происхождения. Родина - Англия.

1211.*M. spicata* L. (М. колосистая). Разводится как ароматическое и дичает. Среднеевропейский вид.

Примечание: как ароматические разводятся также другие различные гибридные формы мяты.

1212.*Monarda citriodora* Cerv. ex Cog. (Монарда лимонная). Разводится как ароматическое и декоративное. Родина - Северная Америка.

1213.*M. didyma* L. (М. двойчатая). Аналогично предыдущей. Вырастает из оброненных семян.

1214.*Neptula cataria* L. (Котовик кошачий). Изредка на пустырях по всему городу. Местным населением собирается как ароматическое и тонизирующее для кошек. Разводится как ароматическое и вторично дичает. Степ.

1215.*N. grandiflora* Bieb. (К. крупноцветковый). Разводится как декоративное. Родина - Кавказ.

1216.*Ocimum basilicum* L.(Базилик обыкновенный). Изредка разводится как ароматическое и вырастает из оброненных семян. Родина – южная Азия.

1217.*Origanum vulgare* L. (Душица обыкновенная). По лугам, паркам, разреженным лесам, пустырям. Изредка по всему городу. Местным населением собирается как лекарственное и ароматическое сырье. Разводится как лекарственное и ароматическое (главным образом экземпляры, выросшие самосевом) и вторично дичает. Степ.

1218.*Perilla frutescens* Britt. (Перилла кустарниковая). Разводится как декоративное. Родина – Гималаи, Япония, Китай.

1219.*Phlomis tuberosa* L. (Зопник клубненосный). Изредка на пустырях и насыпях железных дорог. Приок. Степ.

1220.*Physostegia virginiana* (L.) Benth. (Физостегия виргинская). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Северная Америка.

1221.*Prunella vulgaris* L. (Черноголовка обыкновенная). По опушкам лесов, лугам, паркам, пустырям, сорное в огородах. По всему городу. Степ.

Примечание: по остеиненным лугам в нагорной части изредка встречаются экземпляры с признаками черноголовки крупноцветковой (*P. grandiflora* (L.) Scholl.).

1222.*Salvia horminum* L. (Шалфей хохлатый). Единично разводится как декоративное. Родина – Крым.

1223.*S. splendens* Ker – Gawl. (Ш. голый). Разводится как декоративное. Родина - Бразилия.

1224.*S. stepposa* Shost.(Ш. степной). Изредка по травянистым склонам Слуды (Сов.). Степ. Охр.

1225.*S. tesquicola* Kloc. et Pobed. (Ш. остеиненный). По травянистым склонам берегов Оки и Волги. Ниж., Приок., Сов., а также по насыпи железной дороги в Приок. Степ. Охр.

1226.*S. verticillata* L. (Ш. мутовчатый). Изредка по травянистым склонам Слуды (Ниж.). Степ. Охр.

1227.*Scutellaria altissima* L. (Шлемник высокий). Разводится как декоративное. Родина - Кавказ, Западная Европа.

1228.*S. galericulata* L. (Ш. обыкновенный). По берегам водоемов и сырьим местам по всему городу, чаще всего по берегам Оки и Волги. Бор.

1229.*Stachys annua* (L.)L. (Чистец однолетний). Изредка на пустырях в нагорной части. Степ.

1230.*S. bisanthina* C.Koch. (Ч. византийский). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Средиземноморье, Крым, Кавказ.

1231.*S. palustris* L. (Ч. болотный). По сырьим местам, паркам, разреженным лесам, пустырям, сорное в огородах. Единично разводится как декоративное (сохраняются самосевно выросшие экземпляры). По всему городу. Бор.

1232.*S. sylvatica* L. (Ч. лесной). По опушкам лесов, полянам, зарослям кустарников в нагорной части. Нем.

1233.*Thymus serpyllum* L. (Тимьян обыкновенный). Изредка по лугам на склонах и в разреженных сосновых борах. Нагорная часть, Моск., Сорм. В последние годы не отмечен во всех известных ранее местах, возможно вовсе исчез с территории города. Степ. Охр. Кр. Изредка разводится как ароматическое.

124 сем. *Buddlejaceae* – Буддлейные.

1234.*Buddleja davidii* Franch. (Буддлея Давида). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Китай.

125 сем. *Solanaceae* - Пасленовые.

1235.*Capsicum annum* L. (Перец однолетний). Разводится как пищевое. Родина - Центральная Америка.

1236.*Datura innoxia* Mill. (Дурман безвредный). Разводится как декоративное. Родина – Индия.

1237.*D. stramonium* L. (Д. вонючий). Изредка на пустырях, где иногда образует сообщества. Сов. Заносное из южной России.

1238.*Hyoscyamus niger* L. (Белена черная). Изредка на пустырях по всему городу. Степ.

1239.*Licium barbarum* L. (Дереза варварская). Ранее разводилось как декоративное. Родина - южная Россия. (Пентин А.П., Елистратов А.В., 1975).

1240.*Lycopersicon esculentum* Mill. (Помидор, Томат). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных плодов. Родина - Южная Америка.

1241.*Nicandra physaloides* (L.) Gaertn. (Никандра физалисовидная). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина – южная Америка.

1242.*Nicotiana alata* Sc. et Otto (Табак крылатый). Изредка разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Бразилия.

1243.*N. rustica* L. (Т. деревенский, Махорка). Изредка разводится как наркотическое и вырастает из оброненных семян. Родина - Северная Америка.

1244.*N. tabacum* L. (Т. настоящий). Изредка разводится как декоративное. Родина - Южная Америка.

1245.*Petunia*. x *hort.* (Петунья, гибридные формы). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Южная Америка.

1246.*Physalis franchetii* Mast. (Физалис Франшета). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Япония.

1247.*P. ixocarpa* Brot. ex Hornem. (Ф. липкоплодный, Мексиканский томат). Разводится как пищевое и вырастает из оброненных семян и плодов. Родина - Центральная Америка.

1248.*Solanum dulcamara* L. (Паслен сладко-горький). В приречных зарослях по всему городу рассеянно. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.

1249.*S. judaicum* Bess. (П. иудейский). Изредка на пустырях по всему городу. Заносный западноевропейский вид.

1250.*S. melongena* L. (Баклажан). Разводится как пищевое. Родина - Индия.

1251.*S. nigrum* L. (П. черный). На пустырях, сорное в огородах. Иногда образует сообщества. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1252.*S. schultesii* Opiz (П. Шультеса). Изредка на пустырях по всему городу. Заносный западноевропейский вид.

1253.*S. tuberosum* L. (Картофель). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных клубней. Родина - Южная Америка.

126 сем. Scrophulariaceae - Норичниковые.

1254.*Antirrhinum majus* L. (Львиный зев большой). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Средиземноморье.

1255.*Chaenorhinum minus* (L.) Lange (Хенорринум малый). Изредка на пустырях, иногда образуя эфемерные сообщества. По всему городу. Заносный западноевропейский и кавказский вид.

1256.*Digitalis grandiflora* Mill. (Наперстянка крупноцветковая). Разводится как декоративное и изредка дичает. Родина – Западная Европа.

1257.*D. purpurea* L. (Н. пурпуровая). Аналогично предыдущей.

Euphrasia L. (Очанка). Распространены по лугам, лесным полянам, реже на пустырях, по опушкам и в разреженных лесах по всему городу.

Ввиду малой изученности видов этого рода, ниже дается список их без указания на распространение по районам города.

1258.*E. brevipila* Burn. et Gremli (О. коротковолосистая).

1259.*E. chitrovoi* Tzvel. (О. Хитрово).

1260.*E. fennica* Kihlm. (О. финская).

1261.*E. hirtella* Jord. ex Reut. (О. мохнатая).

1262.*E. montana* Jord. (О. горная).

1263.*E. parviflora* Schagerstr. (О. мелкоцветная).

1264.*E. pectinata* Ten. (О. гребенчатая).

1265.*E. x reuteri* Wettst.(О. Рейтера).

1266.*E. stricta* D. Wolff ex J.F.Lehm. (О. прямая).

1267.*Gratiola officinalis* L. (Авран лекарственный). В приречных зарослях по Оке. Лен. Степ. Охр.

1268.*Lathraea squamaria* L. (Петров крест чешуйчатый). В широколиственных лесах, реже в аллеях, парках и садах нагорной части города. Нем.

1269.*Limosella aquatica* L. (Лужайник водный). По песчаным берегам Оки и Волги по всему городу и как занесенное по берегу ручья в Сов. Бор.-Нем. Охр.

1270.*Linaria vulgaris* Mill. (Льнянка обыкновенная). По лугам, пустырям, сорное в огородах. По всему городу. Местным населением собирается на букеты. Степ.

1271.*Melampyrum cristatum* L. (Марьинник гребенчатый). Изредка по лугам в Приок. и Авт. Бор.- нем. Охр.

1272.*M. nemorosum* L. (М. дубравный). По опушкам лесов, преимущественно в нагорной части. Местным населением собирается на букеты. Нем.

Примечание: ряд экземпляров обнаруживают признаки близкого вида *M.польского*(*M. polonicum* (Beauv.) Soo).

1273.*M. pratense* L. (М. луговой). По разреженным сосновым борам, лугам, пустырям. По всему городу, но в заречной части чаще.

1274.*Mimulus x hybridus* hort. (Губастик, гибридные формы). Разводится как декоративное.

1275.*Odontites vulgaris* Moench (Зубчатка обыкновенная). По лугам и пустырям по всему городу, но в нагорной части чаще. Степ.

1276.*Pedicularis kaufmannii* Pinzger (Мытник Кауфмана). По лугам на склонах. Приок. Степ. Охр. Кр.

1277.*P. palustris* L. (М. болотный). Ранее был найден на заболоченных лугах в Приок. Бор. Охр.

1278.*Pentstemon x hort.* (Пентстемон, гибридные садовые формы). Изредка разводится как декоративное.

1279.*Rhinanthus minor* L. (Погремок малый). По лугам и пустырям рассеянно по всему городу. Степ.

1280.*R. serotinus* (Schoenck.) Oborny (П. поздний). По лугам и пустырям. Ниж. Среднеевр.

1281.*R. vernalis* (Zing.) Schischk. et Serg. (П. весенний). Изредка по лугам и пустырям в Ниж. Бор.-Нем.-Степ.

Примечание: все виды погремков собираются местным населением на букеты.

1282.*Scrophularia umbrosa* Dumort. (Норичник тенистый). Ранее наблюдался изредка по сырьем оврагам в Сов. В последние годы не найден. Среднеевр. Охр.

1283.*S. nodosa* L. (Н. шишковатый). По опушкам лесов, пустырям по всему городу. Бор.-Нем.

1284.*Verbascum lychnitis* L. (Коровяк метельчатый). По лугам на склонах, песчаным пустырям рассеянно по всему городу. Степ.

1285.*V. nigrum* L. (К. черный). Изредка по лугам и разреженным лесам. Нагорная часть и Авт. Степ. Охр.

1286.*V. thapsus* L. (К. медвежий). По лугам на склонах, боровым пустырям изредка по всему городу, кроме Лен. Степ.

Примечание: все виды коровяков собираются местным населением на живые и сухие букеты.

1287.*Veronica anagallis-aquatica* L. (Вероника ключевая). По берегам водоемов изредка по всему городу. Бор.

1288.*V. arvensis* L. (В. полевая). Изредка на пустырях по всему городу. Среднеевр.

1289.*V. beccabunga* L. (В. поручейная). Изредка по берегам малых водоемов в нагорной части. Бор.

1290.*V. chamaedrys* L. (В. дубравная). По лугам, в разреженных лесах, чаще в лиственных, сорное в огородах. По всему городу, но в нагорной части чаще. Изредка разводится как декоративное (сохраняются самосевно выросшие экземпляры). Нем.

1291.*V. dentata* F. W. Schmidt (В. зубчатая). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – степная полоса России.

1292.*V. filiformis* Smith. (В. нитевидная). Разводится как декоративное и дичает, доминируя в нижнем ярусе луговых, опушечных и рудеральных сообществ. Родина - Кавказ.

1293.*V. gentianoides* Vahl (В. горечавковая). Изредка разводится как декоративное и дичает. Родина - Кавказ.

1294.*V. longifolia* L. (В. длиннолистная). В поймах Оки и Волги, изредка заносится вглубь города. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.

1295.*V. officinalis* L. (В лекарственная). По сосновым, реже лиственным лесам, деградированным лугам. Приок., Сов., Авт., Сорм., Моск., Кан. Бор.

1296.*V. persica* Poir. (В. персидская). Изредка по пустырям. Сов. Заносное растение с Кавказа.

1297.*V. serpyllifolia* L. (В. тимьянолистная). По деградированным лугам, пустырям, сорное в огородах. По всему городу, но в нагорной части чаще. Бор.-Нем.

1298.*V. scutellata* L. (В. щитковая). Изредка по сырьим местам по всему городу. Бор.

1299.*V. sibirica* L. (В. сибирская). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Сибирь, Дальний Восток.

1300.*V. spicata* L. (В. колосистая). Изредка по лугам на склонах и песчаным пустырям. Приок., Сов., Ниж., Моск., Кан., Сорм. Степ.

1301.*V. spuria* L. (В. метельчатая). Изредка по лугам на склонах. Сов., Ниж. Степ. Охр. В последние годы исчезла из ранее обнаруженных местообитаний.

1302.*V. teucrium* L. (В. троянская). Изредка по лугам на склонах, по песчаным пустырям. Нагорная часть и Сорм. Нем. Охр.

1303.*V. verna* L. (В. весенняя). Изредка по склонам и песчаным пустырям, образуя эфемерные сообщества. Нагорная часть, Сорм., Кан., Моск. Степ.

Примечание: вероники длиннолистная, дубравная, троянская, колосистая, метельчатая собираются местным населением на букеты.

127 сем. Bignoniaceae - Бигнониевые.

1304.*Catalpa bignonioides* Walt. (Каталпя бигнониевидная). Изредка разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

1305.*C. ovata* Don. (К. овальнолистная). Аналогично предыдущему. Родина – Китай.

128 сем. Orobanchaceae - Заразиховые.

1306.*Orobanche alsatica* Kirschl. (Заразиха эльзасская). Изредка по берегам ручьев в зарослях высокотравья. Приок. Степ. Охр.

129 сем. Lentibulariaceae - Пузырчатковые.

1307.*Utricularia intermedia* Hayne (Пузырчатка промежуточная). На торфяных болотах. Моск. Бор. Охр.

1308.*U. vulgaris* L. (П. обыкновенная). По небольшим водоемам. Заречная часть кроме Лен. Бор.

130 сем. Plantaginaceae - Подорожниковые.

1309.*Plantago lanceolata* L. (Подорожник ланцетный). Изредка по сухим лугам, пустырям. По всему городу, но в нагорной части чаще. Степ.

1310.*P. major* L. (П. большой). На пустырях, в парках, деградированных лесах и лугах, сорное в огородах по всему городу. Местным населением собирается как лекарственное сырье. Краснолистная форма разводится как декоративное и дичает. Бор.-Нем.-Степ.

1311.*P. maxima* Juss. et. Jacq. (П. наибольший). Ранее встречался в пойме Волги как занесенное. Родина - юго-восток Западной Европы, Кавказ.

1312.*P. media* L. (П. средний). Изредка по сухим лугам и пустырям по всему городу, но в нагорной части чаще. Степ.

1313.*P. scabra* Moench, *P. indica* L. (Подорожник шершавый, индийский). По песчаным берегам Оки и Волги. Ранее был очень распространен, в последнее время встречается реже. Степ.

1314.*P. urvillei* Opiz, *P. stepposa* Kuprian. (П. Урвилля, степной). Изредка по лугам на склонах. Сов, Приок. Степ. Охр.

131 сем. Rubiaceae - Мареновые.

1315.*Galium aparine* L. (Подмаренник цепкий). На пустырях и как сорное в огородах в нагорной части. Бор.-Нем.-Степ.

1316.*G. boreale* L. (П. северный). По берегам Оки и Волги, изредка заносится вглубь города. Бор.

1317.*G. intermedium* Schult. (П. промежуточный). Изредка по сырым лугам. Приок. Среднеевр.

1318.*G. mollugo* L. (П. мягкий). По лугам на склонах, реже на пустырях в нагорной части города. Местным населением собирается на букеты. Степ.

1319.*G. odoratum* (L.) Scop. (П. душистый). По широколиственным лесам в нагорной части города. Нем.

1320.*G. palustre* L. (П. болотный). По сырым местам по всему городу. Бор.

1321.*G. physocarpum* Ledeb. (П. вздутоплодный). В поймах Оки и Волги. Бор.-Нем.

1322.*G. rivale* (Sibth. et Smith) Griseb. (П. поручейный). По берегам ручьев в нагорной части. Бор.

1323.*G. ruprechtii* Pobed. (П. Рупрехта). Изредка по болотам. Авт. Бор.

1324.*G. spurium* L. (П. ложный). На пустырях, сорное в огородах. Рассеянно по

всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1325.*G. uliginosum* L. (П. топяной). По сырым лугам, болотам рассеянно по

всему городу. Бор.

1326.*G. verum* L. (П. настоящий). По сухим лугам, песчаным пустырям. Нагорная часть, Моск., Лен., Сорм., Кан. Местным населением собирается на букеты.

Степ.

132 сем. Caprifoliaceae - Жимолостные.

1327.*Diervilla rivularis* Gatt. (Диервила приручевая). Изредка разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

1328.*Lonicera alpigena* L. (Жимолость альпийская). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Западная Европа.

1329.*L. caprifolium* L. (Ж. каприфоль). Разводится как декоративное и дичает, главным образом как почвопокровная лиана. Родина - Кавказ.

1330.*L. edulis* Turcz. ex Freyn (Ж. съедобная). Разводится как пищевое и дичает. Родина - Дальний Восток.

Примечание: как пищевые разводятся также различные гибридные формы жимолости.

1331.*L. pallasii* Ledeb. (Ж. Палласа). В прошлом было найдено в зарослях кустарников на полуострове Печерские пески. Ниж. Гипоаркт.-Бор. Охр. Кр. Единично разводится как декоративное.

Примечание: в последнее время этот и предыдущий вид рассматриваются в прежнем расширенном объеме единого линнеевского вида *Lonicera caerulea* L. s.l. (Жимолость голубая). В настоящее время в окрестностях пос. Торфопредприятие (Московский р-н) может находиться в естественном местообитании.

1332.*L. tatarica* L. (Ж. татарская). Разводится как декоративное и дичает. Родина - черноземная полоса России.

1333.*L. xylosteum* L. (Ж. лесная). В различных лесах по всему городу, кроме Лен. Разводится как декоративное. Бор.

1334.*Sambucus nigra* L. (Бузина черная). Изредка разводится как декоративное. Родина - Западная Европа, Кавказ.

1335.*S. racemosa* L. (Б. красная). По разреженным лесам, культурам сосны, паркам, пустырям по всему городу. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем. Изредка собирается местным населением как лекарственное сырье.

1336.*Symporicarpos occidentalis* Hook. (Снежная ягода западная). Разводится как декоративное и дичает. Родина – Северная Америка.

1337.*S. rivularis* Suksdorf (С. я. приручевая). Аналогично предыдущей, но гораздо чаще.

1338.*Viburnum lantana* L. (Гордовина обыкновенная). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа, Кавказ.

1339.*V. lentago* L. (Г. канадская). Аналогично предыдущей, но реже. Родина - Северная Америка.

1340.*V. opulus* L. (Калина обыкновенная). По опушкам лесов, паркам по всему городу. Местным населением собирается как лекарственное сырье (плоды). Разводится как декоративное и лекарственное и вторично дичает. Бор.-Нем.

1341.*V. sargentii* Koch. (К. Саржента). Изредка разводится как декоративное. Родина - Дальний Восток. (Пентин А.П., Елистратов А.В., 1975).

1342.*Weigela florida* (Sieb. et Zucc.) A.DC. (Вейгела цветущая). Разводится как декоративное. Родина - Северный Китай, Корея.

1343.*W. japonica* Thunb. (В. японская). Аналогично предыдущей. Родина - Дальний Восток.

1344.*W. praecox* (Lemoine) Bailey (В. ранняя). Аналогично предыдущей.

Примечание: разводятся также различные гибридные формы вейгел.

133 сем. Adoxaceae - Адоксовые.

1345.*Adoxa moschatellina* L. (Адокса мускусная). Изредка по широколиственным лесам в нагорной части города и Авт. Бор.- Нем.- Степ. Охр.

134 сем. Valerianaceae - Валериановые.

1346.*Valeriana officinalis* L. s.l. (Валериана лекарственная). По опушкам лесов, в зарослях кустарников, по сырьем лугам. Изредка заносится с торфом в огороды. Местным населением собирается на букеты и как лекарственное сырье и тонизирующее для кошек (корневища). Разводится как лекарственное (преимущественно самосевно выросшие экземпляры) и вторично дичает. Бор.-Нем.

135 сем. Dipsacaceae - Ворсянковые.

1347.*Dipsacus sativus* (L.) Scholl (Ворсянка посевная). Разводится как декоративное и техническое (ворсовальные шишки для создания "мохера" на вязанных изделиях) и дичает. Родина - Средиземноморье.

1348.*Cephalaria litwinovii* Bobr. (Головчатка Литвинова). Единично разводится как декоративное и дичает. Родина - южная Россия.

1349.*Knautia arvensis* (L.) Coult. (Короставник полевой). По лугам, пустырям по всему городу. Местным населением собирается на букеты. Степ.

1350.*Succisa pratensis* Moench (Сивец посевной). На заболоченных лугах в Авт и как одичалое на лугу у Ботанического сада. Аборигенный вид области. Бор.-Нем.-Степ. Охр.

136 сем. Cucurbitaceae - Тыквенные.

1351.*Bryonia alba* L. (Переступень белый). Разводится как декоративное и дичает. Корневища изредка собираются местным населением как лекарственное сырье. Родина - Западная Европа.

1352.*B. dioica* Jacq. (П. двудомный). Ранее разводился и дичал в окрестностях Ботанического сада в Приок. В последние годы не замечен. Родина – Западная Европа, Крым, Кавказ.

1353.*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai (Арбуз пищевой). Разводится как пищевое и вырастает из оброненных семян и выброшенных плодов. Родина - Африка.

1354.*Cucumis sativus* L. (Огурец). Разводится как пищевое и вырастает из выброшенных плодов и оброненных семян. Родина неизвестна.

1355.*Cucurbita pepo* L. (Тыква, Кабачок, Патиссон). Разводятся как пищевые, у чалмовидных тыкв плоды используются для поделок. Тыквы, реже патиссоны и кабачки иногда вырастают из выброшенных плодов и оброненных семян. Родина - центральная Америка.

1356.*Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray (Эхиноцистис, Пузырник, Иглистый огурец). Разводится как декоративное и дичает, главным образом, по берегам водоемов. Родина - Северная Америка.

1357.*Lagenaria siceraria* (Mol.) Standl. (Лагенария, Бутылочная тыква). Изредка разводится как декоративное, плоды используются для поделок. Родина - южная Азия.

1358.*Melo sativus* Sager ex Roem. (Дыня). Разводится как пищевое. Родина - Средиземноморье, Средняя Азия, Китай.

1359.*Thladiantha dubia* Bunge (Гладианта сомнительная). Разводится как декоративное и дичает, изредка образуя сообщества. Родина - северный Китай.

137 сем. Campanulaceae - Колокольчиковые.

1360.*Adenophora liliifolia* (L.) A. DC. (Бубенчик лилиевидный). В пойменных дубравах в Сорм., по травянистым склонам Слуды в Сов. и Ниж. Степ. Охр.

1361.*Campanula bononiensis* L. (Колокольчик болонский). Изредка по травянистым склонам в нагорной части города. Степ. Охр.

1362.*C. carpatica* Jacq. (К. карпатский). Изредка разводится как декоративное. Родина – Средняя Европа.

1363.*C. cervicaria* L. (Колокольчик жестковолосый). Изредка по опушкам в Марьиной роще (Сов.). Бор.-Нем.-Степ. Охр.

1364.*C. glomerata* L. (К. скученный). По пустырям и опушкам лесов рассеянно по всему городу, но в нагорной части чаще. Бор.-Нем.

1365.*C. latifolia* L. (К. широколистный). По широколиственным лесам в нагорной части. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем. Охр.

1366.*C. media* L. (К. средний). Изредка разводится как декоративное. Родина – южная Европа.

1367.*C. patula* L. (К. раскидистый). По лугам, опушкам, пустырям по всему городу. Степ.

1368.*C. persicifolia* L. (К. персиколистный). Изредка по опушкам в нагорной части города, Сорм. и Кан. Бор.-Нем. Охр. Разводится как декоративное и вторично дичает.

1369.*C. rapunculoides* L. (К. рапунцелевидный). По опушкам, лугам и пустырям в нагорной части города и Авт. Степ. Охр.

1370.*C. rotundifolia* L. (К. круголистный). По сосновым борам и боровым пустырям. Заречная часть, кроме Лен. Бор.-Нем.-Степ.

1371.*C. trachelium* L. (К. крапиволистный). По широколиственным лесам и зарослям кустарников в нагорной части, изредка разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.

1372.*Jasione montana* L. (Букашник горный). По сосновым борам и боровым пустырям. Моск., Сорм. Степ.

Примечание: все вышеперечисленные виды этого семейства собираются местным населением на букеты.

1373 *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A.DC. (Ширококолокольчик, Платикодон крупноцветковый). Изредка разводится как декоративное. Родина – Восточная Сибирь, Дальний Восток.

138 сем. Lobeliaceae - Лобелиевые.

1374.*Lobelia erinus* L. (Лобелия длинночерешковая). Разводится как декоративное. Родина - Африка.

1375.*L. siphilitica* L. (Л. сифилитическая). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Северная Америка.

139 сем. Asteraceae, Compositae - Астровые, Сложноцветные.

1376.*Achillea filipendulina* Cam. (Тысячелистник таволговый). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Кавказ.

1377.*A. millefolium* L. (Т. обыкновенный). По лугам, пустырям, сорное в огородах по всему городу. Местным населением собирается как лекарственное сырье (верхушки цветущих побегов). Изредка разводится как лекарственное (экземпляры,

выросшие в огородах самосевом). Есть разводимые декоративные, красноцветковые формы, дичающие. Степ.

1378.*A. setacea* Waldst. et Kit. (Т. щетинистый). Изредка по сосновым борам, пустырям и травянистым склонам по всему городу. Степ.

1379.*Ageratum houstonianum* Mill. (Агератум Хаустона). Разводится как декоративное. Родина - обе Америки.

1380.*Ambrosia artemisiifolia* L. (Амброзия полыннолистная). Изредка на пустырях, насыпях шоссейных и железных дорог по всему городу. Иногда образует сообщества. В годы с жарким летом семена вызревают и тогда амброзия распространяется самосевом. Заносное из Северной Америки.

1381.*Anaphalis margaritacea* (R. Br.) Benth. et Hook f. (Анафалис жемчужный). Изредка разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

A. pterocaulon (Franch. et Sav.) Maxim. (А.крылатостебельный). Аналогично предыдущему.

1383.*Anthemis arvensis* L. (Пупавка полевая). В прошлом была найдена на пустыре на юго-восточной окраине города. Степ.

1384.*A. cotula* L. (П. собачья). В прошлом была найдена на насыпи железной дороги на юго-восточной окраине города. Заносное из южной России.

1385.*A. tinctoria* L. (П. красильная). По лугам на склонах и на пустырях в нагорной части. Местным населением собирается на букеты. Изредка разводится как декоративное. Бор.-Нем.

1386.*Antennaria dioica* (L.) Gaertn. (Кошачья лапка двудомная). В сосновых борах и боровых пустырях, реже по сухим лугам. Заречная часть, кроме Лен. и Приок. Бор.-Нем.

1387.*Arctium lappa* L. (Лопух большой). Изредка на пустырях, по лесным дорогам и в парках. Ниж., Приок., Лен., Кан., Авт. Нем.-Степ.

1388.*A. minus* (Hill.) Bern. (Л. малый). Изредка на пустырях по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1389.*A. nemorosum* Lej. et Court. (Л. дубравный). Изредка на пустырях. Приок., Моск. Бор.-Нем.-Степ.

1390.*A. tomentosum* Mill. (Л. паутинистый). На пустырях, в парках, деградированных лесах, сорное в огородах по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1391.*Arctonis x hort.* (Арктонис, гибридная садовая форма). Изредка разводится как декоративное. Родина – южная Африка.

1392.*Arnica montana* L. (Арника горная). Изредка разводится как декоративное. Родина – средняя Европа.

1393.*Artemisia abrotanum* L., *A. procera* Willd. (Полынь лечебная, высокая). По берегам Оки и Волги, где иногда образует сообщества; заносится с песком вглубь города. Изредка разводится как декоративное. Степ.

1394.*A. absinthium* L. (П. горькая). На пустырях, в парках, деградированных лесах, сорное в огородах по всему городу. Изредка разводится как декоративное. Местным населением собирается как репеллент и инсектицид. Степ.

1395.*A. armeniaca* Lam. (П. армянская). По насыпи железной дороги в Моск. Степ. Охраняемое растение области, входящее в Красную книгу области.

1396.*A. austriaca* Jacq. (П. австрийская). В прошлом была найдена на насыпи железной дороги на юго-восточной окраине города. Заносное из южной России.

1397.*A. dracunculus* L. (П. эстрагон). Разводится как пищевое и ароматическое. В Бурнаковской низине (Моск.) в массе как одичалое. Родина - южная Россия.

1398.*A. marschalliana* Spreng. (П. Маршалла). Изредка по разреженным сосновым борам, лугам на склонах и пустырям; по всему городу. Степ.

1399.*A. schmidiana* Maxim. (П. Шмидта). Изредка разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

1400.*A. scoparia* Waldst. et Kit. (П. метельчатая). В прошлом была найдена на насыпи железной дороги на юго-восточной окраине города. Заносное из южной России.

1401.*A. sieversiana* Willd. (П. Сиверса). Изредка по песчаным берегам Оки (Сов.) и насыпи железной дороги (Приок.). Сиб.

1402.*A. vulgaris* L. (П. обыкновенная). Распространение аналогично полыни горькой. Бор.-Нем.-Степ.

1403.*Aster salignus* Willd. (Астра иволистная). Разводится как декоративное и дичает, главным образом по берегам водоемов, иногда образуя сообщества. Родина - Северная Америка.

Примечание: в настоящее время этот вид рассматривают как входящий в сложный цикл нескольких близких видов, гибридизирующих между собой.

1404.*Balsamita major* Deaf. (Бальзамита большая, Пиретрум большой, Кануфер). Изредка разводится как ароматическое и пищевое. Родина - Малая Азия, Иран.

1405.*Bellis perennis* L. (Маргаритки многолетние). Разводятся как декоративное и дичают. Родина - Западная Европа, Кавказ.

1406.*Bidens cernua* L. (Череда поникшая). По сырьим местам повсеместно; иногда образует сообщества. Бор.-Нем. Степ.

1407.*B. frondosa* L. (Ч. олиственная). По всему городу по берегам водоемов и пустырям, посевам, иногда образуя сообщества. Заносное из Северной Америки.

1408.*B. radiata* Thull. (Ч. лучистая). По берегам водоемов в заречной части города и по берегу Оки в Приок. и Сов. Иногда образует сообщества. Изредка заносится с песком в нагорную часть города. Бор.

1409.*B. tripartita* L. (Ч. трехраздельная). Распространение и фитоценотические свойства аналогичны череде поникшей.

Примечание: все виды череды собираются местным населением как лекарственное сырье (верхушки цветущих побегов).

1410.*Calendula officinalis* L. (Ноготки лекарственные). Разводится как декоративное, лекарственное и репеллент (с последней целью культивируют в посадках различных огородных культур) и дичает. Родина - Средиземноморье.

1411.*Callistephus chinensis* (L.) Necs. (Каллистефус, Астра китайская). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Китай, Япония.

1412.*Carduus acanthoides* L. (Чертополох окаймленный). Изредка на пустырях, по насыпям железных дорог. Иногда образует сообщества. Сов., Приок. Среднеевр.

1413.*C. crispus* L. (Ч. курчавый). На пустырях, сорное в огородах. Иногда образует сообщества. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1414.*C. hamulosus* Ehrh. (Ч. крючковый). По травянистым склонам Слуды в Ниж. Степ.

1415.*C. nutans* L. (Ч. поникший). Изредка на пустырях в нагорной части. Степ.

1416.*C. uncinatus* M.B. (Ч. крючковатый). В прошлом был найден на насыпи железной дороги на юго-восточной окраине города. Заносное из южной России.

1417.*Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem. (Ключник Биберштейна). Изредка по сухим лугам по всему городу. Местным населением собирается на сухие букеты. Степ.

1418.*Centaurea cyanus* L. (Василек посевной). Изредка на пустырях по всему городу и сорное в посевах кормовых культур в Сов. и Приок.. Разводится как декоративное. Бор.-Нем.-Степ.

1419.*C. dealbata* Willd. (В. подбеленный). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина - Кавказ.

1420.*C. diffusa* Lam. (В. раскидистый). Изредка на пустырях. Моск. Заносный причерноморский вид.

1421.*C. jacea* L. (В. луговой). По лугам, паркам, деградированным лесам по всему городу. Разводится как декоративное. Бор.-Нем.-Степ.

1422. *C. montana* L. (Б. горный). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Средняя Европа.

1423. *C. phrygia* L. (Б. фригийский). Изредка по лугам и полянам в нагорной части и Кан. Разводится как декоративное. Бор.-Охр.

1424. *C. pseudophrigia* C.A.Mey (Б. ложнофригийский). По лугам, на лесных полянах. Нагорная часть и Авт. Разводится как декоративное. Нем.

1425. *C. scabiosa* L. (Б. шероховатый). По лугам на склонах в нагорной части. Изредка разводится как декоративное. Бор.-Нем. Охр.

1426. *C. sumensis* Kalenicz. (Б. сумский). По разреженным борам и боровым пустырям. Сорм., Моск. Степ. Охр.

Примечание: все виды дикорастущих васильков собираются местными жителями на букеты.

1427. *Chrysanthemum carinatum* Schousb. (Златоцвет килеватый). Разводится как декоративное. Родина - северная Африка.

1428. *C. coronarium* L. (З. венечный). Аналогично предыдущему. Родина - Крит и Сирия.

1429. *C. segetum* L. (З. посевной). Аналогично предыдущим, но гораздо реже. Родина - западная Европа.

1430. *Cichorium intybus* L. (Цикорий обыкновенный). По лугам, пустырям, паркам, деградированным лесам, сорное в огородах. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1431. *Cirsium arvense* (L.) Scop. (Бодяк полевой). По пустырям, деградированным лугам и лесам, сорное в огородах повсеместно. Иногда образует сообщества. Бор.-Нем.-Степ.

1432. *C. canum* (L.) All. (Б. серый). В прошлом был найден по насыпи железной дороги в Приок. Степ.

1433. *C. heterophillum* (L.) Hill (Б. разнолистный). По заболоченным лугам и лесам. Моск., Кан. Бор.

1434. *C. oleraceum* (L.) Scop. (Б. огородный). По берегам малых водоемов в нагорной части. Бор.

1435. *C. palustre* (L.) Scop. (Б. болотный). Изредка в поймах Оки и Волги и по заболоченным лесам в Кан. Бор.-Нем.

1436. *C. serrulatum* M.B. (Б. реснитчатый). В прошлом был найден на насыпи железной дороги на юго-восточной окраине города. Заносное из южной России.

1437. *C. vulgare* (Savi) Ten. (Б. обыкновенный). По пустырям, сорное в огородах по всему городу. Иногда образует сообщества. Бор.-Нем.-Степ.

1438. *Conysa canadensis* (L.) Cronq., *Erigeron canadensis* L. (Кониза канадская, Мелколепестник канадский). По пустырям, сорное в огородах, по насыпям железных дорог. Иногда образует сообщества. По всему городу, но в заречной части чаще. Заносное из Северной Америки.

1439. *Coreopsis basalis* (Dietr.) Blake (Кореопсис основной). Изредка разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

1440. *C. tinctoria* Nutt. (К. красильный). Аналогично предыдущему, изредка вырастает из оброненных семян.

1441. *Cosmos bipinnatus* Cav. (Космос двувильчатый). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Мексика.

1442. *Crepis biennis* L. (Скерда двулетняя). Изредка на пустырях и насыпях железных дорог. Лен., Приок., Сорм. Нем.

1443. *C. padulosa* (L.) Moench. (С. болотная). Изредка по сырьим лесам и берегам малых водоемов. Приок., Сов. Бор. Охр.

1444. *C. sibirica* L. (С. сибирская). Изредка по опушкам, лесным полянам, разреженным насаждениям, зарослям кустарников в Приок. В Ниж. найдено как занесенное в палисаднике. Нем. Охр.

1445.*C. tectorum* L. (С. кровельная). По пустырям, деградированным лесам и лугам, кирпичным стенам. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1446.*Cyclachaena xanthiiifolia* (Nutt) Fresen (Циклахена дурнишниколистная). Изредка на пустырях и обочинах дорог, где иногда образует сообщества. Рассеянно по всему городу. Заносное из Северной Америки.

1447.*Dahlia x cultorum* Thorsr. et Reis. (Георгины культурные). Разводится как декоративное и вырастает из выброшенных клубней. Клубни на зиму выкапываются и хранятся в прохладном помещении. Родина - Центральная Америка.

1448.*Dendranthema indicum* (L.) Des Moul (Дендрантема индийская). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Япония, Китай.

1449.*Doronicum orientale* Hoffm. (Дороникум восточный). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Кавказ.

1450.*D. pardalianches* L. (Д. ядовитый). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Средиземноморье.

1451.*Echinacea purpurea* L. (Эхинация пурпурная). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Северная Америка.

1452.*Echinops ruthenicus* Bieb., *Echinops ritro* L. (Мордовник русский, обыкновенный). Изредка на пустырях в Приок. Заносное с юга области. Степ. Охр.

1453.*E. sphaerocephalus* L. (М. круглоголовый). Изредка на пустырях и насыпях железных дорог в Приок., Авт.; изредка разводится как декоративное. Аборигенный вид юга области. Степ. Охр.

1454. *Emilia coccinea* G. Don (Эмилия ярко-красная). Изредка разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина – тропическая Азия.

1455.*Erigeron acris* L. (Мелколепестник едкий). По пустырям, сорное в огородах, по деградированным лугам. По всему городу. Степ.

1456.*E. droebachiensis* O.F.Muell. (М. дребакский). На насыпи железной дороги в Приок, на пустыре в Ниж. Заносное среднеевр.

1457.*E. podolicus* Bess.(М. подольский). На пустыре в Ниж. Заносное западноевропейское.

1458.*E. speciosus* (Lindl.) DC. (М. красивый). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Северная Америка.

1459.*E. uralensis* Less. (М. уральский). На насыпи железной дороги в Приок. Бор.-Нем.

1460.*Eupatorium cannabinum* L. (Посконник коноплевый). По берегам водоемов и пустырям в нагорной части. Местным населением собирается на букеты. Разводится как декоративное и вторично дичает. Нем.

1461. *Filaginella uliginosa* (L.) Opiz, *Gnaphalium uliginosum* L. (Сушеница топяная). По берегам водоемов, реже на пустырях. С торфом заносится в огороды, цветники. Рассеянно по всему городу. Бор. Местным населением собирается как лекарственное сырье.

1462.*Gaillardia pulchella* Foug., *G.lanceolata* Michx. (Гайлляндия красивая, ланцетная). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

1463.*Galinsoga parviflora* Cav. (Галинзога мелкоцветная). На пустырях по всему городу. Заносное из Южной Америки.

1464.*G. quadriradiata* Ruiz. et Pav. (Г. четырехгранная). Изредка на пустырях в нагорной части. Заносное из Южной Америки.

1465.*Gazania splendens* hort. (Газания сверкающая, гибридная форма). Изредка разводится как декоративное. Родина – Южная Америка.

1466.*Helenium*. x hort. (Гелениум, гибридные формы). Разводится как декоративное. Родина - Северная Америка.

1467.*Helianthus annuus* L. (Подсолнечник обыкновенный). Разводится как пищевое, есть декоративные формы, вырастает из оброненных семян и выброшенных корзинок. Родина - Северная Америка.

1468.*H. atrorubens* L. (П. бордовый). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

1469.*H. tuberosus* L. (Топинамбур). Разводится как пищевое, лекарственное и декоративное, разрастается вегетативно и дичает, иногда образуя сообщества. Родина - Северная Америка.

Примечание: некоторые экземпляры имеют явные признаки подсолнечников жесткого и седоватого (*H. rigidus* (Cass.) Desf., *H. subcanescens* (A.Gray) E.E.Wats.). Их родина – Северная Америка.

1470.*Helichrysum bracteatum* Andr. (Цмин прицветниковый). Изредка разводится как декоративное. Родина – Австралия.

1471.*Heliopsis scabra* Dun. (Гелиопсис шершавый). Изредка разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Родина – Северная Америка.

1472.*Hieracium aggr. laevigatum* Willd. (Ястребинка сглаженная). На пустырях, в парках в Приок. Степ. Вероятно, распространилось с территории Ботанического сада, где ранее культивировалось и одичало.

1473.*H. aggr. murgorum* L. (Я. постенная). В парке детского санатория и по обочине дороги в Приок. (Занос из Ботанического сада?). Среднеевр.

1474.*H. aggr. umbellatum* L. (Я. зонтичная). По лугам, полянам, пустырям по всему городу. Степ.

1475.*H. aggr. virgultorum* Jord. (Я. лозняковая). По обочинам дорог, в парках в Приок. Вероятно, распространилось с территории Ботанического сада, где ранее культивировалось и одичало. Среднеевр.

1476.*Inula britannica* L. (Девясил британский). В поймах Оки и Волги, изредка заносится с песком вглубь города. Бор.-Нем.-Степ.

1477.*I. helenium* L. (Д. высокий). Разводится как декоративное и лекарственное и дичает. В пойме р. Рахмы в Сов. может быть в естественном местообитании. Родина - черноземная полоса России, в т.ч. юг нашей области.

1478.*I. hirta* L. (Д. шершавый). Изредка по лугам на склонах в нагорной части. Степ.

1479.*I. salicina* L. (Д. иволистный). В поймах Оки и Волги, изредка заносится с песком вглубь города. Бор.-Нем. Степ. Гибридизирует с предыдущим видом.

Примечание: все виды девясилов собираются местным населением на букеты.

1480.*Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb. (Наголоватка васильковая). По сосновым борам и боровым пустырям. Сорм., Моск., Кан. Степ. Охр.

1481.*Lactuca sativa* L. (Латук, Салат посевной). Разводится как пищевое и дичает. Родина - Средиземноморье.

1482.*L. serriola* Torner. (Л. компасный). По пустырям, сорное в огородах по всему городу. Степ.

1483.*L. tatarica* (L.) C.A.Mey (Л. татарский). Аналогично предыдущему. Нем.-Степ.

1484.*Lapsana communis* L. (Бородавник обыкновенный). В парках, деградированных лесах, на пустырях, сорное в огородах. Иногда образует сообщества. По всему городу, но в нагорной части чаще. Бор.-Нем.-Степ.

Примечание: в нагорной части города на пустырях изредка встречаются экземпляры, образующие переходную форму к Бородавнику среднему (*L. intermedia* Bieb.). Эти экземпляры имеют диаметр корзинок до 17 мм, цветки в 1,5 – 2 раза длиннее обертки.

1485.*Leontodon autumnalis* L. (Кульбаба осенняя). На лугах, пустырях, в парках и деградированных лесах по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1486.*L. hispidus* L. (К. шершавая). Аналогично предыдущей, но реже и преимущественно в нагорной части города. Местным населением собирается на букеты.

1487.*Lepidotheca suaveolens* (Pursh.) Nutt., *Matricaria discoidea* DC. (Лепидотека, Ромашка пахучая). На пустырях, сорное в огородах, газонное на стадионах. По всему городу. Местным населением собирается как лекарственное сырье. Заносное из Северной Америки.

1488.*Leucanthemum x superbum* Bergmans (Нивяник великолепный, садовый гибрид). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно, изредка дичает. Вид гибридного происхождения.

1489.*L. vulgare* Lam. (Н. обыкновенный). По лугам, реже по пустырям и сорное в огородах. По всему городу. Местным населением собирается на букеты. Разводится как декоративное и вторично дичает. Бор.-Нем.-Степ

1490.*Liatris spicata* Willd. (Лиатрис колосистая). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.

1491.*Ligularia dentata* (A. Gray) Hara (Лигулярия зубчатая, Бузульник зубчатый). Изредка разводится как декоративное.

1492.*L. przewalskii* (Maxim.) Diels (Л., Б. Пржевальского). Разводится как декоративное. Родина – Дальний Восток.

1493.*L. stenocephala* (Maxim.) Matsum. et Koidz. (Л.. узкоколосная Б. узкоколосный). Изредка разводится как декоративное. Родина - Япония.

1494.*Logfia arvensis* (L.) Holub, *Filago arvensis* L. (Логфия полевая, Жабник полевой). На пустырях рассеянно по всему городу. Степ.

1495.*Matricaria recutita* L. (Ромашка лекарственная). На пустырях в нагорной части города, преимущественно в окрестностях Ботанического сада. Ранее разводилось в Ботаническом саду как лекарственное и одичало. В последние годы встречается все реже. Местным населением собирается как лекарственное сырье. Бор.-Нем.-Степ.

1496.*Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. et F.W.Schultz, *Gnaphalium sylvaticum* L. (Омалотека лесная, Сушеница лесная). По пустырям, деградированным сухим лугам и лесам, сорное в огородах. По всему городу. Бор.-Нем.

1497.*Onopordum acanthium* L. (Татарник колючий). Изредка на пустырях в Ниж. Степ.

1498.*Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) Maxim. (Подбел японский). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно, иногда образуя сообщества. Родина – Дальний Восток.

1499.*P. spurius* (Retz.) Reichenb. (П. ложный). По берегам Оки и Волги. Изредка заносится с песком вглубь территории города. Бор.-Нем.-Степ.

1500.*Phalacroloma septentrionale* (Fern. et Wieg.) Tzvel. (Тонколучник, Стенактис северный). На пустырях по всему городу. Родина – Северная Америка.

1501.*P. strigosum* (Muehl. ex Willd.) Tzvel. (Т., С. щетинистый). Аналогично предыдущему, но реже.. Родина – Северная америка.

1502.*Picris hieracioides* L. (Горчак ястребинковый). На лугах, пустырях, в деградированных лесах, парках, сорное в огородах. По всему городу. Бор.-Нем.

Pilosella Hill. (Ястребиночка). Этот род выделен из рода *Hieracium* L. (Ястребинка). Ввиду малой изученности видов этого рода мы даем лишь общий список их без указания на распространение по городу.

1503.*P. x arvicola* (Naeg. et Peter.) Sojak, *Hieracium arvicola* Naeg. et Peter. (Я. пашенная).

1504.*P. agr. aurantiaca* (L.) F. Schultz et Sch. Bip.(Я. оранжевая). На пустырях в Приок. Заносное с территории Ботанического сада, где раньше культивировалось и одичало.

1505.*P. x auriculoides* (Lang) F. Shultz, *H. auriculoides* Lang. (Я. скороспелковая).

- 1506.*P. bauhinii* (Bess.) Arv.-Touv., *H. bauhinii* Bess. (Я. Баугина)
- 1507.*P. caespitosa* (Dumort.) P.D.Sell et C. West, *H. caespitosum* Dumort (Я. дернистая).
- 1508.*P. x densiflora* (Tausch) Sojak, *H. umbelliferum* Naeg. et Peter, *H. densiflorum* Tausch (Я. плотноцветковая).
- 1509.*P. x dubia* (L.) Fries, *H. dubium* L. (Я. сомнительная).
- 1510.*P. echinoides* (Lumn.) F. Schultz, *H. echinoides* Lumn. (Я. румянковая).
- 1511.*P. x fennica* (Norrl.) Norrl., *H. spatophillum* Naeg. et Peter. (Я. финская, лопатчатолистная).
- 1512.*P. x flagellaris* (Willd.) Arv.-Touv., *H. flagellare* Willd. (Я. плетевидная).
- 1513.*P. x glomerata* (Froel) Fries, *H. glomeratum* Froel (Я. скученная)
- 1514.*P. officinarum* F. Schultz et Sch., *H. pilosella* L. (Я. волосистая).
- 1515.*P. x piloselliflora* (Naeg. et Peter) Sojak, *H. florentinum* All. p.p. (Я. ястребинковая).
- 1516.*P. x rothiana* (Wallr.) F. Schultz et Sch. Bip., *H. rotianum* Wallr. (Я. Рота)
- 1517.*P. x suecica* (Fries) F. Schultz (Я. шведская).
- 1518.*P. aggr. vailantii* (Tausch) Sojak, *H. cymigerum* Reichenb. (Я. Вайланта).
- 1519.*P. x ziziana* (Tausch) F. Schultz et Sch. Bip., *H. zizianum* Tausch. (Я. Цица).
- 1520.*Ptarmica salicifolia* (Bess.) Serg., *Achillea salicifolia* Bess. (Птармика иволистная, Тысячелистник иволистный). В долинах Оки и Волги по лугам и разреженным лесам. Бор.-Нем.-Степ.
- 1521.*P. vulgaris* Blakw. ex DC., *A. ptarmica* L. (П. обыкновенная, Т. птармика). Разводится как декоративное и дичает. В естественном местообитании – по берегу Волги в Ниж. Среднеевр. Охр.
- Примечание 1: постоянно встречаются экземпляры, соединяющие в себе признаки этих видов.
- Примечание 2: оба этих вида собираются местным населением на букеты.
- 1522.*Pyrethrum corymbosum* (L.) Willd. (Пиретрум щитковый). Разводится как декоративное и разрастается вегетативно. Аборигенное охраняемое растение юга области.
- 1523.*P. parthenifolium* Willd. (П. девичелистный). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа.
- 1524.*P. parthenium* (L.) Smith (П. девичий). Аналогично предыдущему, но чаще. Родина та же.
- 1525.*Rhaponticum serratuloides* (Georgi) Boegr. (Большеголовник серпуховидный). Изредка разводится как декоративное и лекарственное и разрастается вегетативно. Родина - юго-восток европейской России.
- 1526.*Rudbeckia bicolor* Nutt. (Рудбекия двуцветная). Разводится как декоративное. Родина – Северная Америка.
- 1527.*R. hirta* L. (Р. шершавая). Аналогично предыдущей, вырастает из оброненных семян.
- 1528.*R. laciniata* L. (Р. рассеченная). Аналогично предыдущей, но гораздо чаще, разрастается вегетативно. Родина та же.
- 1529.*Senecio cineraria* DC. (Крестовник приморский). Разводится как декоративное. Родина – Средиземноморье.
- 1530.*S. fluviatilis* Wallr. (К приречный). Изредка по берегам Оки. Лен. Нем. Охр.
- 1531.*S. jacobaea* L. (К. Якова). По лугам, реже по пустырям, паркам и деградированным лесам, изредка как сорное в огородах. Рассеянно по всему городу, но в нагорной части чаще. Местным населением собирается на букеты. Бор.-Нем.-Степ.
- 1532.*S. sylvaticus* L. (К. лесной). Изредка по лесным опушкам. Приок. Среднеевр. Охр.

1533.*S. viscosus* L. (К. клейкий). На пустырях, по насыпям железных дорог. Иногда образует сообщества. Рассеянно по всему городу, но в заречной части чаще. Среднеевр.

1534.*S. vulgaris* L. (К. обыкновенный). По паркам, пустырям, сорное в огородах, по деградированным лугам и лесам. По всему городу. Бор.

1535.*Serratula coronata* L. (Серпуха венечная). По лугам на склонах берегов Оки и Волги и их оврагов в нагорной части и в пойме Волги в Сорм. Степ. Охр.

1536.*Silphium perfoliatum* L. (Сильфий пронзеннолистный). Разводился на опытном участке НГСХА и одичал. Родина - Северная Америка.

1537.*Silybum marianum* (L.) Gaertn. (Расторопша Мария, пятнистая). Ранее разводилась в огородах и была найдена одичалой (Мурашкинский К.И., 1909). В настоящее время разводится как лекарственное и декоративное. Родина - южная Европа.

1538.*Solidago canadensis* L. (Золотарник канадский). Разводится как декоративное, разрастается вегетативно и дичает, образуя сообщества. Родина - Северная Америка.

1539.*S. serotinoides* A. et D. Love. (З. поздний). Аналогично предыдущему.

1540.*S. virgaurea* L. (З. обыкновенный). По пустырям, паркам, деградированным лугам и лесам по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1541.*Sonchus arvensis* L. (Осот полевой). По деградированным лугам, лесам, по паркам, пустырям, сорное в огородах. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1542.*S. asper* (L.) Hill. (Осот острый). По пустырям, паркам, сорное в огородах. В нагорной части. Бор.-Нем.-Степ.

1543.*S. oleraceus* L. (О. огородный). Изредка как сорное в огородах и на пустырях в нагорной части. Бор.-Нем.-Степ.

1544.*Tagetes erecta* L. (Бархатцы прямостоячие). Разводится как декоративное и вырастает из оброненных семян. Родина - Северная Америка.

1545.*T. patula* L. (Б. отклоненные). Аналогично предыдущему.

1546.*T. tenuifolia* Cav. (Б. тонколистные). Аналогично предыдущему.

1547.*Tanacetum vulgare* L. (Пижма обыкновенная). По лугам, деградированным лесам, паркам, пустырям, сорное в огородах. Изредка разводится как декоративное. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1548.*Taraxacum officinale* Wigg. (Одуванчик лекарственный). По пустырям, сорное в огородах, по паркам, деградированным лесам и лугам. По всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

Примечание: в настоящее время этот вид разбит на множество мелких видов.

1549.*Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. (Телекия красивая). Разводится как декоративное и дичает. Родина - Западная Европа, Кавказ.

1550.*Tragopogon dubius* Scop. (Козлобородник сомнительный). Изредка на пустырях, насыпях железных дорог по всему городу. Степ.

1551.*T. orientalis* L. (К. восточный). Изредка в поймах Оки и Волги. Степ. Охр.

Примечание: изредка встречаются экземпляры, переходные к козлобороднику луговому.

1552.*T. podolicus* (DC.) S. Nikit. (К. подольский). В пойме Волги на сухих лугах (Сорм.), на пустырях в Приок. и Моск.. Степ.

1553.*T. pratense* L. (К. луговой). Изредка по лугам на склонах и на пустырях в нагорной части. Бор.-Нем.

Примечание: все виды козлобородников собираются местным населением на букеты.

1554.*Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip. (Трехреберник непахучий). На пустырях, деградированных лугах и лесах, в парках, сорное в огородах по всему городу. Бор.-Нем.-Степ.

1555.*Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh, *Achyrophorus maculatus* (L.) Scop. (Троммсдорфия крапчатая, Прозанник крапчатый). Изредка на лугах по склонам в Приок. и в сосновых борах и их дериватах в Сорм. Степ. Охр.

1556.*Tussilago farfara* L. (Мать-и-мачеха обыкновенная). На пустырях и как сорное в огородах по всему городу. Иногда образует сообщества. Местным населением собирается как лекарственное сырье. Бор.-Нем.-Степ.

1557.*Xanthium albinum* (Widd.) H.Scholz. (Дурнишник бледный). Изредка на пустырях. Ниж. Заносное из Северной Америки.

1558.*X. ripicola* Holub (Д. береговой). Изредка на пустырях в нагорной части. Заносное из Западной Европы.

1559.*X. strumarium* L. (Д. обыкновенный). На пустырях по всему городу. Степ.

Примечание: все виды дурнишника часто образуют сообщества.

1560. *Zinnia angustifolia* H.B.K. (Цинна узколистная). Изредка разводится как декоративное. Родина – Центральная Америка.

1561.*Z. elegans* Jacq. (Ц. изящная). Аналогично предыдущему, но гораздо чаще.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОЙ ФЛОРИСТИКИ.

Изучение видового состава растительного мира Нижнего Новгорода, распространения по территории и роли различных видов растений в городских экосистемах с неизбежностью приводят к постановке проблем городской флористики, решение которых пока нам самим не ясно. Ниже мы укажем некоторые проблемы, решение которых по нашему мнению имеет значение для изучения флоры городов вообще, а не только Н.Новгорода.

1. Что есть флора города?

Общепринятое определение флоры территории, как совокупности таксонов (чаще всего - видов), произрастающих на данной территории – только первый шаг к познанию этой многогранной категории. В нашей работе мы понимали флору как совокупность видов растений, входящих в окружающую среду человека как субъекта, результатом деятельности которого и явился город как географический объект. Последовательное применение этого положения должно бы включить в рассмотрение нашей работы не только растения открытого грунта, но и закрытого, т.е. комнатные, оранжерейные растения которые ведь тоже входят в окружающую горожан среду! Следует, однако, заметить, что развитие озеленения города идет по пути переноса в открытый грунт, пусть даже только в разгар лета, комнатных и оранжерейных растений, не говоря о балконных. На памяти автора этих строк именно из оранжерей пришли в открытый грунт такие растения, как бегония, недотрога бальзаминовая, желтокислица прямая (в настоящее время интенсивно дичает!), некоторые виды сыти и т.п. Именно из оранжерей появились такиеrudеральные растения открытого грунта как желтокислица рогатая, галинзога и прочие. С балконной культуры явились в открытый грунт лобелия черешковая, петунья (вырастающая из оброненных семян по всему городу!) и прочие.

Следует вспомнить, в связи с этим, что, например, во «Флоре» П.Ф.Маевского, в числе видов приводятся и те культивируемые, которые вырастают в открытом грунте с предварительной выгонкой в парнике, или теплице (огурцы, помидоры, дыни и т.д.).

Подобный подход к понятию флоры города нисколько не противоречит такому традиционному понятию флоры территории, как совокупности видов, на этой территории издавна произрастающих; флора, т.о., понимается как исторически сложившаяся совокупность видов данной территории. Нужно только учесть, что город в значительной мере антропогенный объект и история формирования его флоры обусловлена не только физико-географическими и фитоценотическими условиями и является составной частью его палеогеографии, но и деятельностью человека, также имеющей историю. Другими словами, история формирования флоры города является и составной частью его исторической географии.

2. Каковы должны быть принципы ботанико-географического районирования города?

В нашей работе мы следовали по пути ботанико-географического районирования внегородских пространств, т.е. по очерчиванию территорий, каждая из которых имеет какие-то особенности во флоре и/или растительности, причем подразумевалась флораaborигенная, т.е. растения, исконно обитавшие здесь (замечу тут же, что ввиду большой древности заселения устья Оки, по меньшей мере с неолита, касательно ряда растений трудно решить, являлись ли они “исконно обитавшими” или все-таки занесенными, или же появившимися в результате изменения экологических условий, вызванных хозяйственной деятельностью человека). Однако, различие в хозяйственной деятельности людей приводит к различию во флоре и растительности на обширной городской территории и это ведет к тому, что можно дать и совершенно иную схему ботанико-географического деления. Так, например, можно выделить крайние восточные участки Приокского и Советского районов с преобладанием полей

и массивов садов, исторический центр города, где полностью отсутствуют даже дериваты лесов и т.д.

Подобный подход также по нашему мнению нисколько не противоречит традиционному, ибо в связи с деятельностью человека происходит отбор аборигенных видов растений, самосевно произрастающих в различных частях города. Так, в историческом центре, лишенном даже дериватов лесной растительности, из аборигенной лесной флоры самосевно произрастают только некоторые из древесных видов (дуб, липа, ясень высокий, клен платанолистный и вяз гладкий), а из травянистых – сныть. В крайних же восточных участках нагорной части города, где преобладают поля кормовых культур и массивы садов, в полезащитные аллеи и заросли кустарников проникают практически все представители широколиственного леса.

3. Имеются ли какие-либо характерные виды для таких специфических экосистем города как каменные стены строений, малые речки, чей сток почти нацело образован бытовыми и промышленными стоками, свалки?

Это самая неизученная проблема городской флористики. Пока можно говорить только, что из лиан каменные стены строений облюбовал паслен сладкогорький, из деревьев – береза пушистая и ива козья, из травянистых растений – скерда кровельная, щитовник мужской и некоторые другие. Что касается “поганых речек”, то из аборигенных видов там наиболее многочислены рогоз широколистный, хвош приречный, ряска малая и немногие другие. Из одичалых культивируемых и заносных видов повидимому с самого начала обнаружили хорошую адаптацию к экологическим условиям подобных водоемов недотрога железистая, иглистый огурец, повой вздутый и череда олиственная, появившиеся по берегам (а в случае череды даже на техногенных сплавинах из пластмассовых бутылей!) практически одновременно с появлением в городе вообще. Касательно апомиктических, быстро эволюционирующих видов манжеток, очанок, одуванчиков вполне возможно и образование специфических “городских”, “техногенных” видов, приуроченных к таким характерным для города экосистемам, как свалки, отвалы грунта и т.п.

4. Можно ли говорить о специфической “городской свите растительности” в том же смысле, в каком давал это понятие Г.М.Зозулин (Исторические свиты растительности европейской части СССР// Ботанический журнал, том 58, №8, 1073, с.1081-1092)? Или же лучше говорить о видах растений, которые характерны, или, напротив, не характерны для города?

В своей работе мы не отмечали принадлежности растений к свите растительности ввиду малой изученности этого понятия для многих конкретных видов растений. Сверх того подавляющее большинство видов растений кажется пришедшими в город из внегородских экосистем. Тем не менее есть ряд видов, распространявшихся в области именно с территории Нижнего Новгорода. Это – лекарственная и пахучая ромашки, марь доброго Генриха, волоснец приречный и прочие растения, либо разводившиеся в Нижнем Новгороде, а затем одичавшие и распространявшиеся по области, либо занесенные в населенные пункты области как культивируемые и потом одичавшие. С другой стороны, известен по крайней мере один видrudерального растения – крапива жгучая, весьма редкий в Нижнем Новгороде, но обычный в прочих населенных пунктах области, особенно сельских. Выходя за пределы собственно Нижнего Новгорода, необходимо подчеркнуть, что нахождение тех, или иных видов растений лишь в одном населенном пункте обширного региона – вещь не редкая. Так, марь вонючая (*Chenopodium vulvaria*) встречается в Нижегородской области только в г. Ветлуга.

5. Каково общее направление динамики географических элементов флоры и можно ли говорить о динамике городской флоры в этом смысле вообще, или же нужно отдельно рассматривать закономерности динамики флоры лесной,rudеральной, культурной и т.п.?

В разделах, посвященных истории формирования флоры города и связи флоры города и его растительности, мы указывали, отчасти вслед за А.К. Ибрагимовым, что в городских широколиственных и смешанных лесах, сосновых борах и их дериватах идут два противоположных процесса: возрастание числа степных и даже пустынных элементов вследствие осветления лесов и возрастание числа boreальных элементов по причине для нас неизвестной. При этом степные растения мигрируют с соседних оstepненных лугов, оstepненных боров, отчасти пустырей, в т.ч. боровых, пустынные – исключительно с пустырей, а boreальные – со склонов с северной экспозицией и с отдельных участков, сохранивших следы бывшего смешанного леса.. В сосновых борах, где в рельефе имеются значительные колебания – от сухих дюн до заболачивающихся западин (или же грядово – ложбинный рельеф, как в окрестностях пос. Торфопредприятие) идет такой же двойственный процесс – оstepнение и даже опустынивание сухих участков и проникновение boreальной и гипоарктической флоры вслед за мхами на более возвышенные участки. Что касается городских пустырей, заселения растениями отвалов земли, то нам известны лишь два примера такого же двойственного характера динамики флоры – зарастание отвалов у бывшего завода “Керамик” в Приокском районе и пустырей на юго-восточной окраине Нижегородского района, где можно наблюдать и степной элемент – полынь Маршалла и boreальные элементы – сосну и ель; последняя, правда, проникла сюда из массивов садов, где ее культивируют. В основном же городские пустыри “оккупируют” степные и даже пустынные элементы. Что касается культурной флоры, то идет процесс продвижения в культуру южных растений, свойственных степной зоне России: винограда, дыни, арбуза, баклажана, сорго, мелиссы, караганы кустарниковой, клена татарского и т.д. Попытка продвижения в культуру растений, принадлежащих к boreальному и тем более гипоарктическому элементу не меньше; это декоративные пихта сибирская, лиственница сибирская и сосна сибирская, купальница азиатская, пион необыкновенный, родиола розовая, роза иглистая, свидина белая, резуха альпийская и др.

Точно также идет распространение в городе сибирских (боярышник кроваво-красный, спирея дубравколистная, ветреница алтайская и др.) и европейских элементов (ива волчниковая, роза ржавчинная и др.).

6. Насколько динамика географических элементов флоры города соответствует таковой для внегородских территорий, в особенности относительно мало затронутых деятельностью человека?

Сколько мы можем судить по результатам наших наблюдений, в освоенной сельской местности идет точно такой же процесс взаимопроникновения в лесные экосистемы boreальных элементов с одной стороны и степных с другой. Точно также в культурную флору сельских населенных пунктов, становящуюся год от году все богаче, включаются и boreальные, и степные виды (пихты, лиственницы, сосна лесная, ель финская, клен татарский, карагана кустарниковая и др.). По разреженным лесам, обочинам дорог, лугам дичают как сибирские (боярышник кроваво-красный и т.д.) и европейские элементы (ива волчниковая). Что касается малозатронутых экосистем, то следует учесть, что территория Нижегородской области находится на стыке различных географических элементов флоры, т.е. флора области с древних времен и формировалась отчасти в результате взаимопроникновения различных географических элементов. На карте восстановленного растительного порова края хорошо видно проникновение степных боровых элементов далеко в зону южной тайги по приречным борам Керженца и Ветлуги и распространение в Правобережье области сосново-еловых лесов, содержащих boreальные элементы по соседству с оstepненными дубравами и сосновыми борами. Точно также и сибирские и европейские элементы (пихта сибирская, лиственница сибирская, боярышник кроваво-красный, княжик сибирский, цицербита крупнолистная и др. с одной стороны и перелеска благородная, ракитник

Цингера, острокильница чернеющая и др. с другой стороны) здесь практически соприкасаются и иногда перекрывают свои ареалы.

ОБ ОХРАНЕ ФЛОРЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

Одна из важных прикладных проблем городской флористики – охрана флоры. Особенность охраны флоры Н.Новгорода, как и вообще городов состоит в том, что, коль скоро, город – антропогенный объект и его растительность и флора в значительной мере также антропогенны, охрана его флоры это, с одной стороны, охрана аборигенных видов, а с другой стороны – охрана культивируемых видов. Далее, поскольку растительность города в значительной мере антропогенна, образована в результате деятельности человека, охрана части редких аборигенных видов должна подразумевать сохранение антропогенного воздействия на ряд растительных сообществ вторичного происхождения, где эти редкие виды обитают. Поскольку экология сосудистых водных растений разработана мало, в своем изложении мы будем касаться лишь растений суши; кроме этого мы исключим из рассмотрения редкие адвентивные виды растений.

1.Охрана редких аборигенных видов. Она распадается на охрану редких аборигенных видов, которые обитают в малонарушенных человеком растительных сообществах и охрану редких аборигенных видов, которые обитают как раз во вторичных сообществах.

1.2.Охрана редких аборигенных видов, обитающих в малонарушенных человеком сообществах. Их сравнительно немного. К таким видам относятся (виды приведены в той же последовательности, в которой они даны в тексте Аннотированного списка видов, произрастающих на территории Н.Новгорода!): Щитовник гребенчатый (в заболоченных лесах и по окраинам болот в заречной части), Коротконожка перистая (по лесистым склонам в Приокском районе), Кострец ветвистый (по лесам в нагорной части), Вейник пурпурный (по болотам и заболоченным лесам в заречной части), Овсянница лесная (по широколиственным лесам нагорной части и Авт.), Гусиный лук желтый, Башмачок настоящий (по широколиственным лесам нагорной части), Пальчатокоренник Траунштейнера (по заболоченным лугам и лесам заречной части), Дремлик болотный (аналогично для нагорной части), Ивы лапландская, филиколистная, черниквидая, Береза приземистая (по торфяным болотам и заболоченным лугам заречной части), Ветреничка дубравная (по широколиственным лесам в нагорной части), Прострел поникший (по сосновым борам в заречной части), Хохлатки промежуточная и плотная, Зубянка пятилисточковая (по широколиственным лесам в нагорной части), Лунник оживающий (по лесистым склонам на Слуде), Росянка круглолистная (по торфяным болотам в заречной части), Куманика несская (по заболоченным лесам в заречной части), Фиалки болотная и лысая (по заболоченным лесам и торфяным болотам заречной части), Зимолюбка зонтичная (в сосновых борах заречной части), Вертляница обыкновенная (по лесам заречной части), Подбел многолистный, Багульник болотный, Болотный мирт, Клюква болотная, Голубика (по торфяным болотам и заболоченным лесам заречной части), Змееголовник Рюйша (в сосновых борах заречной части), Адокса мускусная (по широколиственным лесам нагорной части и в Авт.), Колокольчик широколистный и Скерда сибирская (по

широколиственным лесам нагорной части), Скерда болотная (по заболоченным лесам нагорной части), Наголоватка васильковая (по сосновым борам заречной части) Для охраны этой категории видов, помимо запрета сборов, совершенно необходимо запрет интенсивной пастьбы скота (особенно коз!).

Следует, однако, заметить, что даже этот список является не вполне точным, ибо ряд видов из этого списка все же наиболее многочисленны в нарушенных местообитаниях: в нагорной части - Лунник оживающий, Ветреничка дубравная, Хохлатка промежуточная, Коротконожка перистая и Кострец ветвистый по слабо эродированным местам, в заречной части - Зимолюбка зонтичная, Прострел поникший, Змееголовник Рюйша, Наголоватка васильковая – по боровым пустырям. Гусиный лук проникает в скверы и палисадники и даже на пустыри в нагорной части.

1.2. Охрана редких аборигенных видов, произрастающих во вторичных, антропогенных сообществах. Их значительно больше. По заболоченным лугам нагорной части произрастают: Близмус сжатый, Осока желтая, Пушица широколистная, Пальчатокоренник мясокрасный, Дремлик болотный, Кокушник длиннорогий, Купальница европейская, Белозор болотный, Лен слабительный, Мытник болотный, Девясила гигантский.

По травянистым склонам, и т.ч. и эродированным, и на лесных полянах (и даже проникли на заброшенные газоны!) нагорной части произрастают: Гроздовник полуулунный, Можжевельник обыкновенный, Кострец приречный, Тимофеевка степная, Гусиный лук зернистый. Гусиный лук краснеющий, Лилия саранка, Пальчатокоренник Фукса, Тайник яйцелистный, Любки двулистная и зеленоцветная, Ольха серая, Ленец полевой, Резеда желтая, Кизильник черноплодный, Астрагалы серповидный и солодковый, Вязель разноцветный, Язвенник крупноголовый, Чина гороховидная, Горошки гороховидный и двулетний, Резак обыкновенный, Золототысячник зонтичный, Бруслица, Черника, Живучка женевская, Зопник клубненосный, Шалфей острянинный, Мытник Кауфмана, Вероники метельчатая и троянская, Бубенчик лилиелистный, Колокольчик болонский, Девясила шершавый, Серпуха венечная, Троммсдорфия крапчатая.

По боровым пустырям заречной части произрастают: Овсянница Беккера, Тимофеевка степная, Острокильница чернеющая, Герань кроваво-красная, Толокнянка обыкновенная, Тысячелистник щетинистый, Василек раскидистый.

На лугах высокого уровня в поймах Оки или Волги произрастают: Овсянница Беккера, Келерия Делявина, Ольха серая, Золототысячник зонтичный, Козлобородник подольский.

В приречных зарослях ив по берегам Оки произрастают: Дягиль лекарственный, Авран лекарственный.

Для охраны этой категории видов, помимо запрета сборов, совершенно необходимы следующие виды хозяйственной деятельности: на полянах, лугах, в т.ч. и на заболоченных лугах – умеренная пастьба скота и раз в год – сенокос, на боровых пустырях – умеренная пастьба скота.

2. Охрана культивируемых видов растений. Под ней мы подразумеваем сохранение ассортимента старинных видов растений, по тем, или иным причинам исчезающим из культуры. Из плодово-ягодных растений это Земляника мускусная, Яблоня китайка, Терн колючий; из декоративных растений - Резеда желтая, Кизильник черноплодный. Из огородных культур – Брюква, Пастернак посевной. Из кормовых растений – Канареечник канарский, Клевер мясокрасный.

Для сохранения этой категории видов совершенно необходимо восстановить в Ботаническом саду ННГУ Отдел полезных культур, который и будет заниматься распространением этих видов среди садоводов и цветоводов – любителей..

ЛИТЕРАТУРА ПО ФЛОРЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Аверкиев Д.С. Литература по флоре Нижегородской губернии. Н.Новгород.

1928.

Его же: Растительный покров Окского-Волжского нагорья // Ученые записки ГГУ. Вып. 1. 1935.

Его же: Геоботанический очерк участка, назначенного для разбивки Ботанического сада в г. Горьком. В кн. Эскизный проект Ботанического сада Горьковского государственного университета. Горький. 1936.

Его же: Определитель растений Горьковской области. Горький. 1938.

Его же: История развития растительного покрова Горьковской области и ее ботанико-географическое деление// Ученые записки ГГУ. Вып. XXV. 1954.

Его же: Литература по флоре и растительности Горьковской области (1927 – 1951 гг.). Там же.

Аверкиев Д.С., Аверкиев В.Д. Определитель растений Горьковской области. Горький. 1985.

Аверкиев В.Д. Растительность слуды р. Оки у города Горького между пос. Мыза и д. Новинки//Ученые записки ГГПИ. Вып. 4. 1963.

Алексин В.В. География растений. М. Просвещение. 1950.

Аннотированный список деревьев и кустарников, интродуцированных в Ботаническом саду Горьковского государственного университета / Сост. Кубланова С.Л., Насонова Ф.В., Козлова Ю.А. Ч. 1 – 3. Горький. 1972 – 1974.

Примечание: поскольку Ботанический сад со времени своего основания поставлял и поставляет посадочный материал для озеленения и садоводства, данный Список дает некоторое представление о культурной флоре города.

Архипович Н. Речка Юла: об одной загадке исторической географии Н.Новгорода. В сб. Y111 юношеские чтения им. В.И.Вернадского. Сборник исследовательских работ участников конкурса. М. 2001.

Баканина Ф.М., Лукина Е.В., Насонова Н.И., Селивановская Т.П., Смирнова А.Д. Заповедные места Нижегородской области. Н. Новгород. 1991.

Баканина Ф.М., Воротников В.П., Лукина Е.В., Фридман Б.И. Озера Нижегородской области. Н. Новгород. 2001.

Бакка С.В., Киселева Н.Ю. Особо охраняемые природные территории Нижегородской области. Аннотированный перечень. Н.Новгород. 2008.

Баулина В.В. Сады и парки Горьковской области. Горький.1981.

Вехов В.Н., Губанов И.А., Лебедева Г.Ф. Культурные растения СССР. М. Мысль.1978.

Воротников В.П., Шержурова Л.В. Флора мергелистых склонов рек Волги и Оки в пределах Нижнего Новгорода. В сб. Памятники истории, культуры и природы европейской России. Н. Новгород. 1995.

Воротников В.П., Мининзон И.Л., Пихтелева О.В. Особенности флоры Нижнего Новгорода. В сб. Проблемы озеленения исторического центра города Нижнего Новгорода. Н.Новгород.ННГАСУ.2005.

Воротников В.П., Чкалов А.В. Манжетки (*Alchemilla L.*) города Нижнего Новгорода // Вестник ННГУ им. Н.И.Лобачевского. сер. биол. №3. 2007.

Воротников В.П., Шестакова А.А. Злаки и злаковидные растения Нижегородской области. Н.Новгород. 2008.

Герщенович А.Г. О лесах города Горького//Горьковская область, № 11,1938.

Головкин Б.Н., Китаева Л.А., Немченко Э.П. Декоративные растения СССР. М. Мысль.1986.

Декоративные растения открытого и закрытого грунта/Приходько С.Н., Яременко Л.И., Черевченко Т.М. и др. Под общ. ред. Гродзинского А.М. Киев. Наукова думка.1985.

Декоративные травянистые растения для открытого грунта СССР. Класс Однодольных. В двух томах./ Ответственный редактор Н.А. Аврорин. Том 1, том 2, Л. Наука. 1977.

Демидова Е.Е., Мининзон И.Л. Редкие виды и межвидовые гибриды и сорта роз, перспективные для декоративного озеленения в Нижнем Новгороде. В сб. Инновации в ландшафтной архитектуре: Материалы VII научно-практической конференции. Н.Новгород: ННГАСУ. 2011.

Димитриев А.В., Абрамов Н.В., Мининзон И.Л., Папченков В.Г., Пузырев А.И., Раков Н.С., Силаева Т.Б. О распространении *Ambrosia artemisiifolia* (Asteraceae) в Волжско - Камском крае//Ботанический журнал. №1, 1994.

Доброхотова К. Кормовая база молочной фермы Автозавода.// Нижегородское краеведение. №11 – 12, 1931.

Дубинина М. Сад – моя опора.// Биржа (Н.Новгород). 18.08.2009.

Жовина О.В., Мининзон И.Л. Новые для Нижегородской области виды сосудистых растений, перспективные для внесения в региональную Красную книгу. В сб. Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 2. Н.Новгород. 2010.

Жовина О.В., Мининзон И.Л. Новые находки мест обитания некоторых видов высших сосудистых растений Красной книги Нижегородской области. Там же.

Замятченский П.А. Балахнинский уезд. Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Естественноисторическая часть. Вып. X. Спб. 1886

Ибрагимов А.К., Кондрашкина Г.А., Мининзон И.Л., Потапенко Н.Х., Патова М.А., Терентьев А.А. Об урбоэкологических исследованиях Ботанического сада ННГУ//Вестник ННГУ. Сер. биол. Вып.1.1999.

Ибрагимов А.К., Кондрашкина Г.А., Мининзон И.Л. Роль ботанических садов в современном урбанизированном мире// Вестник ННГУ. Сер. биол. Вып. 2(8). 2004.

Ибрагимов А.К., Терентьев А.А., Коровина М.А., Мининзон И.Л. Биологическое разнообразие озеленения и ландшафтов исторической части г. Нижнего Новгорода и феномен трансэкстраzonальности. В сб. Проблемы озеленения исторического центра города Нижнего Новгорода. Н.Новгород.ННГАСУ. 2005.

Коровина М.А., Селехов В.В., Зевеке А.Б., Букина В.А., Мининзон И.Л. Натурализация облепихи в условиях г. Нижнего Новгорода. В сб. Ботанические исследования в азиатской России. Материалы X1 съезда Русского Ботанического общества, том 3. Барнаул.2003.

Котова С., Архипович Н., Алексина Е., Красных А., Храмова К., Давыденко Т. Текстура, разнообразие и экологическое состояние ландшафтов долины р. Рахмы. В сб. Река и дети. Сборник творческих работ детей, участников окружного конкурса “ Малые реки – наша боль и надежда”. Н.Новгород.2001.

Красная книга Нижегородской области. Том 2. Н.Новгород. 2005.

Кутырева Е.М. Новый для Горьковской области вид рода *Gagea Salisb.*//Ученые записки ГГУ. Вып. L. 1959.

Лаврова О.П., Мининзон И.Л. Аборигенные виды осок Среднего Поволжья и перспективы введения их в культуру. В сб. Великие реки. Тезисы докладов международного конгресса «Великие реки 2005», том 2. Н.Новгород. 2006.

Лапшин М.М. К систематике и географии злаков Горьковской области. Труды ГГПИ том I, 1937; том IV, 1939; том XI, 1946; том XII, 1947. Ученые записки ГГПИ том XX, 1958; том 45, 1963.

Летняя полевая практика по ботанике с основами геоботаники... - ч. I. /сост. А. Н. Петрова, С. С. Веретенников, И. Л. Мининзон. – Н. Новгород: ННГУ. 2002.

Литвинов Д.И. Заметки о растениях русской флоры. Труды Ботанического музея Императорской Академии наук. Вып. XV. Спб. 1916.

Лукина Е.В. Об адвентивных видах флоры Горьковской области. В сб. Материалы совещания "Проблемы изучения адвентивной флоры СССР". М. Наука. 1989.

Ее же: О некоторых особенностях флоры Нижегородской области // Ботанический журнал, № 3, 1994.

ее же: О памятниках природы Нижегородской области. Н. Новгород. 1996.

Лукина Е.В., Баканина Ф.М. Памятники природы города Нижнего Новгорода. Н. Новгород. 1997.

Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР. 9 издание: Л.: Колос. 1964; 10 издание называется "Флора средней полосы европейской части России". М.: т-во научных изданий КМК. 2006

Мазепа И.П. В Балахнинскую уездную земскую управу. Отчет о мероприятиях по культуре болот и луговодству в 1913 г. В сб. Отчеты о деятельности специалистов Департамента земледелия по культуре кормовых растений в Нижегородской губернии за 1913 г. Н.Новгород. 1914.

Милютин С.Н. Материалы по флоре известняков р. Оки. М. 1890.

Мининзон И.Л. Крупный город как резерват редких и охраняемых растений. В сб. Охраняемые природные территории. Проблемы выявления, организации систем. Тезисы докладов международной научной конференции. Часть 2. Пермь. 1994.

Мининзон И.Л. Старины нижегородские кладбища как комплексные памятники истории, культуры и природы. В сб. Памятники истории, культуры и природы европейской России. Н. Новгород. 1995.

Мининзон И.Л., Касатова О.А. Нижегородский кремль как комплексный памятник природы и архитектуры. В сб. Нижегородский кремль: к 500-летию памятника архитектуры XVI века. Н.Новгород. 2002.

Мининзон И. Л., Митюгова И. А. Замечательные природные объекты на территории Нижегородского кремля и перспективы их охраны... В сб. Нижегородский кремль: к 500-летию памятника архитектуры XVI века. Н.Новгород. 2003.

Мининзон И.Л. Флора Ботанического сада ННГУ и его окрестностей //Вестник ННГУ. Сер. биол. Вып. 2(8). 2004.

Мининзон И.Л. Озеленение исторического центра Н.Новгорода: итоги инвентаризации флоры. В сб. Проблемы озеленения исторического центра города Нижнего Новгорода. Н.Новгород.ННГАСУ. 2005.

Мининзон И.Л., Лаврова О.П., Тарасова А.А. Лесные злаки исторического центра Н.Новгорода и перспективы введения их в культуру. Там же.

Мининзон И.Л., Юртаева Н.М. Исследование естественных каменистых садов Слуды (Приокский район Нижнего Новгорода). Там же.

Мининзон И.Л. Бедленд Приокского района Нижнего Новгорода. // Нижегородский краеведческий сборник, том 1. Н.Новгород.2005.

Мининзон И.Л. Адвентивные растения Н.Новгорода и близких окрестностей, перспективные для использования в декоративном озеленении. В сб. Ландшафтная архитектура и формирование городской среды. Н.Новгород.ННГАСУ. 2007.

Мининзон И.Л., Митюгова И.А., Хренова Т.А. Обрастание стен каменных строений исторической части Н.Новгорода. Там же.

Мининзон И.Л. Разнообразие дикорастущих видов сем. Orchidaceae в Нижнем Новгороде. В сб. Биологическое разнообразие. Интродукция растений. Материалы IV международной научной конференции. Спб. 2007.

Мининзон И.Л. Виды деревьев, кустарников и деревянистых лиан, редкие в озеленении Нижнего Новгорода и перспективы их дальнейшего использования. В сб. Ландшафтная архитектура и формирование городской среды. Н.Новгород. ННГАСУ.2008.

Мининзон И.Л., Чкалов А.В. Виды рода Манжетка (*Alchemilla*), перспективные для декоративного озеленения. Там же.

Мининзон И.Л., Воротников В.П., Сидоренко М.В., Широков А.И. Растительный мир Нижнего Новгорода. В кн.: Гелашивили Д.Б., Копосов Е.В., Лаптев Л.А. Экология Нижнего Новгорода. Н.Новгород. 2008.

Мининзон И.Л. Новые местонахождения видов растений Красной Книги Нижегородской области. В сб. Редкие виды живых организмов Нижегородской области: Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной Книге Нижегородской области. Вып. 1. Н.Новгород. 2008.

Мининзон И.Л. Виды растений Красной книги Нижегородской области и близкие к ним в декоративном озеленении. В сб. Проблемы формирования ландшафтной архитектуры урбанизированных территорий. Н.Новгород: ННГАСУ. 2009.

Мининзон И.Л., Досаева М.А. Новые находки видов сем. Orchidaceae Красной книги Нижегородской области на территории Нижнего Новгорода и в его ближних окрестностях. В сб. Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 2. Н.Новгород. 2010.

Мининzon И.Л., Досаева М.А. О внесении видов рода *Euphrasia* L. (Очанка) в Приложение к Красной книге Нижегородской области. Там же.

Мининzon И.Л., Литвинова А.С. Оценка экологического состояния лесопарков Нижнего Новгорода методом изучения возрастной структуры популяций. В сб. Инновации в ландшафтной архитектуре : Материалы VI научно-практической конференции. Н.Новгород: ННГАСУ. 2010.

Мининzon И.Л., Мордашова Е.В. Опыт использования лиан в декоративном озеленении индивидуальных усадеб Нижнего Новгорода. Там же.

Мининzon И.Л., Королева Т.С., Лебедева О.С. Лесные культуры как элемент парков и скверов на примере Приокского района Нижнего Новгорода. В сб. Инновации в ландшафтной архитектуре: Материалы VII научно-практической конференции. Н.Новгород: ННГАСУ. 2011.

Мурашкинский К. К флоре Нижегородской губернии. Труды Ботанического сада Императорского Юрьевского университета. Том V. Вып.1. Юрьев. 1904.

его же: Описательный каталог естественно-исторического музея Нижегородского губернского земства. Вып. 2. Отдел ботанический: гербарий высших растений. Н.Новгород. 1909.

его же: Описательный каталог естественно-исторического музея Нижегородского губернского земства. Вып 2. Отдел ботанический: дополнение 2-е к каталогу гербария высших растений. Н.Новгород. 1911.

Ненюков Ф.С. *Matricaria discoidea* DC. и *Lycopodium clavatum* L. в Нижегородской губернии. Труды Бюро по прикладной ботанике. Том XII. № 2. Юрьев. 1914.

его же: Заметки по флоре Нижегородской губернии//Вестник русской флоры. Том 1, вып.4. Юрьев.1915.

Нидергофер Э.А. О влиянии почв и климата на распространение растений по материалам, собранным в Нижегородской губернии// Труды Спб-кого общества естествоиспытателей. Том ХУ1, вып. 1, Спб. 1885.

Нидергофер Э.А., Ферхмин А.Р. Нижегородский уезд. Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Естественноисторическая часть. Вып.VIII. Спб.1885.

Носова Л.М. Флоро-географический анализ северной степи европейской части СССР. М. Наука.1973.

Отчеты о деятельности городского агронома за 1909 – 1912 гг. Н.Новгород. 1910 – 1913.

Пентин А.П., Елистратов А.В. Видовой состав древесно-кустарниковых пород зеленых насаждений г. Горького. В сб. Биологические основы повышения продуктивности и охраны лесных, луговых и водных фитоценозов. Вып.4. Горький. 1975.

Перегуда Е.Н., Мининзон И.Л., Зотов Д.И. Проблемы фитоиндикации опасных геологических процессов: На примере Нижнего Новгорода. В сб. Труды конгресса международного научно-промышленного форума «Великие реки 2009» том 1. Н.Новгород. 2009.

Пискарева Н.С., Мининзон И.Л. Анализ видового состава рода Боярышник в озеленении Нижнего Новгорода. В сб. Инновации в ландшафтной архитектуре: Материалы VI научно-практической конференции. Н.Новгород: ННГАСУ. 2010.

Пихтелева О.В. Синантропная флора города Нижнего Новгорода. Материалы III международной научной конференции «Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы». Ижевск. 2006.

Покровский Н.А. Следы боровой формации в лиственном лесу в окрестностях Н.Новгорода./Приложение 3-е к Докладу Нижегородской земской управы XLVI Нижегородскому губернскому очередному собранию о состоянии сельскохозяйственного (естественноисторического) музея Нижегородского губернского земства. Н.Новгород. 1910.

Полуяхтов К.К. Лесорастительное районирование Горьковской области. В сб. Биологические основы повышения продуктивности и охраны лесных, луговых и водных фитоценозов Горьковского Поволжья. Вып. 2. Горький. 1974.

Раевский В. Растения Нижегородской губернии. Н. Новгород. 1884.

его же: Дополнительный список растений к брошюре "Растения Нижегородской губернии"/Нижегородские губернские ведомости. Часть неофициальная. № 37.1884.

Растения земного шара в Нижнем Новгороде: растения, культивируемые в коллекциях Ботанического сада ННГУ/ под ред. Широкова А.И. Н.Новгород. 2010.

Примечание: поскольку Ботанический сад простирает и поставлял ранее растения для общественного и частного озеленения, то приведенный в данной книге список растений, культивируемых в Саду позволяет в какой-то мере иметь представление о культурной флоре Н.Новгорода.

Растительность европейской части СССР/ ред. В.Д. Александрова, С.А. Грибова, Т.И. Исаченко, Е.М. Лавренко, Ю.Р. Шеляг - Сосонко. М. Наука. 1980.

Сидоренко М.В. Макрофиты. В кн.: Гелашвили Д.Б., Копосов Е.В., Лаптев Л.А. Экология Нижнего Новгорода. Н.Новгород. 2008.

Смирнова А.Д., Лукина Е.В. *Betula nana* L. в Горьковской области.// Ботанический журнал. №4. 1975.

Смирнова А.Д. Охраняемые растения Горьковской области. Горький. 1982.

Станков С.С., Талиев В.И. Определитель высших растений европейской части СССР. М. Сов. наука. 1957.

Фатянов А.С. Геология и рельеф Балахнинской низменности.//Труды ГГПИ. Вып. XI. 1946.

Флора европейской части СССР. - Флора восточной Европы/ ред. Ан. А.Федоров, Н.Н. Цвелеv. тома I- XI. Л.- Спб. Наука 1974 - 2004.

Храмова К., Давыденко Т. Заброшенный строительный котлован и окружающая среда. В сб. У11 юношеские чтения им. В.И.Вернадского: сборник исследовательских работ участников конкурса в области естественных наук. М. 2000.

Чеснокова Е.В., Мининзон И.Л. Особенности растительного покрова урбанизированных территорий. В сб. Проблемы повышения продуктивности и комплексного использования лесных ресурсов Нижегородской области. Н.Новгород: ННГСХА.2008.

Чкалов А.В. О представителях рода *Alchemilla* во флоре Нижнего Новгорода. В сб. Ботанические исследования и методика преподавания ботанических дисциплин. Материалы региональной научно-методической конференции, посвященной памяти нижегородских ботаников Д.С. и В.Д. Аверкиевых. Н.Новгород: ННГПУ. 2010.

Юртаева Н.М., Тарасова А.А., Мининзон И.Л. Естественные каменистые сады Слуды. В сб. Великие реки 2003. Международный научно-практический форум. Генеральные доклады, тезисы докладов международной конференции «Великие реки 2003». 21-23 мая 2003 г. Н.Новгород 2003.

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ СЕМЕЙСТВ.

(Числа при названиях семейств означают порядковый номер семейства в Аннотированном списке)

- Aceraceae – 87 Actinidiaceae – 94 Adoxaceae – 133 Alismataceae – 21
 Amaranthaceae – 48 Amarillidaceae – 31 Anacardiaceae - 84 Apiaceae – 105 Apocynaceae – 115 Araceae – 26 Araliaceae – 104 Aristolochiaceae – 45 Asclepiadaceae – 116 Aspidiaceae – 8 Asteraceae – 139 Athyryaceae – 7
 Balsaminaceae -89 Begoniaceae – 65 Berberidaceae – 57 Betulaceae – 38 Bignoniaceae – 127 Boraginaceae – 121 Brassicaceae – 62 Buddlejaceae - 124 Butomaceae – 22 Buxaceae – 83
 Cactaceae – 51 Callitrichaceae – 82 Campanulaceae – 137 Cannabaceae – 42 Cannaceae – 33 Capparaceae – 63 Caprifoliaceae – 132 Caryophyllaceae – 52 Celastraceae – 85 Ceratophyllaceae – 54 Chenopodiaceae – 47 Commelinaceae – 28 Compositae – 139 Convolvulaceae – 117 Cornaceae – 106 Corylaceae – 37 Crassulaceae – 67 Cruciferae – 62 Cucurbitaceae – 136 Cupressaceae – 14 Cuscutaceae – 118 Cyperaceae – 25
 Davalliaceae – 5 Dipsacaceae – 135 Droseraceae 66
 Elaeagnaceae -99 Elatinaceae - 96 Equisetaceae -3 Ericaceae – 109 Euphorbiaceae – 81
 Fabaceae – 74 Fagaceae – 39 Fumariaceae – 61
 Gentianaceae – 113 Geraniaceae – 75 Graminae – 24 Grossulariaceae – 71
 Haloragaceae – 102 Hamamelidaceae – 72 Hippuridaceae – 103 Huperciaceae – 2 Hydrangeaceae -70 Hydrocharitaceae – 23 Hydrophyllaceae – 120 Hypericaceae – 95 Hypolepidaceae – 10 Hypocastanaceae – 88
 Iridaceae – 32
 Juglandaceae – 36 Juncaceae – 29 Juncaginaceae – 20
 Labiatae – 123 Lamiaceae – 123 Leguminosae - 74 Lemnaceae – 27 Lentibulariaceae – 129 Liliaceae – 30 Limoniaceae – 111 Linaceae – 78 Lobeliaceae – 138 Lycopodiaceae – 1 Lythraceae – 100
 Magnoliaceae – 58 Malvaceae – 93 Menyanthaceae – 114 Monotropaceae – 108 Moraceae – 41
 Najadaceae – 19 Nyctaginaceae – 49 Nymphaeaceae – 53
 Oleaceae – 112 Onagraceae – 101 Onocleaceae – 6 Ophyoglossaceae – 4
 Orchidaceae – 34 Orobanchaceae – 128 Oxalidaceae – 76
 Paeoniaceae – 55 Papaveraceae – 60 Parnassiaceae – 69 Phytolaccaceae – 50 Pinaceae – 13 Plantaginaceae – 130 Poaceae – 24 Polemoniaceae – 119 Polygalaceae – 80 Polygonaceae – 46 Potamogetonaceae – 17 Primulaceae – 110 Pyrolaceae - 107
 Ranunculaceae – 56 Resedaceae – 64 Rhamnaceae – 90 Rosaceae – 73 Rubiaceae – 131 Rutaceae – 79
 Salicaceae – 35 Salviniaceae – 11 Santalaceae – 44 Saxifragaceae – 68 Schisandraceae – 59 Scrophulariaceae – 126 Solanaceae – 125 Sparganiaceae – 16 Surianaceae – 86
 Taxaceae – 12 Thelypteridaceae – 9 Thymelaeaceae – 98 Tiliaceae – 92 Tropaeolaceae – 77 Typhaceae – 15
 Ulmaceae – 40 Umbelliferae – 105 Urticaceae – 43
 Valerianaceae – 134 Verbenaceae – 122 Violaceae – 97 Vitaceae – 91 Zannichelliaceae - 18